



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





600030950N

3

3736




1915 e. 1







F L O R A
VII PROVINCiarUM
BELGII FOEDERATI
I N D I G E N A.



F L O R A
VII PROVINCiarUM
BELGII FOEDERATI
I N D I G E N A.




600030950N

3

8736



1915 e. 1



600030950N

3

3736



1915 e. 1

F L O R A
VII PROVINCiarUM
BELGII FOEDERATI
I N D I G E N A.

IN EFFIGIEM
DAVIDIS GORTERI.

Doctus opes caræ miras qui Chloridos auget,
Quemque vocat Phœbus, quemque Hygiea suum;
Talis Mentorea GORTERVS cernitur arte,
Naturæ et pandit grande potentis opus.
Donec ab Hoë crescet ducens GORTERIA famam,
Æmula LINNÆO nomina, Belga, cole.

HENR. JOAN. ARNTZENIVS.
Ictus et Antecess. Groning.

IN EANDEM EFFIGIEM.

Hæc est GORTERI Floram meditantis imago
Indigenam. Hic Batavi Laus adamata foli.
Rusforum Princeps Medicum veneratur amica.
Patria dum merito cingit honore caput.

PETRUS DREUX.

76
DAVIDIS DE GORTER,

*A. L. M. Phil. & Med. Doct. antebac in Acad. Har-
derovicena Med. & Botan. Prof. ord. dein Augustissi-
mæ Rufforum IMPERATRICIS Archiatri; Acad.
Cæs. Nat. Cur. Imper. Scient. Petropol. Reg.
Stockholm. Societ. Reg. Londin. Harlem. Rot-
terod. Fleffing. Agriculturae Amftelod. Membri*

FLORA

VII PROVINCiarUM

BELGII FOEDERATI

D. de Gorter
Chr. de Gorter
de Gorter
INDIGENA.


H A R L E M I

Apud C. H. BOHN & FILIUM, Bibliopolas,

MDCCLXXXI.

DECLASSIFIED BY

DATE



ILLUSTRISSIMO

ET
GENEOSISSIMO.

D O M I N O.

GUILLIELMO HENRICO

B A R O N I

DE ROUWENOORT.

TOPARCHÆ. IN. UILENPAS. ORDI-
NIS. TEUTONICI EQUITI. CO-
ADJUTORI. ET. DIERÆ. MAGIS-
TRO. ORDINI EQUESTRI CO-

†

MI-

MITATUS. ZUTPHANIÆ. AD-
 SCRIPTO. INTRA. ET. EXTRA.
 ZUTPHANIAM PRÆTORI COL-
 LEGII PRÆPOTENTIUM. DE-
 PUTATORUM. COMITATUS. OR-
 DINUM. PRAESIDI. AD. RES.
 CRHENI. INFERIORIS. ET. VSA-
 LÆ. CURANDAS. DELEGATO.
 CIVITATIS. DOTECEMENSIS.
 CONSULI. SOCIETATIS. SCIEN-
 TIARUM. BATAVO-HARLEMEN-
 SIS. DIRECTORI. Cet. Cet. Cet.

ICRO. MAGNUS. IN. SUTPHANIE.
 AD. SUTPHANIAM. IN. SUTPHANIE.
 SUTPHANIAM. IN. SUTPHANIE.
 AD. SUTPHANIAM. IN. SUTPHANIE.
 SUTPHANIAM. IN. SUTPHANIE.

DEDICATIO.

Septimus & tricesimus volvitur annus,
ex quo **TU, VIR ILLUSTRIS-**
ME! me haud diu ante in Academia Har-
derovicena creatum Botanices Professore
invitasti in Hortum **TUUM UILEN-**
PASSIANUM. Vidi tunc eum, et
deinceps multoties vidi, sed semper summo
cum oblectamento, summaque admiratione;
in eo enim tanquam in cultissimo Paradiso,
quicquid eximii habet vel hic, vel alter
orbis, uno intuitu contemplari licet. Nec
parcis adhuc sumtibus aut industriæ, rario-
res Plantas ex omni terrarum angulo con-
quirendi; easdemque ita excolis Ipse, ut
in tanto fastigio vix æmulum reperi-
as. Excepisti insuper me per tam longam annorum
seriem singulari semper benevolentia & ami-
citia. Quin et me, dum in Russicis terris
degebam, commercio litterario honorare
non intermisisti. Hæ mihi causæ sunt,
VIR ILLUSTRIS-
SIME! quare
hunc laboris mei Botanici fructum, cui &

D E D I C A T I O.

TU Ipse non parum contribuisti, TU O
Nomini inscribere ausus sim, hoc solo titu-
lo, ut exstet, & post fata perennet, ob-
servantiæ, debiti honoris, reverentiæ, &
animi mei in TE grati, monumentum
publium. TU vero, MÆCENAS
OPTIME! accipias quæso hoc munu-
sculum hilari & benigno vultu; TUque,
ut adhuc diu in salutem Patriæ sospes &
incolumis vivas, opto.

ILLUSTRISSIMI TUI
NOMINIS

Zutphaniae

iiii Novembris

cultor humillimus

1781.

D. de GORTER.

L. S.

Opusculum hoc originem suam debet Excursionibus Botanicis, quas Anno 1735 comite Ill. LINNÆO circa Harderovicum feci. Ab Anno 1743, quo mihi Botanices docendæ munus in Academia Harderovicena demandatum fuit, Gelriam latius peragravi, Plantas in ea obvias studiose annotavi, sicque Anno 1745 in lucem prodiiit *Flora Gelro-Zutphanica*, continens Plantas 604. qui numerus ad 682. increverat Anno 1754. quo ad Aulam Imperialem Russicam ab ELISABETHA MAGNA *Glor. mem.* evocatus, Gelriæ valedixi. In Russia degens Catalogum illarum 78. Plantarum, quem penes me in peregrinis terris latere nolebam, in propriam ipsarum Patriam transmisi, ubi Anno 1757. Harderovici, titulo *Appendicis ad Floram Gelro-Zutphanicam* typis divulgatus est. Anno 1764 ego in Patriam redux, & apud Batavoduranos dehinc vivens, Dioecesin Ultrajectinam, Comitatum Buranum, Cuilenburgensem, & Leerdamensem, aliaque loca vicina, Plantas indigenas investigandi præsertim causa, invisi.

Ex

Ex Plantis illis, et aliis antea in Gelsia alibique a me lectis, tum ex C. PELETERII *Synonymia Plantarum Valachriæ*, H. BRUMANI *Indice stirpium circa Zuollam nascentium*, I. COMMELINI *Catalogo Plantarum indigenarum Hollandiæ*, H. BOERHAAVE *Indice altero Plantarum Horti Lugduno-batavi*, (in quo indigenæ Bataviæ Stirpes signo † notantur,) D. MEESE *Flora Frisica*, atque ex incerti Auctoris, sed periti methodoque Rajanæ addicti Botanici Manuscripto, in quo plures plantæ rariores in *Transysalania* nascentes designantur, confeci *Floram Belgicam*, Anno 1767 typis excusam, quam 1768 Supplemento primo, et 1771 Supplemento altero auxi. Quumvero nec omne Belgium peragraré, nec omnes in eo meandros perscrutari mihi datum fuerat. non defuerunt masculi Floræ Satellites, qui plures a me omiſſas Plantas, tum & aliarum locos natales benevole communicarunt, sicque Rem Herbariam Belgicam magnopere ditarunt.

Inter hos commemorare licet Perillustrem Equitem G. H. *Baronem de ROUWENOORT*, Dominum *Uilenpassiæ*, reliqua, Virum non modo Natalium & Munerum splendore insignem, sed & Botanices totiusque Historiæ Naturalis peritissimum, id quod *Thesaurus Naturalium & Hortus Uilenpassianus* ab-

abunde testantur; tum & Illustrissimum Ejus Filium H. A. G. *Baronem de ROUWENOORT*, Dominum in *Lange*; qui Viri Comitatus Zutphaniæ rariores Plantas, alibi in Belgio vix aut non reperiundas, mecum communicarunt.

Vir Amplissimus J. DEUTZ, Senator & Scabinus Amstelodamensis, Rei Botanicæ scientia optime imbutus, qui omnis generis exoticas Plantas in amoenissimo suo Prædio Harlemum inter & Velsam confito colit, varias indigenas ibidem in vicinia a Se lectas rariores, & ab aliis prætervisas, benevole suppeditavit.

Nobilissimus W. FABRICIUS SIX, Dominus in *Oterleek*, nulli in diligenti stirpium indigenarum inquisitione & cognitione secundus, bene multas utriusque Hollandiæ Plantas contulit.

Summus Botanicus, Cel. D. VAN ROYEN Professor Leydenfis, Hortique Academici Præfectus, pluribus non solum plantis indigenis, sed & egregiis observationibus Botanicis Suppellectilem meam auxit.

Celeberrimus Vir M. W. SCHWENCKE, inclytus apud Haganos Medicinæ Practicus, Botanicesque Professor, amicus meus colendissimus, multas egregias Stirpes circa Hagam Comitum & in Delflandia collegit, earumque Syllabum benevole mihi misit.

M. HOUTTUYN Medicus Amstelodamensis, amplissimo opere Historiæ Naturalis, secundum **LINNÆI** *Systema* digesto, cui etiamnum insudat, clarus, Plantarum complurium, quas in Hollandia boreali offendit, locos natales gratiosissime mihi significavit.

Clarissimus **M. VAN MARUM** Phil. & Med. Doct. & apud Harlemenfes Mathesios & Philosophiæ Lector, cum Groningæ degebat, Plantas istius Provinciæ, & præsertim eas, quæ circa Metropolin crescunt, exquisivit, earumque locos natales mihi impertiit: quod beneficium eo gratius erat, quum de Plantis ibi indigenis mihi, qui juvenis non nisi semel illam Provinciam invisi, nihil innotuerat.

Expertissimo **G. I. RINK**, Medicinam Tielæ Gelrorum cum laude facienti, acceptam refero accuratam designationem Plantarum in locis illi Urbi circumjacentibus crescentium.

Diligentissimus **N. MEERBURGH**, primarius in Horto Academico Lugduno-batavo Hortulanus, simulque peritus Botanicus, Pictor & Chalcographus, multas rariores plantas, præsertim Muscos, in Hollandia legit, quibus meam Collectionem ditavit.

Denique, sed non absque tristi recordatione, com-

commemoro Virum, intima mihi ab aliquot annis devinctum amicitia, D. FRED. RAINVILLE, Botanicum consummatissimum, Societati Physices experimentalis, quæ Rotterodami floret, adscriptum, ast eheu Anno 1779. Die Sexto mensis Junii, postquam diutissime gravi cum asthmate conflictaverat, vitamque pane solo & lacte toleraverat, rebus humanis ereptum. Incredibile est, quanta industria & solertia optimus ille Vir Plantas Belgii indigenas indagavit; Graminibus interim colligendis & extricandis præsertim intentus, quorum omnium, quotquot in Belgio pluribus annis legerat, specimina sicca mihi misit, doctissimæque de difficilioribus subjunxit observationes. Me insuper rogante Anno 1772 adiit Provinciam Groninganam, quam itinere pedestri ad Dollerdum usque emensus fuit; indeque redux mihi Catalogum Plantarum sub illo itinere lectarum accuratissimum tradidit.

Quid vero quisque horum Virorum contulerit, nomina synbolis suis in hoc opusculo adscripta Lectorem certiore facient.

A triennio tandem ego, cum bonis avibus pristinam meam Gelriam repeteram, inque amoenissima & saluberrima Urbe Zutphania domicilium elegeram, viribus meis, quæ jam ab aliquo tem-

tempore labefactatæ multum erant, recuperatis, vegetus, iterum pro ætate factus, et singulari heic Procerum in me benevolentia gaudens, occasionem nactus fui varias in Comitatu Zutphanie crescentes Plantas accuratius investigandi, imo nonnullas olim prætervisas detegendi.

Hisce nunc omnibus adminiculis instructus, Elenchum hunc Plantarum indigenarum in Septem Belgii foederati Provinciis hucusque repertarum composui, inque eo cives illos systematice disposui, sequutus Methodum Sexualem Perillustris mei quondam Præceptoris b. LINNÆI, qua faciliorem aut tutiorem inter hætenus publicatas non inveni; cujusque amplam explicationem in usum meorum popularium propediem prelo committere decrevi, persuasus hujus ope multis in posterum Floram hanc majori fore usui.

Ex *Speciebus Plantarum* (Sp.) LINNÆI mutuatus sum Differentias específicas, quas juxta Systematis Vegetabilium Editionem 13^{ti}am a Cl. MURRAY evulgatam, passim emendavi. Citavi ubique *Specierum* illarum paginam cum numero præfixo; huncque sequitur numerus Plantæ in *Flora Gelro-zutphanica* (Gelr.) et MEESE FLORA FRISICA (Fris.) Passimque adduxi *Floram Ingricam* (Ingr.) ut observationes, quæ de istis Plantis a Cl.

KRA-

KRASCHENINNIKOW & a me in Russia factæ sunt, conferri possent.

Synonyma non alia adduxi, quam quæ necessaria, ne mole sua flores venantem premeret libellus. In omnibus Plantis, quæ C. BAUHINO innotuerunt, ejus *Pinnacem* (*Baub. pin.*) citavi, huic que adposui **COMMELINI** *Catalogum plantarum indigenarum Hollandiæ* (*Comm. boll.*) ut ita hujus Viri in Rem Herbariam Belgicam merita constarent. Porro **DODONÆUM**, **MORISONUM**, **RAJUM**, **PLUKNETIUM**, **OEDERUM**, &c. et in *Muscis* ubique **DILLENIUM** adduxi, ut Planta obvia icone expressa conferri, tum etiam, ut optima cujusdam Auctoris descriptio consuli posset.

Nomina Vernacula in vulgus recepta, aut a rusticis imposita, in variis locis sæpe diversa, nec eandem semper designantia Plantam, quotquot mihi obvenerunt, adposui, de illorum bonitate aut etymologia haud sollicitus; nec nova cudere volui.

Varietates suis Speciebus subjunxi, græcisque præfixis literis distinxi.

Loca Natalia Belgico expressi idiomate, tum quia multa vix in linguam latinam transferri patiuntur, tum quia specialis eorum designatio Popularibus meis præsertim inservire potest. Monen-

nendum vero Loca illa Plantarum minus fixa ; & variationi sæpius obnoxia esse. Licet enim in incultis diutissime species conserventur & multiplicentur , in terris tamen ab hominibus frequentatis & laboratis, sæpe solum mutatur, vertitur subinde campus & ex pratensi fit agrarius , vel ericeta & tesqua coluntur, aut arboribus, quæ nunc laudabilis cura Magnatum est, conferuntur, quæque Plantæ indigenæ sæpe exulare jubentur: sicque non mirum, multas in locis a COMMELINO indicatis non amplius reperiri , ut ipse circa Harlemum vestigia istius Vri relegens expertus sum. Et hinc etiam frequentiam cujuslibet speciei non prætereundam judicavi, qua simul melius sive patri familias sive medico innotescit, sufficientem Plantæ copiam in usum oeconomicum, medicum, vel alium liberali manu natura quærentibus offerat, nec ne. Sunt vero B. L. variæ Plantæ, quas sola fide Magni BOERHAAVII huic Floræ insertas, & cruce † ad Ejus imitationem insignitas offendes, quum mihi illarum habitationes adhuc non innotuerint. Quasdam tamen omisi, quibus, utpote certe exoticis, ex incuria forsân Typographi signum † præfixum fuit. Illæ sunt *Polycarpon tetraphyllum*, quod *Herniaria alsines folio*. Boerb. lugdb. 2. p. 96. *Cotyledon Umbilicus veneris*, quæ
Co-

Cotyledon major. Boerb. lugdb. 1. p. 287. *Salvia Sclarea*, quæ *Sclarea.* Boerb. lugdb. 1. p. 163. *Polypodium aculeatum*, quod *Lonchitis aculeata major.* Boerb. lugdb. 1. p. 25. huicque præfixum † signum potius ad *Trichomanem* ibi mox subsequenter pertinet. Præterii deinde *Ulmum pumilam*, *Blitum capitatum & virgatum*, *Stellariam dichotomam*, a D. MEESE inter indigenas Frisiæ, citatas Plantas, quas crediderim olim ex Hortis aufugas fuisse. Nec Floræ huic inserui eas, quæ culturam hominum in hortis aut agris exposcunt, solas spontaneas enumerasse contentus.

Superfunt quoque nonnullæ Plantæ indigenæ ab Antecessoribus designatæ, quas ad sua Genera & Species minus certe amandare valui; tum & aliæ ad Zoophyta nunc relatæ. Utrarumque harum Catalogum ad calcem hujus opusculi subnexum invenies.

Porro cunctis Plantis Officinalibus nomen Pharmaceuticum (Pharm.) adposui, & partes, quæ prostant, enumeravi, ut scirent Pharmacopoei, quas in suum commodum intra Patriam legere possint.

Observationes ex nuperis meis schedis collectas, aut ab aliis liberalissime mecum communicatas passim suis locis inserui.

Usus quoque Medicum & œconomicum quarun-

rundam Plantarum apud Ruricolas receptum sparsim indicavi: perfectam enim omnium materiem medicam tradendo, extra scopum divagatus fuisset.

En iterum L. B. botanicum laboris mei foetum; Scias autem me eo non novam, ut forsan expectas, adornasse Floræ Belgicæ editionem; tunc enim totum Foederatum Belgium peragraré, ut antea animus erat, debuisset, sed intra Septem Provincias me detinui: interim tamen in præsentî Flora numerum Plantarum, neglectis etiam quas cultura profert, majorem reperiés; et hinc alio etiam titulo insignitum hoc opusculum in lucem prodit.

Denique deprecor menda typographica, quæ in absentia mea irrepserunt, & Lectores obsecro, ut potiora ex mea emendatione, quæ opusculo subjecta est, corrigant.

C L A S S I S I M O N A N D R I A M O N O G Y N I A.



S A L I C O R N I A.

1. SALICORNIA herbacea patula, articulis apice *herbacea.*
compressis emarginato-bifidis. Sp. 3. n. 1. *Gelr.*
605. *Fris.* 1.
Salicornia articulis apice crassioribus obtusis. *Ger.*
prov. 328. *Baſter ſubſ.* 2. p. 105. t. 50.
Salicornia. *Dod. pempt.* 82.
Kali geniculatum majus. *Baub. pin.* 289. *Comm.*
boll. 61.
Oed. dan. t. 303.
Zee-Kraal, Kraal-Kruid, Krabbe-Kwaad, Zee-
Grappe. Belg.
Overvloedig langs de Zee-en Maas - strand omtrent
's Gravezande; op de weg naar de Helder op 't
Koe-gras; aan de Stranden in Zeeland; aan de Zee-
dyk tuffchen Harlingen en Roptazyl; aan vochtige
kanten van Koornlanden buiten Franeker; aan de
Zeekant van Groningen by de Soltekamp, Warſum,
Delfzyl, Ooftwolde, en elders, meeft buitendyks,
aan de quelders: ook aan de Zeekant by Harderwyk,
doch niet veel.
Pharm. KALI herb. Sal Alkali. Souda.
Aceto condita eſculenta Zeelandis.

H I P P U R I S.

2. HIPPURIS. Sp. 6. n. 1. *Gelr.* 1. *Fris.* 2. *vulgaris.*
Equisetum palustre, brevioribus foliis, polyspermum.
Baub. pin. 15. *theatr.* 242. *Comm. boll.* 31.
Polygonum femina. *Dod. pempt.* 113. *Cam. epit.* 689.
Oed. dan. t. 87.
Duizent-Knoop Wyffe. Belg.
Aan de kanten der Rivieren, en in ſtaande Wateren
op verſcheide plaatſen, overvloedig aan de Zeek by
A Zoc-

2 MONANDRIA MONOGYNIA.

Zoelen in de Betuwe; in de Sloot achter Zorgvliet by 's Gravenhage; in de Graft te Leerdam; in de Slooten by 't Huis te Marquette; in de Vyvers van 't Huis te Zandhorst; en overvloedig in de modderige Slooten van Noord-Holland; als ook langs het Horensche - diep, en in de zoogenaamde bronlanden by de Water-buizen in de Provintie Groningen.

Articuli digito compressi, cum strepitu diffiliunt; qua nota ab Equisetis facile distinguitur. (Gouan. b. monsp. 3.)

Nemaufi in Galliis ad ambusta crebro forma unguenti usurpatur. (RAZOUX Tables Nosologiques. p. 109.)

D I G Y N I A.

C A L L I T R I C H E.

- verno.* 3. **CALLITRICHE**, foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Sp. 6 n. 1. Gelr 2.*
Stellaria aquatica. Baub. pin. 141. Comm. boll. 108.
Alfine aquis innatans, foliis longiusculis. Baub. bist. 3. p. 786.
Zeer gemeen in de Slooten op veele plaatsen.

- autumnalis* 4. **CALLITRICHE** foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Sp. 6. n. 2. Gmel. fib. 3. t. 1. f. 2.*
Alfine aquatica minor f. fluitans. Baub. pin. 257.
Lenticula palustris angustifolia, folio in apice dissecto. Loes. pruss. 140. t. 38.
By de voorgaande.

C L A S.

3

C L A S S I S II

D I A N D R I A

M O N O G Y N I A.

L I G U S T R U M.

3. **LIGUSTRUM.** Sp. 10. n. 1. Gelr. 3. Frif. 5. *vulgare.*
Ligustrum germanicum. Baub. pin. 475. bift. 3.
 p 533. Comm. boll. 65.
Keel-Kruid, Mondbout, Liguster. Belg.
In de Boschadie by Zuideras in 't Graaffschap Zutphen; in de Duinen by Waffenaar; tusschen Haarlem en Zantvoord; in de Bosjes te Bergum, en by 's Heerenveen in Friesland; op de Mickelhorst agter Haren by Groningen.
 Pharm. LUGUSTRI flor.
Perperam hunc fruticem Belgii civem esse negat
 KNOOP. Dendrol. p. 97.

C I R C A E A.

6. **CIRCAEA** caule erecto, racemis pluribus, foliis *luteis*.
 ovatis. Sp. 12. n. 1. Gelr 4.
Circæa lutetiana. Lob. bift. 137
Solanifolia *Circæa dicta major.* Baub. pin. 168.
 Comm. boll. 107.
Herba divi stephani. Tab. bift. 730.
 Oed. dan. t. 210.
In verscheide Boschen op donkere vochtige plaatsen op 't Loo, Uilenpas, Engelenborg in Gelderland; by Gornichem, Haarlem, 't Huis te Brederoode in Holland.

V E R O N I C A.

7. **VERONICA** spicis terminalibus, foliis oppositis *longifolia.*
 lanceolatis ferratis acuminatis. Sp. 13. n. 5. Gelr. 5.
 A 2 Ve.

Veronica I erectior latifolia. *Clus. bist.* 1. p. 346.

Veronica spicata latifolia. *Baub. pin.* 246.

Te Heemze langs de Vecht in Overysfel.

*Variat foliis latioribus & angustioribus; colore florum
ceruleo intensiore & dilutiore.*

spicata.

8. *VERONICA* spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo.

Sp. 14. n. 7. *Gelr.* 6. *Ingr.* 2.

Veronica spicata minor. *Baub. pin.* 247.

Oed. dan. t. 52.

*In de Laan voor den Huize Uilenpas in de Graaffschap
Zutphen; ook op Effenburg by Harderwyk.*

officinalis.

9. *VERONICA* spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Sp.* 11. n. 9. *Gelr.* 7. *Fris.* 6.

Veronica mas supina & vulgatissima. *Baub. pin.* 246.

Comm. boll. 114.

Oed. dan. t. 248.

Eeren-prys Manneken. Belg.

*Overvloedig in de Duin-Valeyen van Holland, en
elders op dorre zandige plaatsen.*

Pharm VERONICÆ herb.

serpyllifolia.

10. *VERONICA* racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis. *Sp.* 15. n. 14. *Gelr.* 8. *Fris.* 7.

Veronica pratensis serpyllifolia. *Baub. pin.* 247.

Morif. bist. 2. p. 319. f. 3. t. 22. f. 8.

Oed. dan. t. 492.

Eeren-prys Wyfje. Belg.

*In de Weiden by 't Huis te Zandhorst in Holland; te
Heemze in Overysfel; en aan de wegen en kanten
der Slooten, ook in de Moesboven op sommige plaatsen.*

Beccabunga.

11. *VERONICA* racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente *Sp.* 16. n. 15. *Gelr.* 9. *Fris.* 8.

Anagallis aquatica major, folio subrotundo. *Baub. pin.* 252. *bist.* 3. p. 791. *Comm. boll.* 9.

Oed. dan. t. 511.

Beeke-boom, Beek-punge, Water-punge. Belg.

β. *Anagallis* aquatica minor, folio subrotundo. *Baub. pin.* 252. *Comm. boll.* 9.

*Op veele plaatsen aan de Beekjes, en op laage natte
gronden en plaatsen, alwaar 's Winters water staat.*

Pharm

DIANDRIA MONOGYNIA.

5

Pharm. BECABUNGÆ herb.

12. *VERONICA* racemis lateralibus, foliis lanceolatis ferratis, caule erecto. *Anagallis* *Sp.* 16. n. 16. *Gelr.* 9.
α. β. & 606. Fris. 9.

Veronica aquatica major, folio oblongo. *Morif. bist.* 2. p. 323. f. 3. t. 21. f. 25.

Anagallis aquatica major, folio oblongo. *Baub. pin.* 252. *Comm. boll.* 9.

- β. *Anagallis* aquatica minor, folio oblongo. *Baub. pin.* 252. *Comm. boll.* 10.

Aan de Slooten en Graften op verscheide plaatsen als de voorgaande.

13. *VERONICA* racemis lateralibus alternis, pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Sp.* 16. n. 17. *Fris.* 10.

Anagallis aquatica angustifolia scutellata. *Baub. pin.* 252. *Baub. bist.* 3. p. 780. *Comm. boll.* 9.

Oed. dan. t. 209.

Op veele plaatsen langs de Zuider-Zee kant by Enkhuysen, Muiderberg, Stavoren, Harlingen, op Vlieland; in de Slooten van 't Haagsche-Bosch; en in de Moerassen by Groningen.

Folia omnia denticulis minimis semper instructa sunt.

14. *VERONICA* racemis lateralibus, foliis oblongo-ovatis ferratis, caulibus prostratis. *Sp.* 17. n. 22.

Veronica angustifolia minor. *Riv. t.* 95.

Chamædryas spuria minor angustifolia. *Baub. pin.* 249. *prodr.* 117. *Baub. bist.* 3. p. 287.

Op het Gebergte te Bronsbergen buiten Zutphen.

(Nob. Baro & Eques de ROUWENOORT, Dominus Uilenpaffia.)

15. *VERONICA* racemis lateralibus, foliis ovatis rugosis dentatis sessilibus, caule bifariam piloso. *Chamædryas* *Sp.* 17. n. 23. *Gelr.* 10. *Fris.* 11.

Veronica minor, foliis imis rotundioribus. *Morif. bist.* 2. p. 320. f. 3. t. 23. f. 12.

Chamædryas spuria minor rotundifolia. *Baub. pin.* 249. *Comm. boll.* 24.

Oed. dan. t. 448.

Gamanderlyn. Belg.

6 DIANDRIA MONOGYNIA.

β. *Chamædrys spuria minor latifolia. Baub. pin. 249.*
Teucrium 5. *Clus. bist. 1. p. 350.*

Veel op schaduwachtige plaatsen; aan den boogen Sydel by Harderwyk; in 't Haagse Bosch; in den Haarlemmer-hout; ook in de Provincien Utrecht en Friesland; β. In Overijssel by Zwoll.

agrestis. 16. *VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo brevioribus. Sp. 18. n. 26. Gelr. 12. Fris. 13.*

Alfine chamædryfolia, flosculis pediculis oblongis insidentibus. Baub. pin. 250. Comm. boll. 6.

Alfine serrato folio glabro. Baub. bist. 3 p. 366. Oed. dan. t. 449.

β. *Veronica flosculis oblongis pediculis insidentibus, chamædryos foliis alternis. Boerb. lugdb. 1. p. 226. n. 22.*

In veelte Hoven en Bouw-landen.

arvensis. 17. *VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus. Sp. 18. n. 27. Gelr. 13. Fris. 14.*

Alfine veronicæ foliis, flosculis cauliculis adhærentibus. Baub. pin. 250. Comm. boll. 7.

Alfine folio serrato hirsutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus. Baub. bist. 3. p. 367.

In de Zaaï-landen buiten Harderwyk, Naarden, en elders.

hederifolia. 18. *VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. Sp. 19. n. 28. Gelr. 11. Fris. 15.*

Alfine hederulæ folio. Baub. pin. 250. Comm. boll. 6. Oed. dan. t. 423.

Muur met bladeren van Klim of Veil. Belg.

In de Bouw-landen, en ook op ruwe plaatsen.

triphyllos. 19. *VERONICA floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus. Sp. 12. n. 19. Gelr. 15.*

Alfine triphyllos cærulea. Baub. pin. 250.

Alfine folio profunde secto, flore purpureo seu violaceo. Baub. bist. 3. p. 367.

Oed. dan. t. 252

Onder 't Koorn te Dieze in Overijssel.

DIANDRIA MONOGYNIA.

7

20. *VERONICA* floribus solitariis sessilibus, foliis *Peregrina.*
 lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis,
 caule erecto. *Sp.* 20. n. 33. *Fris.* 16.
Veronica terrestris annua, folio polygoni, flore
 albo. *Morif. bist.* 2. p. 322. f. 3. t. 24. f. 19.
Boerb. lugab. 1. p. 225. n. 17.
Oed. dan. t. 107.
Zomtyds in de Koorn-landen, het meest in de Hoven;
thans zeer gemeen in de Provinciën Friesland en
Groningen.

GRATIOLA.

21. *GRATIOLA* floribus pedunculatis, foliis lanceo- *Officinalis.*
 latis serratis. *Sp.* 24. n. 1.
Gratiola. *Dod. pempt.* 362.
Gratiola centauroides. *Baub. pin.* 279. *Comm. boll.* 55.
Gods-Genade. Belg.
Tandpyn-wortel Rusticis Gorcomiensibus.
Overvloedig aan de Dyken omtrent Gornichem.
Pharm. GRATIOLÆ rad. herb.
Radix denti cavo indita contra odontalgiam Rusticis
Gorcomiensibus in usu.

PINGUICULA.

22. *PINGUICULA* nectario cylindraceo longitudine *Vulgaris.*
 petali. *Sp.* 25. n. 2. *Gelr.* 607.
Pinguicula. *Clus. bist.* 311.
Sanicula montana, flore calcari donato. Baub.
pin. 242.
Oed. dan. t. 93.
Butter-wortel, Berg-Sanikel. Belg.
Kievits-vet. Vulgo.
Tusschen Groenloo en Borkeloo, als ook op één Bos-
ren-erf agter Doetinchem, genaamt de Steenbou-
wer, gelegen in 't buurschap Brunsveld by den
Slangenburg, als mede op de Bakermarkt, en by
Zelhem in 't Graafschap Zutphen.

UTRICULARIA.

23. *UTRICULARIA* nectario conico, scapo pauci- *Vulgaris.*
 floro. *Sp.* 26 n. 3. *Fris.* 17.
Lentibularia. Hall. jen. 237. *Lind. al.* 242. t. 11.
 A 4 Mi-

Millefolium aquaticum lenticulatum. *Baub. pin.* 141.
Oed. dan. 8. 138.

Water - Duizend - blad met geele bloemen. Belg.

Overvloedig in Slooten, Pyvers en Water-dobben, voornaamlyk by Vorden in 't Graaffschap Zutphen; omtrent de Bontenbok buiten Gorradyk, en op 't Orange Woud in Friesland; in de Slooten van de bronlanden by de Waterhuizen buiten Groningen.

V E R B E N A.

officinalis. 24. *VERBENA* tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario. *Sp.* 29. n. 15. *Gelr.* 15.

Verbena communis, flore cæruleo. *Baub. pin.* 269.
Comm. boll. 114.

Verbena recta. *Dod. pempt.* 150.

Tzer - kruid, Tzer - bard. Belg.

Te Zandwyk by Tiel; aan den Dyk by Lienden, Driel, Elden, omtrent 't Huis de Nevel in de Betuwe; langs de wegen by 's Hage; op dorre beuvelen by 't Gerecht buiten Naarden; aan sommige Duinkanten buiten Haarlem; op de Wallen te Utrecht; en elders.

Pharm. VERBENÆ herb.

L Y C O P U S.

europæus. 25. *LYCOPUS* foliis sinuato-ferratis. *Sp.* 30. n. 1.
Gelr. 16. *Fris.* 18.

Marrubium palustre glabrum. *Baub. pin.* 230.
Comm. boll. 72.

Marrubium aquaticum quorundam. *Baub. bist.* 3.
p. 318.

Water - Andorn, of Malrove. Belg.

β. *Lycopus* foliis in profundas lacinias dissectis.
Tourn. inst. 191. *Boerb. lugdb.* 1. p. 186.

Aan de kanten der Slooten, ook aan den Yssel op verscheide plaatsen.

S A L V I A.

pratensis. 26. *SALVIA* foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis gelea glutinosi. *Sp.* 35. n. 12. *Gelr.* 17.

Horminum pratense, foliis ferratis. *Baub. pin.* 238.
Or.

DIANDRIA MONOGYNIA.

9

Orvala sylvestris, species quarta. *Dod. pempt.* 293.

Veld-Salie. Belg.

Op verscheide plaatsen omtrent Zutphen, en elders in 't Graafschap Zutphen; en omtrent Salk in Overijssel.

27. *SALVIA* foliis ferratis sinuatis læviusculis, corol- *Verbenac.*

lis calyce angustioribus. *Sp.* 35. n. 14. *Gelr.* 18.

Horminum sylvestre, lavandulæ flore. *Baub pin.* 239.

Hortini sylvestris quarti, species quinta. *Clus.*

bist. 2. p. 31.

By Uilenpas, Enghuizen, en elders in Gelderland.

D I G Y N I A.

A N T H O X A N T H U M.

28. *ANTHOXANTHUM* spica oblonga ovata, floscu- *odoratum.*

lis subpedunculatis arista longioribus. *Sp.* 40. n. 1.

Gelr. 608. *Fris.* 19. *Schreb. gram.* 1. t. 5. *Stil-*

lingf. miscell. t. 1.

Gramen spicatum pratense, spica flavescence. *Baub.*

pin. 2. *theatr.* 43.

Veel in de Wei-landen en aan de kanten der Boschen en Wegen; ook aan de Duinkant buiten Haarlem, in 't Voorjaar.

Arista semper calyce longior est, ut probe attendenti patet. In solo pingui hæc planta sæpe profert spicam vere paniculatam.

C L A S S I S III.
T R I A N D R I A
M O N O G Y N I A.

V A L E R I A N A.

- dioca.* 29. VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Sp.* 41. *n.* 4. *Gehr.* 20.
Valeriana palustris minor. *Baub. pin.* 164. *Comm. boll.* 113.
Valeriana minima *Dod. pempt.* 350.
Kleine wilde Valeriane. Belg.
In vochtige Weilanden buiten Amsterdam; in de Duin-valeyen by Zorgvliet; aan den Horensche-dyk nevens Haren; ook aan de Oostkant van Haren aan de dykjes buiten Groningen; en elders.
- officinalis.* 30. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Sp.* 45. *n.* 5. *Gehr.* 19. *Fris.* 20.
Valeriana sylvestris major. *Baub. pin.* 164. *Comm. boll.* 113.
Oed. dan. t. 570.
Wilde Valeriane. Belg.
β. Valeriana major sylvestris montana. *Baub. pin.* 164.
Boerb. lugdb. 1. *p.* 74.
Aan de kanten der looten en Graften op veele plaatsen.
Pharm. VALERIANÆ SYLVESTRIS rad.
- Locusta.* 31. VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Sp.* 47. *n.* 16.
olitoria. α. fructu simplici. *Sp.* 47. *n.* 16. *v. Gehr.* 21.
Fris. 21
Valeriana campestris inodora major. *Baub. pin.* 165.
Comm. boll. 113.
Olus album. *Dod. pempt.* 646.
Veld Sala, Koorn-Sala, Vet, Vettik, Vette-koes.
Belg.

TRIANDRIA MONOGYNIA. 11

In de Koorn-landen en Moes-boven.

I R I S.

32. *IRIS corollis imberbibus, petalis interioribus pendac-*
stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. Sp. 36. rus.
n. 10. Gelr. 22. Fris. 22.

Acorus adulterinus. Baub. pin. 34. theatr. 634.
Comm. boll. 4.

Oed. dan. t. 494.

Geel-Lisch, Valsch-Lis. Belg.

Pinxter-Bloemen. vulgo.

Overvloedig in ondiepe Slooten en laage vochtige landen
in de Betuwe; tusschen Harderwyk en Nykerk;
tusschen Rotterdam en Gouda; by 's Hage; buiten
Alkmaar in de Egmonder-Meer; aan de kant van
den Huigen-dyk; en van de Alkmaarder-Vaart;
en elders in Noord-Holland; ook veel in de Pro-
vincien Utrecht, Friesland, en in 't Goregt bui-
ten Groningen.

Pharm. ACORI ADULTERINI rad.

33. *IRIS corollis imberbibus, petalis interioribus foetidissima-*
parentissimis, caule unangulato, foliis ensiformi-
bus. Sp. 57. n. 11.

Spatula foetida. Baub. bist. 2. p. 31.

Gladiolus foetidus. Baub. pin. 30. theatr. 560.

Comm. boll. 44.

Wandluis-Kruid. Belg.

Aan de kant van de Vaart tusschen Haarlem en
Leiden.

S C H O E N U S.

34. *SCHOENUS culmo tereti, foliis margine dorso-*
que aculeatis. Sp. 62. n. 1. Mariscus.

Cyperus longus inodorus germanicus Baub. pin.
14. theatr. 221. Comm. boll. 30.

Cyperus longus inodorus major, foliis & carina
ferratis. Moris. bist. 3. p. 237. f. 8. t. 11. f. 24.
altera bona.

Wild Galigaan zonder reuk. Belg.

Aan de kanten der Rivieren en staande Wateren op
verscheide plaatsen.

35. *SCHOENUS culmo tereti nudo, capitulo ovato, nigris.*
in-

involucri diphylli valvula altera subulata longa. *Sp.*
64. n. 5.

Juncus lœvis minor, panicula glomerata nigricante.

Moris. bist. 3 p. 233. f. 8. t. 10. f. 28.

Overvloedig in de Zee - Duinen by Velzen.

compressus. 36. *SCHOENUS* culmo subtriquetro nudo, spica disticha, involucro monophyllo. *Sp.* 65. n. 10.

Gramen Cyperoides, spica simplici compressa disticha. *Pluk. alm.* 173. t. 34. f. 9 *Scheuch. gram.* 490.

Te Hillegom tusschen Leiden en Haarlem, langs een beekje aan één Weide, loopende naar de Haarlemmer-Meyr. (D. RAINVILLE.)

glomeratus 37. *SCHOENUS* culmo triquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis planis, pedunculis lateralibus geminis. *Sp.* 65. n. 11.

In de Weiden by Nymegen. (D. RAINVILLE.)

C Y P E R U S.

flavescens. 38. *CYPERUS* culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis lanceolatis. *Sp.* 68. n. 15.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa subflavescente. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 88. t. 88. *Comm. boll.* 52.

Klein Riet-Gras. Belg.

In vochtige Zand-gronden aan de Duinkant, en in de Meben by Harderwyk.

fuscus. 39. *CYPERUS* culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus. *Sp.* 69. n. 16.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa nigricante. *Baub. pin.* 6.

Oed. dan. t. 179.

By de voorige, waar van weinig verschild.

S C I R P U S.

palustris. 40. *SCIRPUS* culmo tereti nudo, spica subovata terminali. *Sp.* 70. n. 2. *Gelr.* 27. *Fris.* 23.

Gu-

Juncus capitulis equiseti major. Baub. pin. 12.

Boerb. lugdb. 2. p. 164.

Juncellus cyperoides, capitulo simplici. Loes. pruss. 131. t. 36.

Oed. dan. t. 273.

Kleine Water - Biese. Belg.

Aan de Oevers van de Maas by het Huis ten Donk, en Delfshaven; in de Weilanden by Velzen; in ondiepe Slooten aan het Veld te Dalffen in Overysfel; ook op verscheide plaatsen in Friesland.

Differt valde longitudine & crassitie culmorum & spicarum pro diversitate loci & soli.

41. *SCIRPUS culmo stricto nudo, spica bivalvi ter-^{capitatus} minali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis. Sp. 71. n. 6.*

Gramen junceum, foliis & spica junci, minus.

Baub. pin. 6. Comm. boll. 50.

Oed. dan. t. 167.

In de buitendykse landen aan de Ykant; en overvloedig in vogtige Weiden in de Provinciën Friesland en Groningen.

42. *SCIRPUS culmo tereti nudo fetiformi, spica ovata acicularis. bivalvi, feminibus nudis. Sp. 71. n. 7.*

Juncus inutilis seu Chamæschenus. Baub. theatr. 183.

Oed. dan. t. 287.

In een Riefwaard aan de Leck by Wyk te Duurstede, tusschen de Stad en het Veer. (Filius Peter de Gorter.)

Culmi hic interdum spithamam longitudine æquant.

43. *SCIRPUS culmis teretibus nudis alternis, caule^{fluitans} folioso flaccido. Sp. 71. n. 8. Fris. 24.*

Juncellus, capitulis equiseti, minor fluitans. Baub. pin. 12. prodr. 23.

Gramen junceum clavatum minimum. Raj. bist.

1310. Moris. bist. 3. p. 230. S. 8. t. 10. f. 31. Pluk.

alm. 180. t. 35. f. 1.

In Friesland omtrent Bergum op laage natte plaatsen, en voor aan in laagten op de Heide aldaar.

44. *SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis ovatis plurilacustris. bus pedunculatis terminalibus. Sp. 72. n. 9. Gelr. 26. Fris. 25.*

Jun-

Juncus maximus seu *Scirpus major*. *Baub. pin.* 12. *Comm. boll.* 61. *Morif. bist.* 3. p. 231. f. 8. t. 10. f. 1.

Matte Biesen, Stoele Biesen Belg.

β. *Juncus*, five *Scirpus medius*. *Baub. pin.* 12. *Comm. boll.* 61. *Morif. bist.* 3. p. 231. f. 8. t. 10. f. 2.

Zeer veel aan de Rivieren, Meyren, Vaarten, Graf-ten, Slooten; ook aan de Beeken by Harderwyk, en op het Biesbosch by Dordrecht.

β. *Aan de Rivier 't Spaarne by 't Huis te Heemstede; ook aan de Vecht en Maas.*

Holofchoe- 45. *SCIRPUS* culmo tereti nudo, spicis subglobosis
nus. glomeratis pedunculatis, involucro diphylo in-
æquali mucronato. *Sp.* 72. n. 10.

Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. Baub. pin. 11. *theatr.* 17. *Boerb. lugdb.* 2. p. 164.

Oed. dan. t. 454.

† Volgens BOERHAAVE.

staceus. 46. *SCIRPUS* culmo nudo setaceo, spica terminali
sessili. *Sp.* 73. n. 12.

Gramen junceum minimum, capitulo squamoso. Baub. pin. 6. *prodr.* 13.

Gramen junceum minimum maritimum. C. B. Comm. boll. 50.

Oed. dan. t. 311.

In de Zee-Duinen by Zandvoort en Muiderberg, en by ter Goes in Zeeland. (Baub. prodr. 13.)

triqueter. 47. *SCIRPUS* culmo triquetro nudo, spicis subses-
silibus pedunculatisque, mucronem æquantibus.
Linn. mant. 29.

Juncus acutus maritimus, caule triquetro molli, procerior. Pluk. alm. 200. t. 40. f. 2.

In menigte aan de Oevers van de Maas langs den Hoogendyk by Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

mucrona- 48. *SCIRPUS* culmo triangulo nudo acuminato, spi-
tus. cis conglomeratis sessilibus lateralibus. *Sp.* 73. n. 15.

Juncus acutus maritimus, caule triangulo. Baub. pin. 11. *prodr.* 22. *Morif. bist.* 3. p. 232. f. 8. t. 10. f. 20.

Te Overmaas langs de Rivier. (D. RAINVILLE.)

TRIANDRIA MONOGYNIA.

15

49. *SCIRPUS* culmo triquetro, panicula conglobata *maritimus*.
foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia
subulata. *Sp.* 74. n. 21. *Gelr.* 25. *Fris.* 26.
α. *Cyperus rotundus inodorus germanicus*. *Baub.* pin.
14. *theatr.* 215. *Comm. boll.* 30.
Water Cyperus van Nederland. Belg.
β. *Cyperus rotundus inodorus anglicus*. *Baub.* pin. 14.
Comm. boll. 31.
Ronde Cyperus zonder reuk Belg.
γ. *Gramen Cyperoides panicula sparsa majus*. *Baub.*
pin. 6. *theatr.* 86. *Comm. boll.* 51.
Wild Galigaan Gras. Belg.
α. & β. *Aan de kanten van verscheide Rivieren en*
staande Wateren. γ. *Aan stilstaande Wateren en*
Slooten.
50. *SCIRPUS* culmo triquetro folioso, umbella folia- *sylvaticus*.
cea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis
confertis. *Sp.* 75. n. 24. *Gelr.* 24.
Cramen Cyperoides milfaceum. *Baub.* pin. 6.
Comm. boll. 52.
Oed. dan. t. 307.
Grasachtig Galigaan. Belg.
In vochtige laagte Weilanden.

ERIOPHORUM.

51. *ERIOPHORUM* culmis vaginatis teretibus, spica *vaginatum*
scariofa. *Sp.* 76 n. 1
Gramen tomentosum alpinum & minus. *Baub.* pin. 5.
prodr. 10.
Juncus alpinus capitulo lanuginoso Schoenola-
gurus. *Faub.* pin. 12. *prodr.* 23. *theatr.* 188.
Scheuch. gram. 302. t. 7. f. 1.
Oed. dan. t. 236.
Op Staal-duin by 's Hage. (Cel. SCHWENCKE.)
52. *ERIOPHORUM* culmis teretibus, foliis planis, *voly flachi-*
spicis pedunculatis. *Sp.* 76. n. 2. *Gelr.* 28. *Jngr.* an.
8. *Fris.* 27.
Gramen eriphorum. *Dod. pempt.* 522.
Gramen pratense tomentosum, panicula sparsa.
Faub. pin. 4. *theatr.* 60. *Comm. boll.* 50.
Wolfe-gras, Wolfe-Vlas, Matte-Vlas, Dotter-
gras. Belg.

Veen-

Veen-Hamels, Veen-Pluis. Rusticis.

De Moeren. Drenthinis.

Overvloedig in vochtige dorre Landen en Heigronden by Harderwyk, Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal, en elders in Gelderland; buiten Amsterdam op de Weg naar Amstelveen, aan de Meyrkant; in de Weiden by 't Huis te Marquette; buiten Alkmaar by Heiloo; in de Schermer, op 't Koe gras in Noord-Holland; te Bostel in de Meyry; in de Wouden in Friesland; in de laage Hooy-en Bronlanden by Haren, en elders buiten Groningen; en op veele plaatsen in Drenthe.

Rustici nonnulli ad ericeta habitantes pulvinaria sua & lectos ex pappo bujus graminis conficiunt.

N A R D U S.

- arida.* 53. *NARDUS* spica setacea recta secunda. *Sp.* 77. n. 1. *Gelr.* 29. *Jngr.* 9. *Schreb. gram.* 1. t. 7. *Gramen spar-teum juncifolium. Baub. pin.* 5. *theatr.* 69. *Comm. boll.* 49.
- β. *Gramen spar-teum hollandicum, five capillaceo folio minus. Baub. pin.* 5. *prodr.* 11. *Comm. boll.* 49. *Morif. bist.* 3. p. 217. f. 8. t. 7. f. 8.
- In de Gagel-Kampen by Harderwyk, en op veele plaatsen in de Duinen, onder bet Mofch. β. In de Duinen by Heemstede.*

D I G Y N I A.

P H A L A R I S.

- arundinacea.* 54. *PHALARIS* panicula oblonga ventricosa ampla. *Sp.* 80. n. 6. *Gramen arundinaceum spicatum. Baub. pin.* 6. *theatr.* 94. *Comm. boll.* 52.
- Riet-gras. Belg.*
- β. *Gramen arundinaceum, Calamagrostis dictum, spica multiplici. Baub. pin.* 6. *Comm. boll.* 52. *Oed. dan. t.* 259.
- γ. *Gramen aquaticum paniculatum latifolium. Baub. pin.* 3. *Comm. boll.* 47.
- Op vochtige zandige plaatsen by Doesburg, Harderwyk, Wageningen; aan de Duinkant by Haarlem; in*

*in de Laanen tusschen het begbout by de Slooten op
S. Hacken-goedt by Zwol.*

55. PHALARIS panicula effusa, glumarum carinis *oryzoides*.
ciliatis. *Sp.* 81. n. 8. *Schreb. gram.* 6. t. 12.
Gramen palustre, panicula speciosa. *Baub. pin.* 3.
prodr. 17.
Homolocenchrus. *Mieg. act. belv.* 4. p. 307. *Hall.*
bist. 1411.
*Aan den Beukelsdyk langs de Sloop, en beneden aan
den Hoogendyk, dicht by het einde van de Rivier,
aan geene zyde van Boschjes - Eiland buiten Rot-
terdam. (D. RAINVILLE.)
Floret sero, ♂ maturefcit raro.*

P A N I C U M.

56. PANICUM spica verticillata, racemulis quater-
nis, involucellis unifloris bisetis, culmis diffusis. *verticilla-
tum.*
Sp. 82. n. 3.
α. Panicum spiculis spicatis scabritie adhærentibus.
Linn. b. Cliff. 27. *Act. stokb.* 1741. p. 183.
Gramen paniceum, spica aspera. *Baub. pin.* 8.
theatr. 139. t. 139.
β. Panicum vulgare, spica simplici vestibibus non ad-
hærente. *Dalib. par.* 21.
γ. Glumis muticis, nullatenus aristatis.
*Gemeen in de Moesboven, en van zelfs op de Broey-
bedden.*
α. *Habet glumas aristatas; aristæ bamis armantur, qui
versus aristarum basin reflectuntur. β. Hami arista-
rum versus earundem apicem inflectuntur.*
57. PANICUM spicis alternis conjugatisque, spiculis *Crus gall.*
subdivisis, glumis aristatis hispidis: rachis quin-
quangulari. *Sp.* 83. n. 8. *Gelr.* 35. *Fryf.* 28.
Gramen paniceum, spica divisa. *Baub. pin.* 8.
Comm. boll. 54. *Moris. bist.* 3. p. 189. f. 8. t. 4. f. 15.
β. Gramen paniceum, spica aristis longis armata.
Baub. pin. 8. *Comm. boll.* 54. *Moris. bist.* 3. p. 189.
f. 8. t. f. 16.
Wild Panik - Koorn. Belg.
γ. Gramen sorghi effigie. *Lob. ic.* 5.
Gramen sorghi panicula erectum. *Baub. pin.* 8
Comm. boll. 55.

B

Sorgb.

Sorgb-Zaad - Gras. Belg.

In de Hoven en Moes-boven, en andere bebouwde gronden. β. omtrent het Oranje-wout tusschen het koorn. γ. op dorre zandige velden.

D. RAINVILLE *in borto ampliff. Viri Consularis*

D. VAN DER HEIM *varietatem hujus reperit vere giganteam, quæ ad altitudinem 5 & 6 pedum excreverat.*

sanguinalis. 58. *Panicum spicis digitatis basi interiore nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. Sp. 84. n. 13. Gelr. 36. Schreb. gram. 119. t. 16. Gramen dactylon, folio latiore. Baub. pin. 8. theatr. 114. Comm. boll. 53.*

Oed. dan. t. 388.

Komt van zelfs voort in de Hoven.

P H L E U M.

gracile. 59. *Phleum spica cylindrica longissima ciliata, culmo erecto. Sp. 87. n. 1. Gelr. 30. Frisf. 29. Schreb. gram. 103. t. 14.*

Gramen typhoides asperum primum. Baub. pin. 4. theatr. 51. Comm. boll. 48.

β. *Gramen typhoides maximum, spica longissima. Baub. pin. 4. prodr. 10. theatr. 49. Comm. boll. 48. Morif. bist. 3. p. 193. f. 8. t. 4. f. 1.*

Langs de Wegen en in zandige Weilanden op verscheide plaatsen.

Varietas minor, rigidior, spica brevior, occurrit in Sabulosis Dunis circa Harlemum & Scheveningam. Ill. HALLERUS bist. 1528. & 1531. ex hoc Phleo duas facit species.

nodosum. 60. *Phleum spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. Sp. 88. n. 2. Phleum spica cylindracea brevi, radice nodosa. Berg viad. 318.*

Gramen typhoides asperum alterum. Baub. pin. 4. theatr. 52.

Gramen nodosum, spica parva. Baub. pin. 2. prodr. 3. theatr. 20. Comm. boll. 47. Morif. bist. 3. p. 194. f. 8. t. 4. f. 3.

Oed. dan. t. 380.

γ. *Gramen typhoides culmo reclinato. Baub. pin. 4. Comm. boll. 49.*

Gramen cum cauda muris, foliis hirsutis. Baub. bist.

bist. 2. p. 471.

Buiten Haarlem aan de zandige wegen, en op ruwe plaatsen.

61. PHLEUM spica ovata ciliata, culmo ramoso. *Sp. arenarium.*

88. n. 4. *Gelr.* 31.

Gramen typhinum maritimum minus. *Raf. syn.* 392.

Pluk alm. 177. t. 33. f. 8.

In de Zee-duinen.

A L O P E C U R U S .

62. ALOPECURUS culmo spicato erecto, glumis *pratenfis.*

villosis, corollis muticis. *Sp.* 88. n. 1. *Gelr.* 32.

Fris. 30. *Schreb. gram.* 133. t. 19. f. 1.

Gramen phalaroides, spica molli f. germanicum.

Baub. pin. 4. *prodr.* 10.

Gramen myurum, spica molli candicante villosa.

Scheuch. gram. 70.

Gramen typhoides molle. *Baub. pin.* 4. *Comm. boll.*

48. *secundum Hall.* bist. 1539.

Gramen typhoides spica angustiore. C. B. *Comm.*

boll. 48.

Op zandige wegen en ruwe plaatsen, omtrent Haarlem, Zwol, en elders; ook in Weilanden even buiten Franeker.

63. ALOPECURUS culmo spicato erecto, glumis *agrestis.*

lævibus. *Sp.* 89. n. 2.

Alopecurus myosuroides. *Schreb. gram.* 140. t. 19. f. 2

Gramen typhoides, spica angustiore. *Baub. pin.* 4.

theatr. 53.

Oed. dan. t. 228.

In de Koornlanden te Maarssen. (*Nob. D. FABRICIUS SIX.*)

64. ALOPECURUS culmo spicato infracto, corollis *geniculatus*

muticis. *Sp.* 89. n. 3. *Gelr.* 33.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *Baub.*

pin. 3. *theatr.* 42. *Comm. boll.* 48.

Oed. dan. t. 564.

Veel in de Moerassen.

65. ALOPECURUS panicula subspicata, glumis villosis, corollis aristatis. *Sp.* 90. n. 5.

B z

Gra.

Gramen panicum f. Panicum sylvestre simplici
spica. C. B. Comm. boll. 54.

Gramen alopecurinum minus, spica virecente
divulsa. Barr. ic. 115. f. 2.

*In de Hoven en Moesboven, en andere bebouwde
gronden.*

III. LINNÆUS banc plantam olim ad Cynosuros retu-
lit, et omnino alia adposuit synonyma, quæ nunc ad
Panicum verticillatum & Panicum viride amanda-
vit; quare ad evitandam confusionem plura non ad-
duxi synonyma.

M I L I U M.

effusum.

66. MILIUM floribus paniculatis dispersis muticis.
Sp. 90. n. 1. Gelr. 37. Frisf. 31.

Gramen sylvaticum, panicula miliacea sparsa.
Baub. pin. 8. theatr. 141. Comm. boll. 55. Morisf.
bist. 3. p. 197. f. 8. t. 5 f. 10.

Hirs-Gras, Zaad-Gras. Belg.

*In den Enck by Harderwyk; in den Haarlemmer
Hout; in de Hooilanden om Utrecht; en in Fries-
land; ook op veele andere plaatsen in de bosschen,
en by de Wegen.*

A G R O S T I S.

spica venti. 67. AGROSTIS petalo exteriore arista erecta stricta
longissima, panicula patula. Sp. 91. n. 1. Gelr. 39.
Frisf. 32.

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa. C. B.
Comm. boll. 47. Scheuch. gram. 144. t. 10. f. 3.

*In de Koornlanden onder de Haver en Garst; over-
vloedig omtrent Heemstede in Holland, en by
Duirswoude, Haule, Wyfel, Kooten, &c. in
Friesland.*

solonifera. 68. AGROSTIS panicula ramulis patentibus muticis,
culmo repente, calycibus æqualibus. Sp. 93. n.
8. Gelr. 38. Jngr. 10.

Gramen caninum supinum minus. Scheuch. gram.
128 non C. B.

*Veel in de Duinen buiten Haarlem, en by Scheve-
ningen.*

III. HALLERUS bist. 2. p. 223. ex fide borti ficci C.
B.

TRIANDRIA DIGYNIA.

21

B. monet Gramen caninum supitum, *idem esse cum*
Gramine pratensi paniculato minore, seu Poa
annua.

69. AGROSTIS panicula capillari patente, calycibus *capillaris.*
subulatis aequalibus hispidiusculis coloratis, fl-
sculis muticis. *Sp. 93. n. 9. Jngr. 10. Stillingfl.*
misc. t. 3.

Gramen montanum panicula spadicea delicatiore.

Baub. pin. 3. prodr. 12. theatr. 36. Scheuch.

gram. 129. t. 3. f. 5.

Oed. dan. t. 163.

Aan een sloot langs de Meerburger-Watering buiten
Leyden; dog meer aan de slooten, loopende bezyaen
de Leede naar de Zyl. (Cel. D. VAN ROYEN.)

In 't Haagsche Bosch; by Zorgvliet; aan de weg
tusschen Gouda en Bodegrave. (D. RAINVILLE.)

Gramen bocce vel e longinquo se prodit herba suatissi-
ma virente, panicula vero purpureo-pulla. (Cel.
D. VAN ROYEN.)

70. AGROSTIS panicula coarctata mutica, calycibus *sylvatica.*
æqualibus virgineis corolla brevioribus foecun-
datis duplo longioribus. *Sp. 1665.*

Gramen miliaceum sylvestre, glumis oblongis.

Raj. angl. 3. p. 404.

In 't Haagsche-Bosch. (D. RAINVILLE.)

71. AGROSTIS panicula laxa, calycibus muticis *alba.*
æqualibus, culmo repente. *Sp. 93. n. 10.*

Gramen miliaceum majus, panicula spadicea &
viridi. *Pet. gram. 118. 119. Raj. angl. 3. p. 404.*

In 't Haagsche-Bosch, te Voorburg. (D. RAIN-
VILLE.)

72. AGROSTIS flosculis oblongis mucronatis, culmo *serotina.*
obtecto foliis brevissimis. *Mant. 30.*

Festuca serotina. *Sp. 111. n. 16.*

Gramen loliaceum serotinum, panicula dispersa.

Segu. ver. 3. p. 146. t. 3. f. 2.

Te Zorgvliet by s' Hage. (D. RAINVILLE.)

A I R A.

73. AIRA panicula patente, corollis muticis lævibus *aquatica.*

B 3

ca-

calyce longioribus, foliis planis. *Sp.* 95. n. 6.
Gelt. 42. *Jagr.* 11.

Gramen caninum supinum paniculatum dulce. *Baub.*
pin. 1. *prodr.* 2. *theatr.* 13. *Baub. bist.* 2. p. 459.
Comm. boll. 45.

Oed. dan. t. 381.

In vochtige Bouw- en Weilanden.

subspicata. 74. *AIRA* foliis planis, panicula spicata, flosculis
medio aristatis: arista reflexa laxiore. *Sp.* 95.
n. 7.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum humile,
locustis in spicam collectis varicoloribus aristatis.
Scheuch. gram. 221. *Baub. prodr.* 24. t. 6.

Oed. dan. t. 228.

Op de Duinen by Hillegom. (D. RAINVILLE.)

Pleraque Airæ aristatæ habent aristam dorsalem con-
tortam, adeoque vix genere ab Avena distinguendæ.

caespitosa. 75. *AIRA* foliis planis, panicula patente, petalis basi
villosis aristatisque: arista recta brevi. *Sp.* 96. n. 8.

Gramen segetum panicula arnudinacea. *C. B. Comm.*
boll. 47. *Scheuch. gram.* 244. t. 3. f. 2. 3.

Oed. dan. t. 240.

Aan de kanten van de Bouw- en Weilanden.

flexuosa. 76. *AIRA* foliis setaceis, culmis subnudis, panicula
divaricata, pedunculis flexuosis. *Sp.* 96. n. 9.

Gramen nemorosum, paniculis albis, capillaceo
folio. *Baub. pin.* 7. *prodr.* 14. *Morif. bist.* 3. p.
200. f. 8. t. 7. f. 9.

Oed. dan. t. 157.

Op de Heide by Nymegen; en overvloedig in den
Haarlemmer-hout, en in de Duinen by Haarlem.

Cl. SCHEUCHZER Agrost. p. 218. dicit aristam prodire
ex basi dorsi etterioris petali; sed in nostra planta,
arista supra basin e dorso petali exit.

montana. 77. *AIRA* foliis setaceis, panicula angustata, floscu-
lis basi pilosis aristatis: arista tortili longiore.
Sp. 96. n. 10. *Stillingfl. gram.* t. 4.

Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis.
Baub. pin. 10. *theatr.* 155. *Comm. boll.* 55.

Overvloedig op de Heide buiten Nymegen en Gro-
nningen; ook op Muiderberg, en in den Haarlem-
mer-hout.

78. *Ar-*

TRIANDRIA DIGYNIA.

23

78. *AIRA* foliis setaceis, summo spathaceo panicula inferne obvolvente. *Sp.* 97. n. 12. *Gelr.* 41. *Gramen* foliolis junceis oblongis, radice alba. *Baub.* pin. 5. *theatr.* 72. *Comm. boll.* 49. *Morif. bist.* 3. p. 200. f. 8 t. 3. f. 10. *Scheuch. gram.* 242. t. 4. f. 29. 30.
- β. *Gramen* sparteum variegatum. *Baub.* pin. 5. *theatr.* 72. *Comm. boll.* 49.
- Op's Heeren-Loo by Harderwyk, en overvloedig langs 't Voetpad in den Haarlemmer-hout naar Heemstede, op koude donkere plaatsen. β. In de Duinen niet verre van Zandvoort.*
79. *AIRA* foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. *Sp.* 97. n. 14. *Stillingfl. miscell.* t. 5. *Caryophyllus arvensis* glaber minimus. *Baub. prodr.* 105. *Oed. dan. t.* 382. *Langs de zandige wegen by Velzen buiten Haarlem. (D. FABRICIUS SIX.) In de Duinen by 's Gravenhage omtrent Langenhorst. (Hortulanus MEERBURG.)*

M E L I C A.

80. *MELICA* panicula coarctata, floribus cylindricis. *carulea. Mant.* 335. *Aira carulea. Sp.* 95. n. 3. *Fris.* 33. *Belg.* 64. *Gramen* arundinaceum enode minus sylvaticum. *Baub.* pin. 7. *theatr.* 97. *Oed. dan. t.* 239. *In de Duinen en Weilanden by Velzen; veel in vochtige landen by den Yssel in 't Graafschap Zutphen, en aan de gemeene wegen en velden zo op de Kley, als in de Wouden in Friesland.*

P O A.

- 81 *Poa* panicula diffusa, spiculis sexfloris lineari-bus. *Sp.* 98. n. 1. *Gelr.* 44. *Fris.* 34. *Gramen* palustre paniculatum altissimum. *Baub.* pin. 2. *theatr.* 38. *Comm. boll.* 47. *Scheuch. gram.* 191. t. 4. f. 1. *Aan de kanten van Vaarten, Graften en Slooten, en in*

in natte Landen op zeer veele plaatsen.

- aristalis.* 82. Poa panicula diffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. *Sp.* 99. n. 4. *Gelr.* 613.
Gramen pratense paniculatum medium. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 30. *Comm. boll.* 47.
In de Weilanden.
Variat altitudine ratione folii.
- angustifolia* 83. Poa panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. *Sp.* 99. n. 5. *Gelr.* 614.
Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. *Baub. pin.* 2. *prodr.* 5. *theatr.* 29.
Gemeen in de Weilanden en by de wegen.
Variat longitudine culmorum, foliis levibus aut asperis; culmis foliis & glumis viridibus aut purpureis.
- pratensis.* 84. Poa panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Sp.* 99. n. 6. *Gelr.* 611. *Frif.* 12. *Frif.* 35.
Gramen pratense paniculatum majus latiore folio, Poa theophrasti. *Baub. pin.* 2. *Comm. boll.* 47.
Eerst of gemeen Beemdt-Gras. Belg.
Niets gemeener in vette Weilanden.
Variat magnitudine & crassitie omnium partium.
- annua.* 85. Poa panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Sp.* 99. n. 7. *Gelr.* 612. *Frif.* 36.
Gramen pratense paniculatum minus. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 31. *Comm. boll.* 47. *Scheuch. gram.* 189. t. 3. f. 17. E.
Still-ingfl. t. 7.
Zeer veel langs de Wegen en Paden, en aan Wallen, en tusschen de Steenen der Straaten.
- compressa.* 86. Poa panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso. *Sp.* 101. n. 16. *Gelr.* 610. *Frif.* 37.
Gramen murorum, radice repente. *Baub. pin.* 2. *prodr.* 2. *Comm. boll.* 46.
Gramen paniculatum, radice repente, culmo compresso. *Vaill. par.* 91. n. 63. t. 8. f. 5.
Aan 't Huis te Brederode in Holland, en elders op oude

oude muuren en steenachtige plaatsen; ook aan drooge wallen en wegen buiten Franeker.

87. *Poa panicula* coarctata, calycis altera valvula *maritima*.
duplo longiore, furculis prostratis.

Te Delfzyl op de Wallen, en noch meer op het Zand langs den Dollart. (D. RAINVILLE.)

E Radice fibrosa plures prodeunt furculi articulati, saepe geniculati, bumi prostrati, ad summum usque striatis foliorum vaginis vestiti. Folia oblongo lanceolata striata. Culmus terminatur panicula oblonga, cujus rami ante florescentiam culmo approximantur, tempore florescentiae ad angulum rectum recedunt, & post foecundationem saepe versus radicem reflectuntur. Paniculae rami sunt bini & alterni; quandoque tertius adest ramulus brevius pedunculatus. Glumae margine scarisae. Calyx 6-12 florus. Gramen huic omnino simile, eodemque nomine insignitum, sed aliunde allatum Clar. D. BANKS dedit D^{no} RAINVILLE.

88. *Poa panicula* attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo incurvo. *Sp.* 93. n. 18.

Gramen paniculatum angustifolium alpinum, locustis rarioribus & angustioribus non aristatis. Scheuch. gram. 164. t. 2.

In de Velden buiten Nymegen; ook op de Muuren van de Kerk te Perlingen. (D. RAINVILLE.)

Calyx 2, 3, 4, 5 florus.

89. *Poa panicula* patentiuscula secunda, spiculis *bulbosa* quadrifloris. *Sp.* 102. n. 19.

Gramen arvense, panicula crispa. Baub. pin. 3. Boerb. lugdb. 2. p. 162. n. 6. Barr. ic. 703.

Gramen cum panicula molli rubente. Baub. bist. 2. p. 464.

† Volgens BOERHAAVE.

90. *Poa panicula* spicata, floribus subulatis, flosculis remotis. *Mant.* 32.

Op de Wallen en onder aan de Muuren in 't Zand te Delfzyl aan den Dollart; ook by Franeker. (D. RAINVILLE.)

91. *Poa panicula* spicata, calycibus subpilosis sub-

B 5

qua-

quadrifloris pedunculo longioribus, petalis aristatis. *Syst.* 94.

Aira cristata Sp. 94. n. 2.

Gramen spica cristata subhirsutum. *Baub. pin.* 13. *prodr.* 8. *Morif. bist.* 3. p. 194. f. 8. t. 4. f. 7.

Gemeen in de Duinen by 's Hage, Hillegom, Haarlem.

B R I Z A.

media. 92. *BRIZA* spiculis ovatis, calyce flosculis (7) brevior. Sp. 103 n. 3. *Gelr.* 48.

Gramen tremulum majus. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 22. *Oed. dan.* t. 258.

Trillend - Gras. Belg.

Veel op zandige plaatsen by 't Huis te Dorth in 't Graafschap Zutphen; by Wageningen; en buiten Alkmaar tusschen Egmond op den Hoef en Bergen.

D A C T Y L I S.

glomerata. 93. *DACTYLIS* panicula secunda glomerata. Sp. 103. n. 2. *Gelr.* 47. *Fris.* 38. *Schreb. gram.* 68. t. 8. f. 2.

Gramen spicatum, folio aspero. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 9. *theatr.* 45. *Morif. bist.* 3. p. 202. f. 8. t. 6. f. 38.

Op de Wallen te Amsterdam, Wyk by Duurstede, Zwol, en aan drooge Wallen en kanten van Koornvelden om Franeker, en op andere plaatsen.

C Y N O S U R U S.

cristatus. 94. *CYNOSURUS* bracteis pinnatifidis. Sp. 105. n. 1. *Fris.* 39. *Schreb. gram.* 69. t. 8. f. 1.

Gramen pratense cristatum f. spica cristata. *Baub. pin.* 2. *prodr.* 8. *theatr.* 42. *Comm. boll.* 48.

Oed. dan. t. 238.

Stillingfl. misc. t. 11.

Buiten Haarlem, in de zandige Weilanden aan het Spaarne; ook veel in Friesland.

F E S T U C A.

ovina. 95. *FESTUCA* panicula secunda coarctata aristata, cul-

- culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. *Sp.*
108. n. 1. *Gelr.* 43. *Fris.* 41.
- Gramen foliis junceis brevibus majus, radice nigra.
Baub. pin. 5. prodr. 24.
- Gramen foliolis junceis brevibus minus. C. B.
Comm. boll. 50.
- Gramen cristatum, radiculis nigricantibus. *Loef.*
pruss. 110. t. 24.
- Stillingfl. misc.* t. 8.
- Amelands-Gras.* Frisiis.
- Veel op de Heide buiten Nymegen, Harderwyk,*
Naarden, &c. op dorre zandige plaatsen in het
Veld aan den Haarlemmer-hout; aan de Zee-kust
in Friesland; en veel in dorre Zandgronden op
Ameland.
- Arista flosculorum fragiles, post foecundationem eva-*
nescent.
- Culmus in juniore planta striatus, hispidus, in adul-*
tiori cylindricus & laevis est.
96. *FESTUCA* panicula secunda oblonga, spiculis *dariuscula.*
oblongis laevibus, foliis setaceis, *Sp.* 108. n. 3.
Gramen foliolis junceis brevibus minus. *Baub.*
pin. 5.
- Gramen pratense, panicula duriore laxa unam
partem spectante. *Raj. bist.* 1286. *angl.* 3. p. 4:3.
t. 19. f. 1.
- Langs de Meerburger-Watering tegens de Kaadyk,*
en aan de Vliet by Lammen buiten Leyden. (Cel.
D. VAN ROYEN.) tusschen het Gras by het Huis
te Zwieter. (Hortulanus MEERBURG.)
97. *FESTUCA* panicula spicata, calycibus minutissi- *Myurus.*
mis muticis, floribus scabris: aristis longis. *Sp.*
109. n. 8.
- Gramen avenaceum murorum, spica longissima
nutante aristata. *Morif. bist.* 3. p. 215. f. 8. t. 7.
f. 43.
- Zeer gemeen te Leyden op de Stads-muur tusschen de*
Witte en Koepoorten. (Cel. D. VAN ROYEN.) op
Zandige plaatsen by Nymegen. (D. RAINVILLE)
98. *FESTUCA* panicula erecta, spiculis subovatis mu- *decumbens.*
ticis, calyce flosculis majore, culmo decumben-
te.

te. *Sp.* 110. n. 12.

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *Raj. angl.* 3. p. 408. *bist.* 1288.

Pluk. alm. 174. t. 34. f. 1.

Oed. dan. t. 162.

In het Zand tusschen Nymegen en Hulsen; ook by Franeker. (D. RAINVILLE.)

- elatior.* 99. *FESTUCA* panicula secunda erecta, spiculis subaristatis: exterioribus teretibus. *Sp.* 111. n. 13.
Frif. 43. *Schreb. gram.* 34. t. 2.
 Gramen loliaceum, spica divisa, pratense majus.
Morif. bist. 3. p. 183. f. 8. t. 2. f. 15.
 Menigvuldig in Weilanden en langs de Wegen.

- fluitans.* 100. *FESTUCA* panicula ramosa erecta, spiculis subseffilibus teretibus muticis. *Sp.* 111. n. 14. *Gelr.* 46. *Frif.* 42. *Schreb. gram.* 37. t. 3.
 Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica.
Baub. pin. 2. *theatr.* 41. *Comm. boll.* 48.
Stillingfl. misc. t. 20.
Oed. dan. t. 237.
 Vlot-Gras. Belg.
 In stilstaande Wateren en Slooten op veele plaatsen.

B R O M U S*.

- secalinus.* 101. *BROMUS* panicula patente, spiculis ovatis, aristis rectis, feminibus distinctis. *Sp.* 112. n. 1.
 a. *Festuca* graminea, glumis hirsutis. *Baub. pin.* 9. *theatr.* 143. *Comm. boll.* 37. *Scheuch. gram.* 250.
Dravik. Belg.
 ß. *Bromus* (hordeaceus) panicula erecta coarctata.
Sp. 1. p. 77. n. 8. *Frif.* 45.
 c. Gemeen in de Koornlanden onder de Rogge en Haver. p. Aan booge drooge Wallen op veele plaatsen.
- mollis.* 102. *BROMUS* panicula erectiuscula, spicis ovatis pubescentibus, aristis rectis, foliis mollissime villosis. *Sp.* 112. n. 2. *Schreb. gram.* 60. t. 6.
 Gramen avenaceum pratense, panicula squamata &

* Genus hoc difficilius discernendum summo studio extricavit Cl. C. E. WEIGEL, Medicus Suudenfis. *Observ. botan. Gryphia.* 1772. 4°.

TRIANDRIA DIGYNIA. 29

& villosa. *Morif. bist.* 3. p. 213. f. 8. t. 7. f. 18.
*In meenigte omtrent Amsterdam, vooral buiten de
 Muiderpoort aqn den Zee - dyk. (Nob. D. FA-
 BRICIUS SIX.)*

103. *BROMUS* panicula patula, spiculis oblongis *sterilis*.
 distichis, glumis subulato-aristitatis *Sp.* 113. n. 6.
Festuca avenacea sterilis elatior. Baub. pin. 9.
Morif. bist. 3. p. 212. f. 8. t. 7. f. 11.
*In den Haarlemmer-hout, en aan den Weg tusschen
 's Hage en Voorburg.*

104. *BROMUS* panicula nutante, spiculis ovato-ob- *aryensis*.
 longis. *Sp.* 113. n. 7. *Gelr.* 50.
Festuca graminea, juba effusa. Baub. pin. 9. *prodr.*
19. Scheuch. gram. 262. t. 5. f. 15.
*Festuca avenacea sterilis elatior seu Bromos dio-
 scoridis. C. B. Comm. boll.* 37.
Oed. dan. t. 293.
Naakte of Ydele Haver. Belg.
In de Zaaïlanden onder de Haver en Garst.

105. *BROMUS* panicula nutante, spiculis linearibus. *testorum*.
Sp. 114. n. 8.
Festuca avenacea sterilis, spicis erectis. Raj. angl.
3. p. 413. Pluk. alm. 174. t. 299. f. 2.
*Festuca avenacea sterilis, pediculis brevioribus
 & spicis erectis. Morif. bist.* 3. p. 212. f. 8. t.
 7. f. 13.
*Op de daken der boere-wooningen, op oude muuren
 en dorre plaatsen, veel omtrent Haarlem, en te
 Zutphen.*

106. *BROMUS* panicula nutante, spiculis quadrifloris: *giganteus*.
 aristis brevioribus. *Sp.* 114. n. 12. *Schreb. gram.*
 88. t. 11.
Gramen sylvaticum glabrum, panicula recurva.
Vaill. par. 93. t. 18. f. 3.
*Hier en daar in 't Haagſche-Bosch. (Cel. D. VAN
 ROYEN.) by het Huis ten Donk te Overmaas,
 en op Boschjes-Eiland by Rotterdam. (D. RAIN-
 VILLE.)*

107. *BROMUS* racemo simplicissimo, pedunculis uni- *racemosus*.
 floris, floribus sexfloris laevibus aristatis. *Sp.* 114.
 n. 13. Fe-

Festuca avenacea spicis strigofloribus e glumis
glabris compactis. *Raj. angl.* 3. p. 414.
Op de Wallen te Nymegen. (D. RAINVILLE.)

- pinnatus* 108. *BROMUS* culmo indiviso, spiculis alternis sub-
sessilibus teretibus subaristatis. *Sp.* 115. n. 14.
Gelr. 51.
Gramen, spica brizæ, majus. *Baub. pin.* 9. *prodr.*
19. *theatr.* 133. *Baub. bist.* 2. p. 477. *Comm.*
boll. 55.
Oed. dan. t. 164.
In de zandige Weilanden by den Haarlemmer - hout,
en elders.

A V E N A.

- olator.* 109. *AVENA* paniculata, calycibus bifloris, flosculo
hermaphrodito submutico, masculo aristato.
Sp. 117. n. 2. *Gelr.* 55. *Schreb. gram.* 25. t. 1.
Gramen nodosum, avenacea panicula. *Baub. pin.*
2. *theatr.* 18. *Scheuch. gram.* 239. t. 4. f. 27. 28.
Oed. dan. t. 165.
Op verscheide plaatsen in de Velden onder andere
Grazen.
- laeflingiana* 110. *AVENA* panicula contracta, flosculis binis, al-
tero pedunculato, apice biaristatis, dorso ari-
sta reflexa. *Sp.* 118. n. 4.
Overvloedig in 't Haagsche-Bosch onder de boomen;
en op de Duinen, by 't Dorp Hillegom, alwaar
het Zand met mosch bedekt is. (D. RAINVILLE.)
Planta nostra omnibus characteribus convenit cum de-
scriptione ab Ill. LINNÆO in Spec. plant. data;
sed major est, interdum spithama longitudine.
- nuda.* 111. *AVENA* paniculata, calycibus trifloris receptacu-
lo calycem excedente, petalis dorso aristatis,
tertio flosculo mutico. *Sp.* 118. n. 6.
Avena nuda. *Baub. pin.* 23. *Dod. pempt.* 511.
Comm. boll. 15. *Morif. bist.* 3. p. 209. f. 8. t. 7.
f. 4.
Naakte Haver. Belg.
Buiten Haarlem aan den weg naar Overveen.
Locum crescenti ex Commelino mutuari, sed ego ibi
de m

TRIANDRIA DIGYNIA.

31

dem eam non vidi: et an vere indigena apud nos sit, dubito.

112. *AVENA* paniculata, calycibus subtrifloris, flosculis omnibus aristatis, receptaculis barbatis. *sesquiteria.*

Mant. 34.

Gramen pratense villosum panicula densa ex argenteo dilute spadicea f. fusca. *Sebeuch. gram.*

220. t. 4. f. 17. A. B.

By Haarlem. (D. RAINVILLE.)

III. HALLERUS *bist.* 1497. habet pro *Varietate Avenæ flavescentis.*

113. *AVENA* paniculata, calycibus trifloris, flosculis omnibus aristatis basi pilosis. *Sp.* 118. n. 7. *Gelr.*

54. *Schreb. gram.* 109. t. 15.

Festuca urticulis lanugine flavescentibus. *Baub.*

pin. 10. *theatr.* 149. *Comm. boll.* 27.

Onder de Rogge, Haver en Garst; als ook in de Tabaks-landen.

114. *AVENA* panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. *Sp.* 118. n. 9.

Schreb. gram. 72. t. 9.

Gramen avenaceum spica sparsa flavescente, locustis parvis. *Morif. bist.* 3. p. 215. f. 8. t. 7. f. 42.

In de Heide by Nymegen, en op de Muur van den Hoogendyk by Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

L A G U R U S.

115. *LAGURUS* spica ovata aristata. *Sp.* 119. n. 1. *ovatus.*

Schreb. gram. 143. t. 19. f. 3.

Alopecurus genuina. *Morif. bist.* 3. p. 191. f. 8. t. 4. f. 1.

Gramen alopecuroides, spica rotundiore. *Baub.*

pin. 4. *theatr.* 56. *Boerb. lugdb.* 2. p. 158. n. 7.

† Volgens BOERHAAVE.

A R U N D O.

116. *ARUNDO* calycibus quinquefloris, panicula laxa. *phragmites* *Sp.* 120. n. 3. *Gelr.* 56. *Fris.* 48.

Arundo vulgaris f. *phragmites* *dioscoridis.* *Baub.* *pin.*

pin. 17. *Comm. boll.* 13.

Arundo vulgaris palustris. Baub. bist. 2. p. 485.

Morif. bist. 3. p. 218. f. 8. t. 8. f. 1.

Gemeen Riet of Dek-Riet. Belg.

Overvloedig langs de Rivieren, Meiren, Vaarten, Graften en Slooten, en in veele laage Landen.

epigeos. 117. *ARUNDO calycibus unifloris, panicula erecta, foliis subtus glabris. Sp. 120. n. 4.*

Gramen montanum, panicula flavescente, modo aristata, modo aristis carente. Mont. gram. 58. f. 86.

In de Duinen buiten 's Hage tusschen de Helm. (Hortul. MEERBURG.)

Calamagrostis. 118. *ARUNDO calycibus unifloris lævibus, corollis lanuginosis, culmo ramoso. Sp. 121. n. 5.*

Gramen arundinaceum, panicula molli spadicea, majus. Baub pin. 7. theatr. 94. Comm. boll. 52. Scheuchb. gram. 222. t. 3. f. 5.

Oed. dan t. 280.

Pluim-Riet-Gras. Belg.

In vette vogtige Akkers en Velden by Delft, en in de Betuwe; ook te Zorgvliet by 's Gravenhage.

Variat magnitudine & crassitie totius plantæ, tum & colore paniculæ viridi, purpureo, rubiginoso &c.

arenaria. 119. *ARUNDO calycibus unifloris, foliis involutis mucronato-pungentibus. Sp. 121. n. 6. Gels. 18. Frif. 49.*

Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis longioribus f. spica secalina. Baub. pin. 5. theatr. 67. Comm. boll. 49.

Helm. Belg.

β. *Gramen sparteum spicatum latifolium. Baub. pin. 5. theatr. 68. Comm. boll. 49.*

Duin-Helm. Belg.

γ. *Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis brevioribus. Baub. pin. 5. Comm. boll. 49.*

δ. *Gramen sparteum f. Spartum maximum maritimum hollandicum, spica secalina. Raj. bist. 1260. Morif. bist. 3. p. 180.*

Op veele plaatsen in de Zee- en Binnen-Duinen. β. Digt aan het Zee-strand by Zandvoort, op de Dui.

Duinen; als ook in 't Aanstooter-Zand op de Veluwe. *γ.* By en onder de voorige by Heemstede in de Duinen. *δ.* By Scheveningen. *Vide Morif. l. c.*

Habitat etiam hæc planta in mari prope Stauriam Frisæ, ubi habetur pro Tritico sterili, quod fabulantur ortum esse ex frumento luxuriose ibidem in mare projecto. Vide, si lubet, Cbr. Schotani Kerkeleyke en Weereldlyke Geschiedenis van Friesland, VI. Boek, p. 195. F. Sjoerd's Histor. Jaarboeken van Friesland. I. Deel. p. 94. en II. Deel. p. Nieuwe Vaderlandsche Letteroeff. III. Deel. p. 552.

Magni usus in Belgio planta ad domandam dunarum arenam mobilem.

L O L I U M.

120. *LOLIUM* spica mutica: spiculis compressis multifloris. *Sp. 122. n. 1. Gelr. 60. Frif. 50.*

Gramen loliaceum, angustiore folio & spica. Baub. pin. 9. theatr. 127. Comm. boll. 53. Morif. bist. 3. p. 182. f. 8. t. 2. f. 2.

Muisen-Koorn. Belg.

β. *Gramen loliaceum majus, spicis rarius dispositis. Park. theatr. 1146. Morif. bist. 3. p. 182. f. 8. t. 2. f. 2. a.*

Gramen loliaceum majus, spicis longius distantibus. Tourn. inst. 516.

γ. *Gramen loliaceum spicis brevioribus & latioribus compressis. Morif. bist. 3. p. 182. f. 8. t. 2. f. 2. b.*

Gramen loliaceum spica lata ex plurimis spicis duplici versis dispositis constante. Scheuch. gram. t. 1. f. 7. D.

δ. *Gramen loliaceum, f. Phoenix multiplici spicata panicula. Park. theatr. 1145. Morif. bist. 3. p. 182. f. 8. t. 2. f. 2. c.*

Gramen loliaceum, panicula multiplici & spicata. Tourn. inst. 516.

In de Zaailanden en langs de Wegen zeer menigvuldig. β. Veel in de Weilanden om Rotterdam. γ. Gemeen op de Dyken aldaar. δ. Op vochtige en schaduwagtige plaatsen, alwaar een vette grond is. Nullum in Belgio est Gramen, quod tot admittit

varietates lususque naturæ, quam hoc *Lolium* perenne. Variat foliis latioribus & angustioribus; spica latiore, strictiore, bifida, paniculata; spiculis crassioribus, tenuioribus, longioribus, brevioribus, ovatis, obtusis, aggregatis, simplicibus, oppositis, versus unum latus intortis seu veluti secundis; calyce spiculam æquante aut superante, aliisque vix definiendis modis. Præcipuas harum varietatum, numero sexdecim, mecum communicavit D. RAINVILLE, qui et ad me misit Gramen a se lectum in muro vetusto aggeris alti prope Villam Donk extra Rotterdamum, quod facie suâ exteriore *Lolio* perenni quam simillimum est, sed calyce bivalvi et flosculis subsessilibus instructum, adeoque ad *Festucas* referendum: an hoc sit nova *Festuca* species, vel planta hybrida ex patre *Lolio* perenni et matre forte *Festuca* quadam, ulterius inquirendum.

tenua.

121. *LOLIUM* spica mutica tereti: spiculis trifloris.

Sp. 122. n. 2.

Graminis loliacei angustiore folio & spica varietas.

Baub. pin. 9. spica tereti angustissima. Scheuch. gram. 28.

Te Nymegen op de Wallen onder de groote boomen in de schaduwe. (D. RAINVILLE.)

tenu-
tum.122. *LOLIUM* spica aristata: spiculis compressis multifloris. Sp. 122. n. 3. Gelr. 59. Fris. 51.Gramen loliaceum, spica longiore, f. *Lolium* dioscoridis. Baub. pin. 9. theatr. 121. Comm. bol. 53. Scheuch. gram. 31. t. 1. f. 7. E. F.

Oed. dan. t. 160.

Dolyk. Belg.

In de Koorn-landen tusschen de Haver en 't Vlas.

E L Y M U S.

arenarius.

123. *ELYMUS* spica erecta arcta, calycibus tomentosis flosculo longioribus. Sp. 122. n. 1.

Triticum foliis acuminatis pungentibus. Roy. lugdb. 71.

Gramen caninum maritimum, spica triticea nostras.

Raj. bist. 1256. Scheuch. gram. 6.

Zee-Haver. Gelris.

Over-

Overvloedig aan de Zeekant by Harderwyk, en in de Zee - Duinen van Holland.

An hoc referendum Gramen caninum maritimum spicatum C. B. & Gramen caninum maritimum spica foliaceâ. C. B. *Comm. boll.* 46? sed synonymum I. B. et nomen belgicum obstat.

H O R D E U M.

124. HORDEUM flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis. *Sp.* 126. n. 6. *Gelr.* 66. *Fris.* 53.

Gramen hordeaceum minus & vulgare. *Baub. pin.* 8. *theatr.* 134. *Comm. boll.* 54.

Gramen fecalinum vulgatissimum viarum. *Morif. bist.* 3. p. 179. f. 8. t. 6. f. 4.

Bastard - Garst. Belg.

- β. Gramen spicatum fecalinum minus. *Scheuch. gram.* 17. *Vaill. par.* 83. t. 17. f. 6.

Overvloedig langs de wegen, paden, muuren, aan booge drooge Wallen, en in dorre Weilanden.

T R I T I C U M.

125. TRITICUM calycibus quadrifloris ventricosis villosis imbricatis obtusis. *Sp.* 126. n. 3. *Triticum spica villosa quadrata brevior & turgidior.* *Morif. bist.* 3. p. 175. f. 8. t. 1. f. 8.

In en om Nymegen op verſcheide plaatſen.

126. TRITICUM calycibus quinquefloris truncatis, foliis involutis. *Sp.* 128. n. 8.

Gramen angustifolium spica tritici muticæ simili. *Baub. pin.* 9. *theatr.* 132. *prodr.* 18. t. 17.

Scheuch. gram. 7. *Boerb. lugdb.* 2. p. 156. n. 2. In de Duinen by Scheveningen.

127. TRITICUM calycibus quadrifloris subulatis acuminatis, foliis planis. *Sp.* 128. n. 9. *Gelr.* 61. *Fris.* 56.

Gramen caninum arvense s. Gramen dioscoridis. *Baub. pin.* 1. *Comm. boll.* 45. *Scheuch. gram.* 5.

Gramen caninum repens vulgatius. *Morif. bist.* 3. p. 178. f. 8. t. 1. f. 8.

Honds-Gras, Leed-Gras, Lidt-Gras, Puin-Gras,

- Gras, Peen-Gras, Kruip-Koorn, Queeck.* Belg.
 f. *Gramen latifolium spica triticea latiore compacta.*
Baub. pin 8. prodr. 17. theatr. 31. Comm. boll. 54.
Morif. bist. 3. p. 177. f. 8. t. 1. f. 1. Boerb.
lugdb. 2. p. 156. n. 2.
 γ. *Gramen maritimum vulgato canario simile.* *Morif.*
bist. 3. p. 178. Boerb. lugdb. 2. p. 156. n. 7.
 δ. *Gramen geniculatum parvum arenosum aggerum*
maritimorum Zelandiæ, longius radicatum.
Morif. bist. 3. p. 178. Boerb. lugdb. 2. p. 156.
n. 8.

Gemeen in de Bouw-landen en Hoven. β. Aan de kanten der Bouw-landen op verscheide plaatsen.
 γ. *Aan de Zee-dyk, en ook wel tusschen de Balsteenen genoegzaam in Zee, niet verre van Ropta-Zyl in Friesland.* δ. *Aan de Zee-dyken in Zeeland.*

Pharm. GRAMINIS rad. berb.

Variat magnitudine & crassitie totius plantæ, aristis longioribus & brevioribus, numeroque flosculorum in singula spicula.

caninum. 128. *TRITICUM calycibus quadrifloris subulatis aristatis. Sp. edit. 1. p. 86.*

Triticum radice perenni, spica subnutante, spiculis erectis: aristis longissimis. Schreb. spicileg. p. 51.

Elymus spica nutante arcta, spiculis rectis involucri destitutis, infimis geminis. Sp. edit. 2. p. 124.

Gramen caninum non repens elatius, spica aristata. Morif. bist. 3. p. 177. f. 8. t. 1. f. 2. Buxb. cent. 4. p. 29. t. 5c.

Gramen loliaceum radice repente f. Gramen officinarum, longioribus aristis donatum. T. Vaill. par. 81. t. 17. f. 2.

Veel aan de kanten der Slooten om Rotterdam, Utrecht, Franeker, en elders.

Ob spiculas inferiores geminas hoc Gramen III. LINNÆUS a Triticis removit, & ad Elymos amandavit; potiori vero jure inter Tritica relinquendum esse sentio, quippe Doctissimus Botanicus. D. RAINVILLE in literis ad me datis, testatur se inter numerosas quas examinavit hujus speciei plantas, nequidem unicam reperisse, quæ characterem essentialem Elymi habebat; neque unquam plures, quam unam

TRIANDRIA DIGYNIA.

37

unam alteramve supra eandem plantam, spicas, quæ geminas seu combinatas ferebant spiculas, basque non semper inferiores, sed modo in medio, modo versus summum spicæ positas, absque ulla certa lege, sicuti idem non raro in Lolio perenni videre est. Imo Cl. SCHREBERUS numquam spiculas geminas se vidisse ait, sed semper aliquantulum distantes, spicamque raram efficientes.

T R I G Y N I A.

M O N T I A.

129. MONTIA. Sp. 129. n. 1. Fris. 58.

Montia aquatica minor. Mich. gen. 18. t. 13. f. 2.

Portulaca arvensis. Baub. pin. 288.

Oed. dan. t. 131.

Te Heemze by Zwol, en elders in Slooten, waar in weinig water is; op natte en schaduwbachtige plaatsen in de Wouden, op Zand- en Veen-gronden, omtrent de Joure en Donkerbroek, en digt by de Rivier de Kuinder of Tjonger in Friesland; op Veengronden by Groningen.

C L A S S I S IV.

T E T R A N D R I A

M O N O G Y N I A.

G L O B U L A R I A.

- vulgaris.* 130. **GLOBULARIA** caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis; caulinis lanceolatis. *Sp.* 139. n. 3. *Gelr.* 67.
 Scabiosa, bellidis folio, humilis, Globularia dicta, caule folioso. *Morif. bist.* 3. p. 51. f. 6. t. 15. f. 46.
 Bellis cærulea, caule folioso. *Baub. pin.* 262.
By's Gravenhage in de Duinen tusschen de Heide; by Zwol achter den Kranenberg, en te Heemze.

D I P S A C U S.

- fullonum.* 131. **DIPSACUS** foliis sessilibus serratis. *Sp.* 140. n. 1. *Gelr.* 68. *Fris.* 59.
 Dipsacus sylvestris aut Virga pastorismajor. *Baub. pin.* 385. *Comm. boll.* 31. *Morif. bist.* 3. p. 158. f. 7. t. 36. f. 3.
Kaarden, Kannewassers. Belg.
Aan de Dyken en Wegen in de Betuwe, by Zutphen, Harderwyk, Naarden, Muiderbergh, Overschie, Velzen, Cuylenborg, Leerdam, Utrecht, Jutphaas, Zwol; by Haren buiten Groningen; achter 's Gravezande langs de Zee-en Maas-dyk, en op Staalduin.

132. **DIP.**

TETRANDRIA MONOGYNIA. 39

132. *DIPSACUS* foliis petiolatis appendiculatis. *Sp. pilosus.*
141. n. 3. *Gelr.* 69.

Dipsacus sylvestris, capitulo minore, vel *Virga pastoris minor.* *Baub. pin.* 385. *Morif. bist.* 3. p. 158. f. 7. t. 39. f. 5.

In de Fortificatien om Arnhem; ook buiten Naarden en Utrecht by de voorgaande.

S C A B I O S A.

133. *SCABIOSA* corollulis quadrifidis æqualibus, *Succisa.*
caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Sp.* 142. n. 6. *Gelr.* 71. *Frisf.* 60.
Succisa glabra. *Baub. pin.* 269. *Cam. boll.* 108.
Succisa f. Morsus diaboli. *Cam. epit.* 397.

Oed. dan. t. 279.

Duivels-beet. Belg.

- β. *Succisa hirsuta.* *Baub. pin.* 269.

Veel in de Weilanden tusschen Harderwyk en 's Heeren - Loo; in 't Clarenbeeksche - Bosch by Arnhem, in de Duin-Valeyen en Velden by 's Hage, Brederode, Alkmaar, Utrecht; op Heivelden in Friesland; by Haren buiten Groningen; en op meer andere plaatsen.

Pharm. SCABIOSÆ SUCCISÆ f. MORSUS
DIABOLI. rad. herb.

Variat corollis cæruleis, albis & carneis. Folia plerumque integra, rarius laciniata.

134. *SCABIOSA* corollulis quadrifidis radiantibus, *arvensis.*
foliis pinnatifidis incis, caule hispido. *Sp.* 143.
n. 10. *Gelr.* 70.

Scabiosa pratensis hirsuta. *Baub. pin.* 269. *Comm. boll.* 103.

Scabiosa major communior hirsuta, folio laciniato.
Morif. bist. 3. p. 45. f. 6. t. 13. f. 1.

Oed. dan. t. 447.

Schurft-Kruid. Belg.

- β. *Scabiosa major communior hirsuta, folio non laciniato latifolia.* *Baub. bist.* 3. p. 2. *Boerb. lugdb.* 1. p. 129.

Aan de kanten der Akkers en Zaai-landen by Zutphen, Harderwyk, Zwol, Groningen; te Darthuizen en Leerzum in de Provincie Utrecht; in de Duinen by 's Hage, Velzen, Overveen; en elders.

40 TETRANDRIA MONOGYNIA.

Pharm. SCABIOSÆ herb.

- columbaria* 135. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinatis setaceis. *Sp.* 134. *n.* 12. *Frisf.* 61.
Scabiosa, capitulo globofo; major. *Baub. pin.* 270.
Scabiosa minor. *Cam. epit.* 711.
Oed. dan. t. 314.
Middel-Scabieuſe, of *Schaaps-Scabieuſe*, Belg.
In Friesland by de Scabioſa Succifa. (MEESE.)

A S P E R U L A.

- cynanchica.* 136. ASPERULA foliis quaternis linearibus: superioribus oppositis, caule erecto, floribus quadridis. *Sp.* 151. *n.* 6.
Gallium album minus. *Tabern. bist.* 433. *t.* 433. *f.* 2. *Comm. boll.* 43.
Wit-Walſtroo. Belg.
Aan de kanten van de zandige Bouw-landen by Velzen buiten Haarlem; by Zwol; en op de Stads-muuren te Utrecht.

G A L I U M.

- palustre.* 137. GALIUM foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulibus diffusis. *Sp.* 153. *n.* 3. *Gelr.* 71. *Frisf.* 62.
Gallium palustre album. *Baub. pin.* 335. *Comm. boll.* 43.
Oed. dan. t. 423.
Water-Walſtroo. Belg.
Aan de kanten van de Sypel by Harderwyk; aan ſtilſtaande Slooten, in waterachtige Velden, en moeraſſige Veen-gronden buiten Amſterdam, Haarlem, Utrecht, Zwol, Groningen; in de Wouden buiten Franeker; in de Slooten aan de Duinkant by 's Hage.
- uliginosum.* 138. GALIUM foliis fenis lanceolatis retrorsum ferrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Sp.* 153. *n.* 7. *Frisf.* 63.
Gallium album minus. *Pet. herb. n.* 30. *f.* 6.
Aparine palustris minor parisiensis, flore albo. *Tourn. inst.* 114. *Vaill. par.* 14.
By Harderwyk op de Stads-weide; aan de kanten der

TETRANDRIA MONOGYNIA. 41

der Slooten buiten Franeker, en elders; ook langs de Duinen.

139. *GALIMUM* foliis octonis linearibus fulcatis, ramis *verum.* floriferis brevibus. *Sp.* 155. n. 12. *Gelr.* 72.

Fris. 64.

Gallium luteum. *Baub. pin.* 335. *Comm. boll.* 43.

Gallium. *Dod. pempt.* 235.

Walstroo. Belg.

Op ruwe zandige en steenige gronden; overvloedig op de barre Duinen; op de Wallen te Harderwyk; op de Muuren der Stad Utrecht; en elders.

140. *GALIMUM* foliis octonis ovato-linearibus subser- *Mollugo.* ratis, caule flaccido, ramis patentibus. *Sp.* 155.

n. 14. *Gelr.* 75. *Jngr.* 22.

Mollugo belgarum. *Lob. ic.* 802.

Rubia sylvestris laevis. *Baub. pin.* 333.

Oed. dan. t. 455.

- β. *Mollugo montana angustifolia*, vel *Gallium album latifolium.* *Baub. pin.* 331.

By Zandvoort op de Weg aan de Duinen; te Harderwyk aan de Wal buiten de groose Poort; aan de Dykjes by Haren buiten Groningen. β. Om-trent Zwol.

141. *GALIMUM* foliis octonis lanceolatis carinatis *Aparine.* scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis. *Sp.* 157. n. 22. *Gelr.* 76.

Fris. 65.

Aparine. *Dod. pempt.* 353.

Aparine vulgaris. *Baub. pin.* 334. *Comm. boll.* 11.

Oed. dan. t. 495.

Kleef-Kruid, Klet, Katte-Klaauwen. Belg.

- β. *Aparine semine coriandri faccharati.* *Park. theatr.* 547.

Overvloedig by de Wegen; in de Heggen, Boffchen, Hoven, bebouwde en onbezaaide landen. β. Gemeen te Overmaas in 't Koorn.

Varietas β semper minor est, sed rigidior &c. scabrior.

P L A N T A G O.

142. *PLANTAGO* foliis ovatis glabris, scapo tereti, *major.* spica flosculis imbricatis. *Sp.* 163. n. 1. *Gelr.* 77.

C 5

Fris.

42 TETRANDRIA MONOGYNIA.

Fris. 66.

Plantago latifolia sinuata. Baub. pin. 189. Comm. boll. 89.

Oed. dan. t. 461.

Weegbree. Belg.

β. *Plantago marina magna. Baub. bist. 3. p. 504. Comm. boll. 89.*

Zee-Weegbree. Belg.

By de Wegen, aan de Wallen, in de Weilanden, en in de Hoven. β. Aan de Zeekant by Muiderberg, Amsterdam, Zandvoort, op 't Eiland Wieringen, en elders.

Pharm. PLANTAGINIS rad. herb. sem.

media.

143. *PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. Sp. 163. n. 3. Gelr. 78.*

Plantago latifolia incana. Baub. pin. 189. Comm. boll. 89. Moris. bist. 3. p. 259. f. 8. t. 15. f. 6.

Oed. dan. t. 581.

Ruige Weegbree. Belg.

β. *Plantago latifolia hirsuta minor. Baub. pin. 189. Boerb. lugdb. 2. p. 100. n. 5.*

Als vooren; veel op Staal-duin buiten 's Hage.

maritima.

144. *PLANTAGO foliis semicylindræis integerrimis basi lanatis, scapo tereti. Sp. 165. n. 11. Gelr. 81. Fris. 68.*

Plantago marina. Lob. ic. 306. Tab. ic. 733.

Coronopus maritimus major. Baub. pin. 190. Comm. boll. 29.

Oed. dan. t. 243.

Zee-Harts-boorn. Belg.

Krokkeling. Enchufanis.

Aan de kant van de Zuider-Zee onder 't Gras by Harderwyk, Muiderberg, Naarden, Enkhui-zen; aan de Noord-Zee op den Haack achter 's Gra-vezande, en te Delfzyl; aan de Zeedyk by Har-lingen, Roptazyl, Dykshoek; als mede op som-mige plaatsen in de Wouden in Friesland.

Nonnullis pro acetario comesta placet. Vaccæ, quæ bac planta vescuntur, optimum ac copiosum lac præbent.

*coronopifo-
dia.*

145. *PLANTAGO foliis linearibus dentatis, scapo*

te-

TETRANDRIA MONOGYNIA. 43

- tereti. *Sp.* 166. n. 14. *Gelr.* 80. *Fris.* 69.
Coronopus sylvestris hirsutior. *Baub.* pin. 190.
Herba stella f. Cornu cervinum. *Dod. pempt.* 109.
Harts-boorn, Gravinne - Kruid. Belg.
 β. *Coronopus hortensis.* *Banb.* pin. 190. *Comm. boll.* 29.
Langs de Weg tusschen Zutphen en Doesburg; op
de Wallen te Harderwyk; achter Zorgvliet bui-
ten 's Hage, en op de Tarassen aldaar; te Heemze
in Overysfel; by Harender Moolen in 't Heide-
veld, en in 't witte Veen tusschen Haren en de
Waterhuizen buiten Groningen. β. In de Bouw-
landen en op zandige gronden by Haarlem.

C E N T U N C U L U S.

146. *CENTUNCULUS.* *Sp.* 169. n. 1. *Dill. giff.* 161. *gen. minimus.*
 111. *Eph. Nat. Cur. cent.* 5. *app.* 32. *t.* 10. *f.* 30.
Anagallis paludosa minima, foliis rotundis alter-
natis. *Vaill. par.* 12. *t.* 4. *f.* 2.
Alfine palustris minima, flosculis albis, fructu
coriandri exiguo. *Mentz. pug. t.* 4. *f.* 5.
Oed. dan. t. 177.
Te Heemze in Overysfel op 't Veld, alwaar plag-
gen afgemaait zyn.

S A N G U I S O R B A.

147. *SANGUISORBA spicis ovatis.* *Sp.* 169. n. 1. *officinalis.*
Gelr. 82.
Pimpinella sanguisorba major. *Baub. pin.* 160.
Morif. bist. 3. *p.* 264. *f.* 8. *t.* 18. *f.* 7.
Oed. dan. t. 97.
Te Heemze in de Hooi-landen.
Pharm. SANGUISORBÆ. rad.

C O R N U S.

148. *CORNUS arborea, cymis nudis, ramis rectis. sanguinea.*
Sp. 171. n. 3. *Gelr.* 83.
Cornus fœmina. *Baub. pin.* 447.
Visga sanguinea. *Dod. pempt.* 782.
Oed. dan. t. 481.
Overvloedig aan de ruige Wallen langs de wegen
buiten Zutphen; ook te Heemze, en elders in
Overysfel; en aan de oostkant van de Heereweg
aan

44 TETRANDRIA MONOGYNIA.

aan de Dykjes by Haren buiten Groningen.

I S N A R D I A.

- palustris.* 149. ISNARDIA. Sp. 175. n. 1.
 Alfine palustris rotundifolia repens, foliis portu-
 lacæ pinguibus. *Lind. alfat.* 114. t. 2.
In één Sloot by Achtienhoven in 't Sticht van
Utrecht. (Cel. E. I. VAN WACHENDORFF.)

T R A P A.

- natans.* 150. TRAPA. Sp. 175. n. 1.
 Tribulus aquaticus. *Baub. pin.* 194. *Comm. boll.* 111.
 Tribulus aquatilis. *Dod. pempt.* 581.
Water-Nooten, Minck-yzers. Belg.
In Vyvers en Stilstaande zoete Wateren op sommige
plaatsen.

A L C H E M I L L A.

- vulgaris.* 151. ALCHEMILLA foliis lobatis. Sp. 179. n. 1.
 Alchimilla vulgaris. *Baub. pin.* 319. *Comm. boll.* 4.
 Alchimilla. *Dod. pempt.* 140.
Zinauw, Leeuwen-Klaauw, Leeuwen-voet, Onze
Vrouwe Mantel. Belg.
 † Volgens BOERHAAVE.
 Pharm. ALCHIMILLÆ. herb.

D I G Y N I A.

A P H A N E S.

- arvensis.* 152. APHANES. Sp. n. 1. *Gelr.* 86.
 Chærophyllo nonnihil similis. *Baub. pin.* 182.
Comm. boll. 25.
 Perchepier anglorum quibusdam. *Baub. bist.* 3.
 p. 74.
Engelsch Steen doorsnydend Kruid. Belg.
In de Zaat-landen en Koorn-akkers op, verscheide
plaatsen; gemeen by Groningen.
Cl. ADANSON in hac planta sponte in arvis crescit,
 u-

TETRANDRIA DIGYNIA. 45

unum pistillum; in bortis se nascitur, duo constanter reperit.

C U S C U T A.

153. *CUSCUTA* floribus sessilibus. *Sp.* 180. n. 1. *Gelr. europaea.*
 87. *Fris.* 71.
Cuscuta major. *Baub. pin.* 219. *Comm. boll.* 32.
Cassutha. *Dod. pempt.* 554.
Oed. dan. t. 199.
Wrange, Schorste, Filt-Kruid. Belg.
Op de Heide by Harderwyk, Veldtwyk, en Kappel; om 't Vlas by Twello, en elders in Gelderland; op de Haagen en tusschen andere Kruiden by Utrecht en Tiel; aan de Heide-struikjes by Makkinga, Nyeberkoop &c. in Friesland.
Pharm. CUSCUTÆ herb.

T E T R A G Y N I A.

I L E X.

154. *ILEX* foliis ovatis acutis spinosis. *Sp.* 181. n. 1. *Agrifolium*
Gelr. 88. *Fris.* 72.
Ilex aculeata baccifera, folio sinuato. *Baub. pin.*
 425. *Comm. boll.* 60.
Agrifolium. *Dod. pempt.* 659.
Oed. dan. t. 508.
Hulst, Muisen-doorn. Belg.
 β. *Ilex* foliis glabris integerrimis exacte folia lauri referens. *Linn. b. Cliff.* 40.
Op verscheide plaatsen by Harderwyk, Zwol; omtrent het Heerenveen, en Dragten, en tusschen Donkerbroek en Haule in Friesland; achter Haren by de Mickelhorst buiten Groningen; ook vooraan in 't Landschap Drenthe in 't Cluivingsbosch te Paterwolde en Eelde. β. In de Mebesteege by Harderwyk.
Pharm. AGRIFOLII herb.

P O T A M O G E T O N.

155. *POTAMOGETON.* foliis oblongo-ovatis petio-
 la-

46 TETRANDRIA TETRAGYNIA.

- latis natantibus. *Sp.* 182. n. 1. *Fris.* 73.
Potamogeton rotundifolium. *Baub.* pin. 193.
Comm. boll. 93.
Potamogeton. *Fuchsf. bist.* 651, fig. optima.
Fontein-Kruid. Belg.
In stilstaande zoete Wateren en Vyvers; te Hulsen
by Nymegen; op 't Eiland Wieringen; in de
Slooten omtrent Tjomarum, en tusschen Tjetjerk
en Bergum in Friesland; en elders.
- perfoliatum* 156. *POTAMOGETON* foliis cordatis amplexicauli-
 bus. *Sp.* 182. n. 2. *Fris.* 74.
Potamogeton tertia. *Dod. pempt.* 582.
Potamogeton foliis latis splendentibus. *Baub.* pin.
 193. *Comm. boll.* 93.
Potamogeton rotundifolium alterum. *Loef. pruss.*
 205. t. 65.
Oed. dan. t. 196.
In brakke wateren in Noort-Holland; ook omtrent
Amsterdam, Zwol, en elders. In Friesland te
Lollum in de Vaart, in den opvaart naar Balk,
en in de Rivier de Kuinder of Tjonger; en op
andere plaatsen.
- densum.* 157. *POTAMOGETON* foliis ovatis acuminatis op-
 positis confertis, caulibus dichotomis, spica
 quadriflora. *Sp.* 182. n. 3.
Tribulus aquaticus minor alter. *Clus. bist.* 2.
 p. 252.
In Overysfel omtrent Zwol, si fides M. S. S. quod
inde habeo.
- lucens.* 158. *POTAMOGETON* foliis lanceolatis planis in
 petiolos desinentibus. *Sp.* 183. n. 4. *Gelr.* 90.
Fris. 75.
Potamogeton foliis angustis splendentibus. *Baub.*
 pin. 193. *Comm. boll.* 93.
Fontinalis lucens major. *Baub. bist.* 3. p. 777.
Comm. boll. 93.
Oed. dan. t. 195.
Veel in zoete stilstaande Wateren en Vyvers in
Noort-Holland; ook by Harderwyk, Haarlem,
Zwol, en elders; in de oude Leidsche Vaart en
omtrent Kortenhoef; in de Vecht by den Voet-
angel; buiten Leeuwaarden aan de zwarte Weg,

TETRANDRIA TETRAGYNIA. 47

in den opvaart naar Balk, en in de Rivier de Kuinder of Tjonger.

COMMELINUS boll. 93. male distinguit plantam Casp. Baubini ab ea Job. Baubini.

159. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis op-crispum. positivse undulatis ferratis. Sp. 183. n. 5. Gehr. 91. 92. Frisf. 76.

Potamogeton foliis crispis, five Lactuca rana-rum sarmentis planis. Baub. pin. 193. Comm. boll. 93.

Fontinalis crispa. Baub. bist. 3. p. 770.

Fonti-Lapathum pusillum. Lob. ic. 286.

In zoete staande Wateren op veele plaatsen in Noort-Holland, vooral aan de Duinkant. In de Slooten aan de Stadsweide van Harderwyk, en elders. In Friesland op veele plaatsen, zoo wel op de Kley als in de Wouden, in Vaarten, Vyvers en Slooten.

160. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis serratum. subundulatis. Sp. 183. n. 6. Frisf. 77.

Potamogeton altera. Dod. pempt. 582.

Potamogeton longo serrato folio. Baub. pin. 193.

Lapathum fluitans, folio longo serrato. Baub. bist. 2. p. 988.

By de voorige, dog niet zoo veel.

161. POTAMOGETON foliis linearibus obtusis, compressum caule compresso. Sp. 183. n. 7. Gehr. 93. Frisf. 78.

Potamogeton caule compresso, folio graminis canini. Raj. bist. 189. Boerb. lugdb. 1. p. 197.

Oed. dan. t. 203.

In de Graften om Harderwyk; veel in Noort-Holland; in Friesland in een Sloodt aan de weg van Tjetjerk naar Bergum, en op verscheide andere Woutplaatsen.

162. POTAMOGETON foliis setaceis parallelis approximatatis distichis. Sp. 183. n. 8. Frisf. 79.

Potamogeton gramineum. ramosum Baub. pin. 193. prodr. 101.

Millefolium temifolium. Gerard. bist. 828. fig. bona.

In de Slooten by Uilenpas, Latmer, en elders in Gelderland; en op zeer veele plaatsen in Friesland.

264. Po.

48 TETRANDRIA TETRAGYNIA.

- setaceum.* 163. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis acuminatis. *Sp.* 184. n. 9.
Potamogeton ramosum angustifolium. *Baub. pin.* 193. *Boerb. lugdb.* 1. p. 197.
In den Ouden Yliel op verscheide plaatsen.
- pufillum.* 164. POTAMOGETON foliis linearibus oppositis alternisque distinctis: basi patentibus, caule tereti. *Sp.* 184. n. 12.
Potamogeton pufillum, gramineo folio, caule tereti. *Raj. angl.* 3. p. 150. *Boerb. lugdb.* 1. p. 197. n. 8.
Potamogeton minimum, capillaceo folio. *Baub. pin.* 193. *prodr.* 101.
Potamogeton pufillum, gramineo folio brevior. *Vaill. par. t.* 32. f. 4.
Oed. dan. t. 186.
Te Katwyk op Rhyn.

R U P P I A.

- maritima.* 165. RUPPIA. *Sp.* 184. n. 1.
Buccaferrea maritima, foliis acutissimis. *Michx.* *gen.* 72. t. 35.
Gramen maritimum fluitans cornutum. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 7.
Oed. dan. t. 364.
By Katwyk aan Zee in de Slooten (Linn. b. Cliff. 430.) ook binnen 's Lands. (Cl. HOUTTUYN.)

S A G I N A.

- procumbens* 166. SAGINA ramis procumbentibus. *Sp.* 185. n. 1.
Gelr. 94. *Fris.* 80.
Alfine pusilla graminea, flore tetrapetalo. *Tourn. inst.* 243. *Lind. alf.* 204. t. 8. *Segu. veron.* 421. t. 5. f. 3.
In Tonzel en elders buiten Harderwyk; veel op vochtige straaten en muuren in Holland; op Zandhorst in een graspad.
- erecta.* 167. SAGINA caule erecto subunifloro. *Sp.* 185. n. 2.
Alfine foliis caryophyllæis. *Raj. angl.* 3. p. 344. t. 15. f. 4.
In de Weiden by Sneek. (D. RAINVILLE.)

CLAS.

C L A S S I S V.

P E N T A N D R I A

M O N O G Y N I A.

M Y O S O T I S.

168. MYOSOTIS feminibus lævibus, foliorum apicibus callofis. *Sp.* 188. n. 1. *Gelr.* 95. *Fris.* 81. *Scorpioides*
- α. Myosotis foliis hirsutis. *Linn. b. Cliff.* 45. *arvensis.*
- Echium scorpioides arvense. Baub. pin.* 254. *Comm.*
- bell.* 32.
- Scorpiurus annuus arvensis hirsutus cæruleus.*
- Morif. bist.* 3. p. 450. f. 11. t. 31. f. 2.
- Oed. dan. t.* 58.
- Muizen-oor, Scorpioen-Kruid. Belg.*
- β. Myosotis foliis glabris. *Linn. b. Cliff.* 46. *palustris.*
- Echium scorpioides palustre. Baub. pin.* 254. *Comm.*
- bell.* 32.
- Scorpiurus palustris perennis, viridioribus foliis.*
- Morif. bist.* 3. p. 451. f. 11. t. 31. f. 4.
- Water-Muizen-oor, Water-Scorpioen-Kruid. Belg.*
- a. In de Zaaï-landen en Hoven. β. Aan de kanten van de Beeken en Slooten, en op andere vochtige plaatsen.*

L I T H O S P E R M U M.

169. LITHOSPERMUM feminibus lævibus, corollis *officinale.*
- vix calycem superantibus, foliis lanceolatis.
- Sp.* 189. n. 1.

D

Lit.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Lithospermum majus erectum. Baub. pin. 258.

Comm. boll. 68.

Lithospermum minus. Cam. epit. 659.

Paarl - Kruid, Steenbreek, Steen - Zaad, Zonne-Gierst. Belg.

Op zandige gronden buiten Haarlem in 't Grootte Bent-veld, by de Kruidberg, en elders; ook omtrent Zwol.

Pharm. LITHOSPERMI f. MILII SOLIS sem.

arvense. 170. *LITHOSPERMUM* seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. *Sp. 190. n. 2. Gehr. 96. Fris. 82.*

Lithospermum arvense, radice rubra. Baub. pin. 58. Comm. boll. 68.

Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, semine echii. Aub. bist. 3. p. 592.

Oed. dan. t. 455.

Wild Steen Zaad, Wild Paarl - Kruid. Belg.

In de Voor - Zomer aan de kanten der Akkers by Oudroze op de Veluwe; buiten Amsterdam op de Weg langs den Amstel naar Ouderkerk, en elders in Holland; by de Maat omtrent Cothen in de Provincie Utrecht; tusschen het Koorn op veele plaatsen in Friesland; aan de Westkant van de Heereweg aan de Dykjes tegenover de Eesterweg buiten Groningen.

A N C H U S A.

officinale. 171. *ANCHUSA* foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Sp. 191. n. 1. Gehr. 615.*

Buglossum angustifolium majus. Baub. pin. 256.

Buglossum vulgare. Cam. epit. 915.

Oed. dan. t. 572.

Osse-tonge. Belg.

Langs de wegen buiten Arnhem, en vry overvloedig langs de Duinen by Wassenaar, Heemstede, Bennenbroek, en elders.

Pharm. BUGLOSSI herb. flor.

C Y N O G L O S S U M.

officinale. 172. *CYNOGLOSSUM* staminibus corollae brevioribus, fo-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 51

- foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. *Sp.*
192. n. 1. *Gelr.* 97.
Cynoglossum vulgare. *Cam. epit.* 917.
Cynoglossum majus vulgare. *Baub. pin.* 257. *Comm.*
boll. 30.
Honds-tonge. Belg.
β. Cynoglossum majus vulgare, flore albo. *Baub.*
pin. 257.
By Doesburg en Arnhem in de Fortificatien; op de
Wallen van Harderwyk; aan de Dyken boven
Tiel; veel tusschen Maas en Waal; langs de
wegen buiten Wyk by Duurstede; en over-
vloedig langs de Duinkant van Holland.
Pharm. CYNOGLOSSI rad.

P U L M O N A R I A.

173. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-corda-officinalis.
tis scabris *Sp.* 194. n. 2.
Symphytum maculosum f. Pulmonaria latifolia.
Baub. pin. 259. *Comm. boll.* 109.
Symphytum maculosum. *Dod. pempt.* 135.
Oed. dan. t. 482.
Longe-Kruid, Wrange-Kruid, Onze-Vrouwen
Melk-Kruid. Belg.
Wolven-Laa. Rusticis.
Overvloedig op Zandwyk by Tiel, en in 't Bosch
te Buuren; buiten Haarlem naar de Sillick.
Pharm. PULMONARIÆ herb.

S Y M P H Y T U M.

- 174 SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis decur-officinalis.
rentibus. *Sp.* 195. n. 1. *Gelr.* 98. *Fris.* 83.
Symphytum majus. *Cam. epit.* 700.
Symphytum, Consolida major. *Baub. pin.* 259.
Comm. boll. 108.
Smeer-Wortel, Heel-Wortel, Waal-Wortel Belg.
Scheur Wortel, Felje. Zutphanensibus.
Overvloedig aan de Dyken, Wegen, Kanten der
Slooten, en in de Weilanden.
Pharm. SYMPHYTI f. CONSOLIDÆ MAJORIS
rad. herb. far.
Variat corollis ceruleis, purpureis, rubris & albis,
vel pallide luteis.

52 PENTANDRIA MONOGYNIA.

B O R A G O.

- officinalis.* 175. BORAGO foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Sp.* 197. *n.* 1. *Gelr.* 99.
 Borrigo floribus cæruleis & albis. *Baub. bist.* 3. p. 574.
 Buglossum latifolium, Borrigo. *Baub. pin.* 236. *Comm. boll.* 17.
Bernafse. Belg.
Komt thans van zelfs voort in de Hoven, langs de Wegen, ook op zommige Vuilnisboopen.
Pharm. BORRAGINIS berb. flor.

A S P E R U G O.

- procumbens* 176. ASPERUGO calycibus fructus compressis. *Sp.* 198. *n.* 1. *Gelr.* 102.
 Asperugo spuria. *Dod. pempt.* 356.
 Buglossum sylvestre, caulibus procumbentibus. *Baub. pin.* 257. fructu pedem anserinum referente. *Morif. bist.* 3. p. 439. *f.* 11. *t.* 26. *f.* 13. *Oed. dan. t.* 552.
Aan ruige Wallen langs de Duinkant omtrent de Boere-bove buiten 's Hage; en tusschen Overveen en Bloemendal by Haarlem; aan 't Dykje even voorby de Vier Staten. naar de breedeweg buiten Alkmaar; aan de Wallen der Bouwlanden te Dieze in Overysfel.

L Y C O P S I S.

- aryensis.* 177. LYCOPSIS foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis. *Sp.* 199. *n.* 4. *Gelr.* 100. *trif.* 87.
 Buglossum sylvestre minus. *Baub. pin.* 256. *Comm. boll.* 18.
 Buglossa sylvestris. *Dod. pempt.* 628. *Oed. dan. t.* 435.
Wilde Buglosse of Osse-tonge. Belg.
 β. Buglossum sylvestre minus alterum & asperius. *Baub. pin.* 256.
In de Bouw-landen en Akkers, en langs de Heggen, veel in de Duinen naar Waffenaar; en aan de Dykjes tusschen Helpen en nieuwe werken buiten Groningen. β. In de Moersboven en bebouwde Lan-

PENTANDRIA MONOGYNIA 53

Landen buiten Haarlem.

E C H I U M.

178. *ECHIU*M caule tuberculato - hispido , foliis *vulgare*.
caulnris lanceolatis hispidis , floribus spicatis
lateralibus. *Sp.* 200. *n.* 4. *Gelr.* 101.

Echium vulgare. *Baub. pin.* 254. *Baub. bist.* 3. *p.*
585. *Morif. bist.* 3. *p.* 440. *f.* 11. *t.* 27. *f.* 1.

Lycopsis. *Baub. pin.* 255. *Comm. boll.* 69.

Oed. dan. t. 445.

Slinge - Bruid. Belg.

Te Keppel by de Kerk , en in de Fortificatien om
Zutphen , Doesburg en Arnhem ; aan de Duinen ,
en langs de Weg by Noorddorp , in de Duinen
van Heemstede en Wassenaar ; op de Stads -
Muuren te Deutinchem , Hattem , Zwol ; veel
langs de Wegen by Rhenen , en elders.

Variat floribus caeruleis & rubris. Caule fasciato
occurrit inter Neomagum & Villam Hulsen.

P R I M U L A.

179. *PRIMULA* foliis dentatis rugosis. *Sp.* 204. *n.* 1. *veris.*
l. limbo corollarum plano.

Primula veris , pallido flore , elatior. Clus. bist.
1. p. 301.

Verbasculum pratense vel sylvaticum inodorum.
Baub. pin. 241. *Comm. boll.* 114.

Oed. dan. t. 433.

Sleutel - Bloem , Bak - Kruid. Belg.

Overvloedig op de Uittenwaarden te Drumpt , Zoe-
len en Avesaate in de Neder - Betuwe ; op de
Stadsweide en by de Bronsbergen buiten Zutphen ;
in vogtige Bosjes buiten Haarlem , en in veele
Duin - Valeien ; ook langs de boutkant van 't
Haagsche - Bosch.

Pharm. PRIMULA VERIS herb. flor.

M E N Y A N T H E S.

180. *MENYANTHES* foliis cordatis integerrimis, *Nymphoi-*
corollis ciliatis. *Sp.* 207. *n.* 1. *Gelr.* 104. *Fris.* 84. *dss.*

Lymnanthemum peltatum. Gmel. act. petrop. 1769.

V. 14. *p.* 527. *t.* 17. *f.* 2.

Nymphæa lutea minor ; flore fimbriato. Baub. pin.

54 PENTANDRIA MONOGYNIA.

194. *Baub. bist.* 3. p. 772.

Nymphœa lutea minor parvo flore. C. B. *Comm. boll.* 81.

Oed. dan. t. 339.

Kleine Geele Pompen. Belg.

Veel in den Ouden-Yfel; in de Graften om Zutphen; in de Slooten by Uilenpas, Maurik, Amerongen &c. in 't Graafschap Leerdam; by 's Gravenhage; in 't wyde Spaarne by 't Huis te Heemstede; in verscheide Wateren in Friesland, by de Joure, Akkrum &c. In Overysfel omtrent Zwol en elders; als ook op veele plaatsen in de Veenen.

trifolia. 181. *MENYANTHES foliis ternatis.* *Sp.* 208. n. 3. *Gelr.* 103. *Frif.* 85.

Trifolium palustre. *Baub. pin.* 327. *Dod. pempt.* 580. *Comm. boll.* 112.

Oed. dan. t. 541.

Water-Drieblad, Water-Klaveren, Boks-Boonen. Belg.

2. *Menyanthes palustre angustifolium triphyllon.*

Turn. inst. 117. *Foerb. lugd.* 1. p. 206.

By Harderwyk, in de Slooten tusschen Hierden en de Zee; in 't Veen agter Uilenpas, te Elden, Driel, Wamel, Dreumel, Veenendal; in de Weiden by Wageningen, en elders in Gelderland; in de binnendykse Wielen by Muiderberg; in de Slooten tusschen Muiden en Naarden; in die om 's Hage, en buiten Alkmaar, by Bergen, Egmond op den Hoef en Egmond binnen; overvloedig buiten Leeuwaarden aan de Zwartte-Weg, in laage Landen en in Slooten, op Bergummer-Heide in Friesland; by Holten in Overysfel; in 't Go-regt om Groningen; en elders.

Pharm. TRIFOLII AQUATICI. herb.

H O T T O N I A.

palustris. 182. *HOTTONIA pedunculis verticillato-multifloris.* *Sp.* 208. n. 1. *Gelr.* 105. *Jngr.* 30. *Frif.* 86.

Myriophyllum alterum. *Cam. epit.* 879.

Millefolium aquaticum, f. Viola aquatica, caule nudo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

Millefolium aquaticum equisetifolium, caule nudo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

Oed.

Oed. dan. t. 487.

Water-Violet of *Violieren*. Belg.

Veel in stilstaande Slooten tusschen Harderwyk en Nykerk, in Heirden, Twello, en elders op de Veluwe, ook in de Betuwe; in de Slooten by Vi-anen, Heycoop, te Overveen buiten Haarlem; by Dokkum, Tjetjerk &c. in Friesland; by Ha-ren buiten Groningen; ook op veele plaatsen in de Provinciën Utrecht en Overysfel.

L Y S I M A C H I A.

183. *LYSIMACHIA paniculata*: racemis terminalibus. *vulgaris*.

Sp. 209. n. 1. Gelr. 106. Jngr. 30. Frif. 87.

Lyfimachia lutea major. Baub. pin. 245. Comm. boll. 70.

Lyfimachium luteum. Dod. pempt. 84.

Geele Wederik. Belg.

Veel aan de Beeken en Slooten by Harderwyk, Uilenpas, Zeyft, 's Hage, in den Aarden-hout, aan de Duinbeeken; in Friesland by Bergum, Oostermeer, Heerenveen, als elders in de Wou-den; buiten Groningen by de Mickelhorst, en op andere boscbagtige plaatsen.

Variat foliis ternis, quaternis & quinis.

184. *LYSIMACHIA racemis lateralibus pedunculatis. thyrsiflora*.

Sp. 209. n. 4. Gelr. 107. Frif. 88.

Lyfimachia bifolia, flore globoso luteo. Baub. pin. 245. Comm. boll. 70.

Lyfimachia lutea. Clus. hist. 2. p. 53. t. 12.

Oed. dan. t. 517.

Water-Wederik. Belg.

In 't Veen by Uilenpas; in de Riet-Pol te Wage-ningen; in de waterachtige Rietlanden tusschen Amsterdam en Muiden; in 't Haagfche-Bosch; in de moerassen by Rotterdam, Leeuwaarden, Franeker, Groningen; en elders.

Mire variat numero staminum 6. 7. & 8. corollaque in totidem lacinias secta.

185. *LYSIMACHIA foliis subquaternis subsessilibus, punctatis, pedunculis verticillatis unifloris*. Sp. 210. n. 6.

Lyfimachia lutea minor, foliis nigris punctis no-tatis. Baub. pin. 245.

56 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Blattariae affinis planta minor, flore luteo; foliis nigris punctis notatis. *Morif. bist.* 2. p. 491. f. 5. t. 10. f. 15.

Aan 't Haarlemmer-Meer tusschen 't Riet. (Linn. b. *Cliff.* 52.) *Langs de Maas achter 's Gravezande.* (Cl. Schencke.)

- nemorum.* 186. *LYSIMACHIA* foliis ovatis acutis, floribus foliariis, caule procumbente. *Sp.* 211. n. 9.
Anagallis lutea nemorum. *Baub. pin.* 252. *Boerb. lugdb.* 1. p. 203. *Morif. bist.* 3. p. 569. f. 5. t. 26. f. 5.
Oed. dan. t. 174.
In 't Veen by Uilenpas.

- Nummularia.* 187. *LYSIMACHIA* foliis subcordatis, floribus foliariis, caule repente. *Sp.* 211. n. 10. *Gelr.* 108. *Fris.* 89.
Nummularia. *Dod. pempt.* 500.
Nummularia major lutea. *Baub. pin.* 309. *Comm. boll.* 80.
Oed. dan. t. 493.
Penning-Kruid. Belg.
Aan de kanten van vochtige Weilanden, in drooge Slooten, en in de Veenen op veele plaatsen.
Pharm. NUMMULARIÆ berb.

A N A G A L L I S.

- arvensis.* 188. *ANAGALLIS* foliis indivisis, caule procumbente. *Sp.* 211. n. 1. *Gelr.* 109. *Fris.* 90.
 α. *Anagallis phœniceo flore.* *Baub. pin.* 252. *Comm. boll.* 8.
Anagallis mas. *Dod. pempt.* 32.
Oed. dan. t. 88.
Bastard-Muur of Guichelbeil Manneken. Belg.
Lieven-Heers Teentjes. Mosa-Trajectinis.
 β. *Anagallis cœruleo flore.* *Baub. pin.* 252. *Comm. boll.* 8.
Anagallis foemina. *Dod. pempt.* 32.
Bastard-Muur of Guichelbeil Wyffe. Belg.
 γ. *Anagallis flore purpurascente.* *Baub. pin.* 252. *Boerb. lugdb.* 1. p. 204.
 δ. *Anagallis flore carneo.* *Park. theatr.* 55. *Boerb. lugdb.* 1. p. 204.

a. 12.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 57

- u. In de Koorlanden en Hoven op verscheide plaatsen
ook in de barre Duinen. β. γ. δ. by de zelve, dog
niet zoo overvloedig.

Pabulum gratissimum pecori.

Pharm. ANAGALLIDIS herb.

189. ANAGALLIS foliis ovatis acutiusculis, caule re-
tenella. *Mant.* 335.

Lyfimachia tenella. *Sp.* 211. n. 11.

Nymularia minor, purpurascente flore. *Baub.*

pin. 310. *prodr.* 139. *Morif. bist.* 2. p. 567. f. 5.
t. 26. f. 2.

Nymularia rubra. *Baub. bist.* 3. p. 371. *Boerb.*
lugdb. 1. p. 203.

† *Volgens* BOERHAAVE.

C O N V O L V U L U S.

190. CONVULVULUS foliis sagittatis utrinque acutis, *arvensis.*
pedunculis subunifloris. *Sp.* 218. n. 1. *Gelr.*

110. *Fris.* 91.

Convolvulus minor arvensis. *Baub. pin.* 294.

Comm. boll. 28. flore roseo.

Smilax laevis minor. *Dod. pempt.* 393.

Oed. dan. t. 459.

Kleine Winde, *Klozken Winde*, *Liend*, *Windom.*
Belg.

- β. *Convolvulus minor arvensis*, flore candido. *Tourn.*
inst. 83.

- γ. *Convolvulus minor arvensis*, flore purpurascente,
radiis albis picto. *Tourn. inst.* 83.

Menigvuldig in zandige Bouwlanden en aan ruige
Wallen; ook in de Duinen langs de Wegen achter
Zorgvliet, en buiten Haarlem.

191. CONVULVULUS foliis sagittatis postice trunca-
tis, pedunculis tetragonis unifloris. *Sp.* 218. n.

2. *Gelr.* 111. *Fris.* 92.

Convolvulus vulgaris major albus. *Baub. pin.* 294.

Comm. boll. 27.

Smilax laevis major. *Dod. pempt.* 392.

Oed. dan. t. 458.

Groote Winde. Belg.

- β. *Convolvulus vulgaris major*, flore ex roseo et albo
variegato. *Boerb. lugdb.* 1. p. 246.

D 5

γ. Con-

58 PENTANDRIA MONOGYNIA.

- γ. *Convolvulus major purpureus*. *Comm. boll.* 28.
Veel aan de beggen by de wegen β. by de zelve, maar zeldzaam. γ. buiten Haarlem by 't Kraayenest.

- Soldanella.* 192. *CONVOLVULUS* foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Sp.* 226. n. 39.
Convolvulus maritimus nostras rotundifolius. *Morif. bist.* 2. p. 11. f. 1. t. 3. f. 2.
Soldanella maritima minor. *Baub. pin.* 295. *Comm. boll.* 107.
Brassica marina, sive Soldanella. *Baub. bist.* 2. p. 166.
Zee-Winde, Zee-Kool. Belg.
Overvloedig in Zeeland aan den West-Cappelschen-Dyk; en achter 's Gravezande, langs de Zee-duinen en stranden van de Maas.
Pharm. SOLDANELLA herb.

C A M P A N U L A.

- rotundifolia.* 193. *CAMPANULA* foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Sp.* 232. n. 3. *Gel.* 117.
Frif. 93.
Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Baub. pin.* 93. *Comm. boll.* 2c.
Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus sinuatis non ferratis. *Morif. bist.* 2. p. 456. f. 5. t. 2. f. 17.
Oed. dan. t. 489.
Kleine wilde Raponce of wilde kleine Klokkens. Belg.
 β. *Campanula minor rotundifolia vulgaris, floribus candidis*. *Tourn. inst.* 111.
Overvloedig aan de kanten der Akkers in Gelderland en Overysfel; ook omtrent Velsen in Holland; in Friesland by Bergummer-Heide, en elders in de Wouden aan de dykjes en wegen, β. Veel omtrent den Ouden Yssel by Keppel.
- Rapunculus.* 194. *CAMPANULA* foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Sp.* 232. n. 5. *Gelr.* 116.
Rapunculus esculentus. *Baub. pin.* 92.
Rapunculum. *Dod. pempt.* 165.
Raponcen. Belg.
In de Herkeloer-waart in Overysfel: by Zuideras, Diempt, Wageningen, Hunderen, de Poll, Lat-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 59

Latmer, ou elders in Gelderland.

195. CAMPANULA foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. *Sp.* 232. n. 6. *Gelr.* 115.
Campanula perficifolia. Lob. bist. 117. *Morif. bist.* 2. p. 452. f. 5. t. 1. f. 2.
Rapunculus perficifolius, magno flore. Baub. pin.

^{93.}
Veel by Uilenpas.

196. CAMPANULA foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis squarosis, calycibus reflexis. *Sp.* 234. n. 12. *Gelr.* 114. *Fri.* 94.
Campanula hortensis, rapunculi radice. Baub. pin. 94. repente. *Morif. bist.* 2. p. 400. f. 5. t. 3. f. 32.

Duivels Naagaarn. Belg Hortulanis.
In de Hoven onder de beggen, en in de Zaaialanden op verſcbeide plaatſen.

197. CAMPANULA caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Sp.* 235. n. 16. *Gelr.* 113.

Campanula vulgatiſ, foliis urticæ, vel major & aſperior. Baub. pin. 94.

Cervicaria major. Dod. pempt. 164.

Hals-Kruid. Belg.

In de Koornlanden by Zoelen in de Betuwe; ook zomtyds in de Hoven en op ruwe plaatſen.

198. CAMPANULA capsulis quinquelocularibus obrectis, caule simplicissimo subunifolio, foliis lanceolatis, corollis barbatis. *Sp.* 236. n. 22. *Gelr.* 119.

Campanula foliis anchusæ, floribus oblongis. Baub. pin. 94.

Campanula foliis hispida, caule subunifloro. All. pedem. 36. t. 6. f. 2.

Rapunculus montanus. Baub. bist. 2. p. 808.

In de Sijker-waart.

199. CAMPANULA caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis subcrenatis, floribus solitariis capsulis prismaticis. *Sp.* 268. n. 31. *Gelr.* 118.

One

60 PENTANDRIA MONOGYNIA

Onobrychis arvensis, vel *Campanula arvensis* erecta. *Baub. pin.* 215. *Comm. boll.* 81.

Ayicularia sylvii quibusdam. *Baub. bist.* 2. p. 800. *Vrouwen - Spiegel.* Belg.

In de Koornlanden by Tiel, en op andere plaatsen in de Betuwe; by Twello op de Veluwe; by Utrecht, Wyk te Duurstede, Zwol, en elders.

Corolla apud nos calyce semper longior.

S A M O L U S.

Periclymeni. 200. *SAMOLUS.* *Sp.* 243. n. 1. *Gelr.* 120. *Fris.* 95.

Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. *Baub. pin.* 252. *Comm. boll.* 9.

Alsine aquatica, foliis rotundis beccabungæ. *Morif. bist.* 2. p. 323. f. 3. t. 24. f. 28.

Oed. dan. t. 198.

Waterpungen met ronde ongekerfde bladeren. Belg.

Op veele plaatsen langs de Zuider-Zee-kant by Enkhuysen, Muiderberg, op Vlieland; en in de Duin-Valeyen tusschen Beverwyk en Velsen, en agter Egmond op den Hoef; ook langs de Zee-en Maas-kant by 's Gravezande, en in de pannen der Duinen op Staalduin. In Friesland by Koe-hool aan den binnenkant van de Zeedyk; buiten Franeker op verscheide plaatsen, in beneden wadden der Slooten, desgelyks in de Wouden, en ook by Groningen.

L O N I C E R A.

Periclymenum. 201. *LONICERA* capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis *Sp.* 247. n. 3. *Gelr.* 121.

Caprifolium germanicum. *Dod. pempt.* 411.

Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Baub. pin.* 302. *Comm. boll.* 86.

Geiten-blad, *Mammetjes - kruid*, *Memmekens - kruid.* Belg.

Weeuwijjes. *Hollandis.*

Wilde Caperfoely. *Vulgo.*

Veel langs de wegen by Zutphen; te Marik op den Bikkelenberg; aan de Hierderweg by Harderwyk, en aan de Nuwspeter-beek; in de Haarlemmer-hout; aan de kanten der Akkers tusschen de Zandpoort en Velsen, en buiten Naarden;

in

PENTANDRIA MONOGYNIA. 61

in 't Haagsche-Bosch, en in de Duinen aldaar;
in Friesland in de Wouden; by Groningen in 't
Goregt, voornaamlyk te Onnen en Haren; en
elders op vechtige en schaduwachtige plaatsen.

Pharm. CAPRIFOLI. herb. flor.

V E R B A S C U M.

202. VERBASCUM foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. *Sp. 252. n. 1. Gelr. 125.*

Verbascum mas latifolium luteum. *Baub. pin. 239.*

Comm. boll. 114.

Verbascum mas. *Dod. pempt. 143.*

Wolle-Kruid, Toortsen, Konings-Kaarsen. Belg.

Overvloedig aan de kanten der Duinen en Akkers op
veele plaatsen; ook zomtyds op oude Muuren. Men-
nigvuldig aan de Dyken tusschen Maas en Waal;
en aan de Weg by Middagten op de Veluwe; aan
de Oostkant van de Heereweg op de dykjes by de
Wolf, en agter Haren by Voorveld buiten Gro-
ningen; en elders.

Pharm. VERB. ASCI herb. flor.

203. VERBASCUM foliis cordato-oblongis petiolatis. *nigrum. Sp. 253. n. 4. Gelr. 126.*

Verbascum nigrum. *Dod. pempt. 144.*

Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente.

Baub. pin. 240.

Op Uilenpas aan de wal om de Graften; op de
Pastory-Kamp te Putten op de Veluwe; hier en
daar omtrent Boere-boeven buiten 's Hage; agter
den Kranenborg in Overysfel.

204. VERBASCUM foliis amplexicaulibus oblongis *Blattaria glabris, pedunculis solitariis. Sp. 254. n. 6. Gelr. 127.*

Blattaria. *Dod. pempt. 145.*

Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Baub. pin. 240.*

Motten-Kruid. Belg.

Op zandige gronden by Haarlem, Overveen; op de
Pastory-Kamp te Putten, en overvloedig by Warus-
veld, Keppel, Drempt en Uilenpas in 't Graaf-
schap Zutphen; op booge schraale Uittenwaarden
te Wamel over Tiel.

DA-

62 PENTANDRIA MONOGYNIA.

D A T U R A.

- Solanum*. 205. **DATURA** pericarpis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Sp.* 255. *n.* 2. *Gelr.* 122.
Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo, flore albo. *Baub. pin.* 168.
Tatula. Cam. epit. 176.
Oed. dan. t. 436.
Doorn-Appel, Dol-Appel. Belg.
Wonder-Boom. Nonnullus.
By Fiel, Twello, ter Wolde, Wiezel, Hattem, en elders in Ge derland; in de Duinen niet verre van Heemstede; by 't ruis te Paauw; en op veele andere plaatsen; in sommige Poere-boven en Boongaarden by Haren buiten Groningen.

H Y O S C Y A M U S.

- niger.* 206. **HYOSCYAMUS** foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. *Sp.* 257. *n.* 1. *Gelr.* 123.
Frif. 97.
Hyoscyamus vulgaris & niger. Baub. pin. 169.
Com. n. boll. 59. Morif. bist. 2. p. 494 f. 5. t. 11. f. 1.
Dol-Kruid, Zwart-Bilsen-Kruid. Belg.
Op de Kerkboven en andere ruwe plaatsen, en overvloedig in de Duinen.
Pharm. HYOSCYAMI rad. herb. sem.

S O L A N U M.

- Dulcamara* 207. **SOLANUM** caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Sp.* 264. *n.* 5. *Gelr.* 131. *Frif.* 98.
Solanum scandens f Dulcamara. Baub. pin. 167.
Comm. boll. 106.
Dulcamara Dod. pempt. 402.
Alfrank, Elfrank, Bitterzoet, Hoe langer hoe liever. Belg.
Elgies-bout, Dolbessen bout. Buranis.
Weer-bout Veenendalensibus.
Qualster. Rusticis.
Overvloedig aan de kanten der Slooten.
Pharm. DULCAMARE stibit.
Contra Arthritidem & Febres intermittentes Rusticis in usu; & manducatur contra Sodom.

208. So-

208. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis *nigrum*
dentato-angulatis, racemis distichis nutantibus.

Sp. 266. n. 15. Gehr. 129. Frisf. 99.

Solanum officinarum. Baub. pin. 166. Comm. boll.

106

Solanum hortense. Dod. pempt. 154.

Oed. dan. t. 460.

Nagtschade, Dol-Kruid, Dolle-Beyen. Belg.

Op veele plaatjen langs de Wegen, en in de Hoven.

Pharm. SOLANI herb.

Variat baccis rubris, viridibus & nigris.

R H A M N U S.

209. RHAMNUS spinis terminalibus, floribus quadri-*catharticus*
fidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. Sp.

279. n. 1.

Rhamnus catharticus. Baub. pin. 478.

Rhamnus solutivus. Dod. pempt. 756.

Rbynbezien - doorn, Doorn-bezien, Wege - doorn.

Belg

By Wassenaar en aan de weg van 's Hage naar

Scheveningen voorby het Iolbek, en elders daar

omtrent in de Duinen.

Pharm. RHAMNI CATHARTICI f. SPINÆ

CERVINÆ bacc.

210. RHAMNUS inermis, floribus monogynis herma-*Fraugula*
phroditis, foliis integerrimis. Sp. 280. n. 5.

Gehr. 128. Frgr. 37. Frisf. 100.

Frangula. Dod. pempt. 784.

Alnus nigra baccifera. Baub. pin. 428. Comm.

boll. 6.

Oed. dan. t. 278.

Honds-boom, Sporcken-bout, Pyl-bout. Belg.

Stincke-boom, Vuil boom, Hontjes-Hout. vulgo.

Baccæ Groninganis leupjes audiunt.

Buiten Harderwyk in Tonsel aan de Nykerker-

weg; buiten Utrecht, de Veurst, Venendal;

in 't Haagsche-Bosch; in Friesland omtrent

Kuykhorne; in Swartzenburgs-Bosch; in ruige

Wallen en Kreupelbosjes by 't Orange-Woud en

Bonte Bok, en elders; buiten Groningen in 't

Goreght op de meeste boschachtige plaatjen.

64 PENTANDRIA MONOGYNIA

EUONYMUS.

Europaeus. 211. *EUONYMUS* floribus plerisque quadrifidis, foliis sessilibus. *Sp.* 286. *n.* 1. *Gelr.* 85. *Fris.* 101.
Euonymus vulgaris, granis rubentibus. *Baub. pin.* 428.

Euonymus. 2. *Clus. bist.* 1. *p.* 57.

Tetragonia. Dalech. bist. 272.

Paapen - Muts, Paapen - Hoed, Paapen - Hout, Kardinaals - Muts, Kardinaals - Hoed. Belg.

Luizen - Boom. Rusticis.

By Ouden - Aller, in Hierden, en elders buiten Harderwyk; veel om Tiel, te Drumpt, aan de Waal - Dyk op veele plaatsen; buiten Utrecht omtrent Zeyst; op de Velferheide; in Friesland buiten Makkinga, tusschen Kreupelbont; overvloedig by Haren buiten Groningen.

Rustici pulvere fructuum utuntur ad pediculos capitum infantum necandos.

RIBES.

rubrum. 212. *RIBES* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Sp.* 290. *n.* 1. *Gelr.* 135. *Fris.* 102.

Ribes vulgare acidum rubrum. *Baub. bist.* 2. *p.* 97.

Grossularia multiplici acino, f. non spinosa hortensis rubra. *Baub. pin.* 455. *Comm. boll.* 55.

Wilde Roode Aalbezien. Belg.

Aan de Duinkant tusschen Overveen en Bredenrode; buiten Utrecht; in Friesland op verscheide plaatsen in Boscchen, op oude Muuren en bolle Boomen; buiten Groningen op de Mickelhorst in 't Bosch.

nigrum. 213. *RIBES* inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. *Sp.* 291. *n.* 3. *Gelr.* 134.

Grossularia non spinosa, fructu nigro. *Baub. pin.* 455. *Comm. hall.* 56.

Oed. dan. t. 556.

Zwarte Aalbezien. Belg.

Overvloedig langs de Hackfortsche - beek in 't Graaffschap Zutphen; aan de Duinkant van Holland op verscheide plaatsen; buiten Groningen op de Mickelhorst in 't Bosch, en by de Endevoortus-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 65

- tuffchen de Mickelhorst en Waterhuizen; en ook op de Wilgeboomen in de Laan van de Borg te Hemmen.*
214. *RIBES ramis aculeatis, baccis glabris, pedicel- Uvacrispa*
lis bractea monophylla. Sp. 292. n. 7. Gelr. 136.
Frif. 103.
Grossularia simplicis acino, vel spinosa fylvestris.
Baub. pin. 455. Comm. boll. 55.
Uva crispa. Dod. pempt. 748.
Oed. dan. t. 546.
Kruis - Doorn, Kruis - Beziën, Doorn - Beziën,
Steekel - Beziën, Stik - Bessen. Belg.
Krissen. Bommeliensibus.
Aan de Duinkant in 't Wild, en ook in de Heggen
op sommige plaatfen.

H E D E R A.

215. *HEDERA foliis ovatis lobatisque. Sp. 292. n. 1. Helle.*
Gelr. 132. Frif. 104.
Hedera arborea. Baub. pin. 305. Comm. boll. 56.
Hedera. Dod. pempt. 413.
Klimop, Boom - Veil. Belg.
Eyloof. Rusticis.

β. *Hedera maior sterilis. Baub. pin. 305. Comm. boll. 57.*
Kleine Veil of Klimop. Belg.
Veel aan oude Muuren. β. in den Haarlemmer -
Hout, in 't Haagfche en andere Boffchen, over-
vloedig in 't Goregt buiten Groningen.
Pharm. HEDERÆ ARBOREÆ. herb. bacc.
gummi.
Flores hujus fape hexandri hexapetali. (Nob. D.
FABRICIUS SIX.)

I L L E C E B R U M.

216. *ILLECEBRUM floribus verticillatis nudis, cau- verticilla-*
libus procumbentibus. Sp. 298. n. 1. Frif. 105. tum.
Paronychia ferpillifolia paluftris. Vaill. par. 157.
t. 15. f. 7.
Polygonum parvum, flore albo verticillato. Baub.
bift. 3. p. 371. Comm. boll. 89.
Oed. dan. t. 335.
Op vochtige Zandige gronden op de Veluwe, en by
Zelhem in 't Graaffchap Zutphen; op de Heide by

E
Rens-

66 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Renswoude en by de Bildt in 't Sticht van Utrecht; aan de Wallen en Wegen by het Heereveen, Orangewoud, Augustinisga, &c. in Friesland; en omtrent Zwol.

G L A U X.

- maritima.* 217. GLAUX. *Sp.* 301. *n.* 1. *Gelr.* 137. *Fris.* 106.
 Glaux *maritima*. *Baub. pin.* 215. *Comm. boll.* 45.
 Alfine bifolia, fructu coriandri, radice geniculata. *Loeff. pruss.* 13. *t.* 3.
Oed. dan. t. 548.
Zee-Melk-kruid. Belg.
 Aan de Zee-kant by Harderwyk, Elburg, Harlingen, Delfzyl, en andere plaatsen; op op de Haek langs 't Strand achter 's Gravezande; aan de Tkant, in de buitendykse landen buiten Amsterdam.

V I N C A.

- minor.* 218. VINCA caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Sp.* 304.
n. 1. *Gelr.* 138.
 Clematis daphnoides minor. *Baub. pin.* 301.
 Clematis daphnoides. *Dod. pempt.* 405.
Maagden-Palm, Vincoorde. Belg.
 In de Boschadie voor Uilenpas; en te Maurik in de Betuwe; by Haren, aan de Hooiweg naar de Waterhuizen buiten Groningen.
 Pharim. VINCE PERVINGÆ herb.

D I G Y N I A.

H E R N I A R I A.

- glabra.* 219. HERNIARIA glabra. *Sp.* 317. *n.* 1. *Gelr.* 139.
Fris. 107.
 Herniaria. *Dod. pempt.* 114.
 Polygonum minus f. Millegrana major. *Baub. pin.* 281. *Comm. boll.* 88.
Oed. dan. t. 529.
 Duizend-graen, Duizend-koorn. Belg.

PENTANDRIA DIGYNIA. 67

Op drooge zandige plaatsen buiten Haarlem; Zwol,
in de Wouden in Friesland; en elders.

C H E N O P O D I U M.

220. CHENOPODIUM foliis triangulari - sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. *Sp.* 318. n. 1. *Bonus Henricus.*

Lapathum unctuosum, folio triangulo. *Baub. pin.* 115. *Comm. boll.* 64.

Bonus Henricus. *Baub. bist.* 2. p. 965.

Oed. dan. t. 579.

Goeden Hendrik, Algoedé, Lammertjes - Ooren. Belg.

In de Moesbeven en by de Wegen; veel te Putten op de Veluwe; om Tiel en in de Tielerwaard; op 't Kerkhof te Zoelen, aan den Dyk by 't Dorp Heusden, en op de Pastory te Ommeren in de Neder-Betuwe; langs de Maas-dyk en op de Heide by 's Hage; op de Maat omtrent Wyk by Duurstede; en elders.

Pharm. BONI HENRICI herb.

221. CHENOPODIUM foliis cordato - triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis caule brevioribus. *Sp.* 318. n. 3. *Gelr.* 143. *Frif.* 108. *rubrum.*

Atriplex sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 119. *Comm. boll.* 14. *Morif. bist.* 2. p. 604. f. 5. t. 31. f. 1.

Pes anserinus. *Dod. pempt.* 616. *Dalech. bist.* 542. fig. opt.

Ganze-voet. Belg.

Op veele plaatsen langs de wegen en paden, by vervallene Gebouwen, en in de Moes-boven.

222. CHENOPODIUM foliis ovatis nitidis dentatis acutis, racemis ramosis nudis. *Sp.* 318. n. 4. *Gelr.* 144. *murale.*

Chenopodium 1. *Tabern. bist.* 812. f. 1.

Atriplex sylvestris latifolia, acutius folio. *Baub. pin.* 119.

Op de Muuren, en aan de kanten der Akkers op veele plaatsen.

223. CHENOPODIUM foliis rhomboideo - triangularibus *album.*

- bus crosis postice integris: summis oblongis, racemis erectis. *Sp.* 319. *n.* 6. *Gelr.* 141.
Atriplex sylvestris, folio sinuato candicante. *Baub. pin.* 119. *Comm. boll.* 13.
Atriplex sylvestris. *Fuchf. bist.* t. 119.
Wilde Melde. Belg.
Buiten Amsterdam, Doesburg, en elders langs de Dyken en Wegen, en op de Akkers.
- stride.* 224. *CHENOPODIUM* foliis rhomboideis: dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. *Sp.* 319. *n.* 7. *Fris.* 109.
Chenopodium sylvestre, opuli folio. *Vaill. par.* 36. t. 7. f. 1.
Atriplex sylvestris. *Baub. bist.* 2. p. 972.
Veel in de Moes - boven.
Cl. COMMELINUS Atriplicem sylvestrem I. B. habuit pro Chenopodio albo.
- hybridum.* 225. *CHENOPODIUM* foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis. *Sp.* 319. *n.* 8. *Gelr.* 144. *Fris.* 110.
Chenopodium stramonii folio. *Vaill. par.* 36. t. 7. f. 2.
Chenopodium 2. Tabern. bist. 812. f. 2.
Veel in Koorn-en andere Bouw-landen in Friesland; by Mesthoopen omtrent Zwol, en elders.
- Botrys.* 226. *CHENOPODIUM* foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Sp.* 320. *n.* 9. *Fris.* 111.
Botrys ambrosioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.
Botrys. Dod. pempt. 34.
Druiven-kruid, Motte-kruid. Belg.
In Boom-kwekeryen en sommige Moes-landen, tusschen de Boomen en Vruchten buiten Leeuwarden. (MEESE.)
Pharm. BOTRYOS. herb.
- glaucum.* 227. *CHENOPODIUM* foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis. *Sp.* 320. *n.* 13. *Gelr.* 142. *Fris.* 112.
Atriplex angustifolia laciniata minor. *Baub. bist.* 2. p. 972. *Comm. boll.* 14.
Veel langs de Wegen omtrent Amsterdam, Zwol, en elders by Boers-Woningen en Mesthoopen.
 228. *CHE-*

PENTANDRIA DIGYNIA. 69

228. *CHENOPODIUM* foliis integerrimis rhomboi- *Vulvaria.*
deo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus

Sp. 321. n. 14. *Fris.* 113.
Atriplex foetida. *Baub.* pin. 119.
Vulvaria. *Dalech. bist.* 543.
Stinkende Melde. Belg.
Overal in Moes-boven, en aan de Wegen in Fries-
land.

229. *CHENOPODIUM* foliis intergerrimis ovatis, *polysper-*
caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis *muu.*
axillaribus. *Sp.* 321. n. 15.

Blitum polyspermum. *Baub.* pin. 118.
Blitum minus polyspermum a seminis copia. *Morif.*
bist. 2. p. 599. f. 5. t. 30. f. 6.
In de Moes-boven op verscheide plaatsen.

- 230 *CHENOPODIUM* foliis subulatis semicylindricis. *maritimum.*
Sp. 321. n. 17. *Fris.* p. 87.

Kali minus album, femine splendente. *Baub.* pin.
289. *Morif. bist.* 2. p. 610. f. 5. t. 33. f. 3.
Kali minus, f. Sedum minus arborefcens vermi-
culatum. *Baub. bist.* 3. p. 702. *Comm. boll.* 62.
Oed. dan. t. 489.
Kleine witte Kali. Belg.
Overvloedig op de weg naar de Helder op 't Koe-
gras, en aan de Zee-kant by 's Gravezande,
Enkhuisen, Delfzyl, en in Friesland.

B E T A.

231. *BETA* floribus geminis. *Sp.* 322. n. 1. *maritima.*
Beta sylvestris maritima. *Baub.* pin. 118.
Wilde Beete of Kroote. Belg.
Aan de Zee-kant by Helvoetfluis.

S A L S O L A.

232. *SALSOLA* herbacea decumbens, foliis subulatis *Kall.*
spinosis scabris, calycibus marginatis axillari-
bus. *Sp.* 322. n. 1. *Gelr.* 146. *Fris.* 114.
Kali spinoso affinis. *Baub.* pin. 289. *Comm. boll.* 62.
Morif. bist. 2. p. 611. f. 5. t. 33. f. 11.
Seekende Kali. Belg.
Op veelte plaatsen langs de Zee-kant by Hoophuisen
bui-

buiten Harderwyk, by Scheveningen, 's Gravezande, Zandvoort, Wyk op Zee; *aan de Zee-dyk* by Medenblick, *en tuffchen* Harlingen *en* Roptazyl.

- Soda.* 233. *SALSOLA* herbacea patula, foliis inermibus. *Sp.* 323. n. 6.

Kali. *Dod. pempt.* 81.

Kali majus, cochleato femine. *Baub. pin.* 287.

† *Volgens* BOERHAAVE.

Pharm. KALI herb.

- fruticosa.* 234. *SALSOLA* fruticosa erecta, foliis filiformibus obtusiusculis. *Sp.* 324. n. 11.

Kali species, f. Vermicularis marina arborescens.

Baub. bist. 3. p. 704. *Comm. boll.* 62.

Anthyllis chamæpityides frutescens. *Baub. pin.* 282.

Op 't Eyland Walcheren *en* Texel.

U L M U S.

- campestris.* 235. *ULMUS* foliis duplicato-ferratis: basi inæqualibus. *Sp.* 327. n. 1. *Gelr.* 151.

Ulmus campestris & theophrasti. *Baub. pin.* 426.

Comm. boll. 116.

Ulmus. *Dod. pempt.* 837.

Olm-boom, *Ypen-boom*, *Herseleer.* Belg.

Overal aan de Wegen en in de Bosschen.

G E N T I A N A.

- Pneumonanthe.* 236. *GENTIANA* corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus. *Sp.* 330. n. 5. *Gelr.* 147. *Fris.* 116.

Gentiana angustifolia autumnalis major. *Baub. pin.* 188. *Comm. boll.* 44. *Morif. bist.* 3. p. 483.

f. 12. t. 5. f. 12.

Gentiana palustris angustifolia. *Dod. pempt.* 168.

Oed. dan. t. 269.

Klein Gentiaan, *Blauwe Lelytjes*, *Spade Klokkens.* Belg.

In Veen-landen en op vochtige Hei-velden by Harderwyk, Hartskamp, Voorthuizen, Barneveld, Hal, Uitenpas, *en elders in* Gelderland; by Naarden, Utrecht, Zwol, by Heerenveen, Bergum, Rot.

Rotteval, Dragten, en elders in Friesland; by Haren, de Mickelhorst, en elders in de Provintie Groningen.

237. GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus. *Sp.* 331. n. 10. *verna.*
 Gentianella alpina verna major. *Baub. pin.* 188.
 Gentianella verna minor. *Chuf. bist.* 1. p. 315.
 Ericoila Reneale *spec.* 75. t. 68.
 † Volgens BOERHAAVE.
238. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. *Centaureum.*
Sp. 332. n. 17. *Gelr.* 149. *Fris.* 117.
 Centaurium minus. *Baub. pin.* 278. *Dod. pempt.* 336. *Comm. boll.* 23.
 Duizend-guldens-kruid, Kleine Santory. Belg.
 β. Centaurium minus, flore albo. *Baub. pin.* 278.
Boerb. lugdb. 1. p. 223.
 Overvloedig in de Duin-valeyen van Holland; in schraale Wei landen te Avesaatte, Maurik, en vooral te Ommeren in de Betuwe; in de Weilanden by Zutphen, en tusschen Harderwyk en Doornspyk; ook by Zeist, Amerongen, Nécrlangbroek, Wykerflood in de Provincie Utrecht; by Franeker, Bergum, Dragten, Oostermeer en Heerenveen in Friesland op verschillende gronden en in groote menigte op 't Eiland Schiermunnikoog.
 Pharm. CENTAURII MINORIS herb. summit.
239. GENTIANA corollis quadrifidis fauce barbatis. *campestris.*
Sp. 334. n. 23.
 Gentiana purpurea minima. *Col. ecphr.* 1. p. 223. t. 221.
 Gentianella alpina verna minor. *Baub. pin.* 188.
Oed. dan. t. 367.
 Op de Heide by Hengel in 't Graaffschap Zutphen; in de Duinen tusschen Velsen en Beverwyk, agter de Hofftede Westerhout; en agter Leyduin by de Vogelzang buiten Haarlem.
240. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus, *Cruciata.*
 floribus verticillatis sessilibus. *Sp.* 334. n. 25.
 Gentiana cruciata. *Baub. pin.* 188. *Comm. boll.* 43.
Boerb. lugdb. 1. p. 205.

72 PENTANDRIA DIGYNIA.

Gentiana minor. *Cam. epit.* 417.

Maldelgeer. Belg.

In verſcheide Duin-valeeyen agter Overveen buiten Haarlem; en overvloedig langs de weg naar Scheveningen buiten 's Hage.

ERYNGIUM.

maritimum 241. *ERYNGIUM* foliis radicalibus subrotundis plicatis, spinosis, capitulis pedunculatis paleis tri-
cuspidatis. *Sp.* 337. *n.* 5. *Gelr.* 152. *Fris.* 118.
Eryngium maritimum. *Baub. pin.* 386. *Comm.*
boll. 35.

Eryngium marinum. *Dod. pempt.* 370. *Clus. bist.* 2.
p. 169. *Cam. epit.* 448.

Zee-Kruis-Distel, Meer-Distel. Belg.

Veel aan de Zee-kant by Harderwyk; aan de Zee-Dyken en Duinen van Holland, en digt by het strand te Zandvoort; in Friesland tusſchen Harlingen en Roptazyl, en elders aan de Zee-Dyken; ook binnenslands by Schagen buiten Alkmaar.
Pharm. ERYNGII MARITIMI rad.

campestre. 242. *ERYNGIUM* foliis radicalibus amplexicaulibus
pinnato-laciniatis. *Sp.* 337. *n.* 8. *Gelr.* 153.
Eryngium vulgare. *Baub. pin.* 386. *Comm. boll.* 35.
Eryngium campestre vulgare. *Clus. bist.* 2. *p.* 157.
Oed. dan. t. 554.

Veld-Kruis-Distel, Wallen-Distel. Belg.

Tuimel-Distel. Vulgo.

Overvloedig aan den Yſſel-dyk in Gelderland en Overyſſel; aan de Lek-dyk in de Provincie Utrecht; by de vervallen Kerk op Muiderberg; langs de Dyken by Loosduinen, Monſter, 's Gravezande; en elders op zandige ruwe plaatſen.

HYDROCOTYLE.

vulgaris. 243. *HYDROCOTYLE* foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *Sp.* 338. *n.* 1. *Gelr.* 154. *Fris.* 119.

Hydrocotyle vulgaris. *Tourn. inſt.* 328. *Lind. alſ.*
266. t. 12.

Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio. *Baub.*

pin

pin. 180. Comm. boll. 96.
 Coryledon palustris. Dod. pempt. 113.
 Oed. dan. t. 90.

Water-Navel-Kruid. Belg.

In vochtige Wei- en Hooi-landen by Harderwyk,
 Amsterdam, Zwol, en elders; ook in de Duin-
 valeyen; in Friesland in de Wouden; en in de
 Provincie Groningen by Haren, de Waterhui-
 zen, &c. zeer gemeen, aan kanten van Slooten,
 en op andere vochtige gronden.

S A N I C U L A.

244. SANICULA foliis radicalibus simplicibus, floscu- *europæa.*
 lis omnibus sessilibus. Sp. 339. n. 1. Gelr. 155.

Sanicula officinarum. Baub. pin. 319.

Diapensia. Cam. epit. 763.

Oed. dan. t. 283.

Sanikel, Breuk-kruid. Belg.

Op schaduwwachtige plaatsen by Engelenburg en Uil-
 lenpas in Gelderland.

Pharm. SANICULÆ herb.

B U P L E U R U M.

245. BUPLEURUM involucris universalibus nullis, *rotundifo-*
 foliis perfoliatis. Sp. 340. n. 1. Gelr. 169. *lium.*

Perfoliata vulgarissima, s. arvensis. Baub. pin.

277.

Perfoliata. Dod. pempt. 104.

Deurwas, Doorwas. Belg.

In de Koorn-landen by Uilenpas en Hunderen in
 Gelderland.

T O R D Y L I U M.

246. TORDYLIUM umbellis confertis, foliolis ova- *Anthriscus.*
 to-lanceolatis pinnatifidis. Sp. 346. n. 6. Fris.

120.

Caucalis femine aspero, flosculis rubentibus.

Baub. pin. 152. prodr. 80. Boerb. lugdb. 1. p.

63.

Caucalis minor, flore rubente. Moris. bist. 3. p.

308. f. 9. t. 14. f. 8.

Akker-Klitzzen. Belg.

E 5

Langs

Langs de zandige Wegen buiten Haarlem, Utrecht, Zwol, en in de Schermer buiten Alkmaar. Aan drooge Wallen en op andere ſchraale plaatſen en wegen buiten Franeker, en elders in Friesland.

In Comm. boll. 23. perperam hæc planta reeenſetur nomine Caucalidis lato apii folio. Baub. pin. 152.

nodosum. 247. **TORDYLIUM** umbellis ſimplicibus ſeſſilibus, ſeminibus exterioribus hiſpidis. *Sp. 346. n. 7. Friſ. 121.*

Caucalis nodosa, echinato ſemine. Baub. pin. 153. prodr. 80. Baub. biſt. 3. p. 83.

In Friesland by de voorige. (MEESE.)

D A U C U S.

Carota. 248. **DAUCUS** ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis. *Sp. 348. n. 1. Gelr. 156. Friſ. 122.*

Pastinaca tenuifolia ſylveſtris dioſcoridis, vel Daucus officinarum. Baub. pin. 151. Comm. boll. 85. Morif. biſt. 3. p. 305. f. 9. t. 13. f. 2.

Wilde - Peen, Vogel - neſt, Kroontjes - kruid. Belg.

Overvloedig in braak - leggende Zaaï - landen by Tiel, Zutphen, Doesburg, Harderwyk; aan de Duinkanten van Holland; aan de wegen om Wyk by Duurſtede; aan de ryd - en trekweg tuiſſchen Harlingen en Franeker; en elders.

Pharm. DAUCI VULGARIS ſem.

B U N I U M.

Bulbocastanum. 249. **BUNIAM**. *Sp. 349. n. 1.*

Bulbocastanum majus, folio apii. Baub. pin. 162.

Comm. boll. 17.

Nucula terreſtris. Lob. biſt. 429.

Oed. dan. t. 220.

Aard - Nooten. Belg.

By Loosduinen; Monſter, de Zandpoort, en omtrent Velleſen in de Zaaï - landen.

C O N I U M.

maculatum. 250. **CONIUM** ſeminibus ſtriatis. *Sp. 349. n. 1. Gelr. 157. Friſ. 123.*

Cicuta major. Baub. pin. 160. Comm. boll. 26.

Me-

PENTANDRIA DIGYNIA. 73

Morif. bist. 3. p. 290. f. 9. t. 6. f. 1.
Dalle - Kervel, Scheerling. Belg.
Veel by de Wegen en Paden, en aan de Slooten, als
ook in de Besschen.
 Pharm. CICUTÆ MAJORIS herb.

S E L I N U M.

251. SELINUM radice fusiformi multiplici. *Sp. 350. sylvestre.*
n. 1. Gelr. 158.
Apium sylvestre lacteo succo turgens. Baub. pin.
153. Comm. boll. 12.
Thyselinum plinii. Lob. bist. 409. Morif. bist. 3.
p. 319. f. 9. t. 17. f. 2.
Wilde Peterfelie. Belg.
Aan de kanten van de Boomgaarden, op vochtige
schaduwachtige plaatsen, buiten Haarlem, U-
trecht, Zwol, en elders.

252. SELINUM sublaetescens, radice unica. *Sp. 350. palustre.*
n. 2. Frisf. 124.
Seseli palustre laetescens. Baub. pin. 162. prodr.
85. Comm. boll. 105.
Seseli palustre laetescens acre, foliis ferulaceis,
flore albo, semine lato. Baub. bist. 3. p. 189.
Wilde - Eppe. Belg.
Overvloedig in de Slooten om Tiel; in de Weiden te
Kraalingen by Rotterdam; aan de Slootswallen
by Tjetjerk, Bergum, en elders in de Wouden
in Friesland; in stilstaande Poelen en byna uitge-
droogde Slooten in de Zillik in Overysfel.

P E U C E D A N U M.

253. PEUCEDANUM foliis quinques tripartitis fili- *officinales*
formibus linearibus. Sp. 353. n. 1. Frisf. 125.
Peucedanum germanicum. Baub. pin. 149.
Peucedanum. Baub. bist. 3. p. 36.
Varkens - Venkel. Belg.
Aan de wegen en kanten der Slooten te Bergum,
Oostermeer, Langweer, Heerenveen, &c. in
Friesland.
 Pharm. PEUCEDANI rad.

CRITH.

C R I T H M U M.

- maritimum* 254. CRITHMUM foliolis lanceolatis carnosiss. Sp.
354 n. 1.
Crithmum f. Foeniculum maritimum minus. Baub.
pin. 288. Boerb. lugdb. 1. p. 57.
Foeniculum marinum. f. Empetrum. f. Calcifraga.
1. ob. ic. 392.
Zee-Venkel, Zee-Peterfelie. Belg.
In Zeeland.

H E R A C L E U M.

- Sphondyli-* 255. HERACLEUM foliolis pinnatifidis lævibus, flo-
um. ribus uniformibus. Sp. 358. n. 1. Gelr. 175.
Sphondylium vulgare hirsutum. Baub. pin. 157.
Comm. boll. 108. Morif. bist. 3. p. 313. f. 9. t. 16. f. 1.
Beeren-Klaauw. Belg.
Zeer veel in de Betuwe, Tielerwaard, en om Tiel;
buiten Harderwyk langs 't voetpad aan de Hooge
Sydel; in 't Haagfche Bosch; in den Haarlem-
mer-hout; om Utrecht, Wyk by Duurstede,
Zwol, in 't Goregt buiten Groningen; en elders
op fchaduwachtige plaatfen.

L I G U S T I C U M.

- Levisticum.* 256. LIGUSTICUM foliis multiplicibus: foliolis su-
perne incis. Sp. 359. n. 1.
Ligusticum vulgare. Baub. pin. 157. Comm. boll. 66.
Levisticum vulgare. Morif. bist. 3. p. 275. f. 9.
t. 3. f. 1.
Lavas. Belg.
Lubbestok, Mans-kracht. Rusticis.
In de Duinen van den Weeligen-berg tusschen
Haarlem en Bennenbroek, en elders.
Pharm. LEVISTICI rad. berb. fem.

A N G E L I C A.

- silvestris.* 257. ANGELICA foliolis æqualibus ovato-lanceolatis
ferratis. Sp. 361 n. 2. Gelr. 161. Fris. 126.
Angelica sylvestris major. Baub. pin. 155. Comm.
boll. 10.
Angelica sylvestris. Dod. pempt. 318.

Wilde Angelica. Belg.

In de Bofschadien by Uilenpas, Enghuifen, Tiel, en elders in Gelderland; langs de Graften en Slooten by 's Hage; in de Veen-landen by Amstelveen; in den Aardenbouts-laan buiten Haarlem; aan de Zander-floot buiten Alkmaar; te Bergum, Oostermeer, Langeweer, Heerenveen, en elders in Friesland; op de Mickelhorst en elders buiten Groningen.

S I U M .

258. *Sium* foliis pinnatis, umbella terminali. *Sp. latifolium.*
361. n. 1. *Gelr.* 162.

Sium latifolium. *Baub. pin.* 154.

Sium sive *Apium* palustre, foliis oblongis. C. B.
Comm. bell. 106.

Sium majus latifolium. *Morif. bist.* 3. p. 282. f. 9.
t. 5. f. 1.

Oed. dan. t. 246.

Water - Eppe. Belg.

In veele Slooten en Beeken; overvloedig aan 't Eind van de Hooge Sytel by Harderwyk; en aan de Duinkant.

Synonymum C. *Baub. a Commelino allegatum* pertinet ad *Sium angustifolium* Linn.

259. *Sium* foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. *Sp. nodiflorum.*
361. n. 2. *Trif.* 128.

Sium aquaticum procumbens ad alas floridum.

Morif. bist. 3. p. 283. f. 9. t. 5. f. 3.

Als vooren; en in de Slooten rondom Zandhorst in Holland; ook omtrent Augustinisga, en aan de kanten van de Rivier de Tjonger of Kuinder by Oude-Berkoop in Friesland.

Confunditur ab imperitis cum *Sisymbrio Nasturtio* aquatico dicto.

S I S O N.

260. *Sison repens*, umbellis bifidis. *Sp.* 363. n. 5. *Inundatum.*
Fngr. 43. *Trif.* 129.

Sium minimum, foliis imis ferulaceis. *Morif. bist.*
3. p. 283. f. 9. t. 5. f. 5.

Millefolium aquaticum umbellatum capillaceo bre-

brevique folio. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 74. *Oed. dan. t.* 89.

In stilstaande zoete wateren aan de Duinkant by den Aardenhout; en buiten Utrecht; in natte gruppels, in en aan de kanten der Slooten, omtrent Kuikhorne, Bonte-bok, Ureterp, Deurswoide, Haule, &c. in Friesland.

O E N A N T H E.

stulosa. 261. *OENANTHE stolonifera*, foliis caulinis pinna-
tis filiformibus fistulosis. *Sp.* 365. *n.* 1. *Gelr.* 165. *Fris.* 138.

Oenanthe aquatica. Baub. pin. 162. *Comm. boll.* 81. *Juncus odoratus aquatilis. Dod. pempt.* 590.

Welriekende Water-Biesen. Belg.

£. *Oenanthe aquatica minor. Boerb. lugdb. i. p.* 51. *Veel in stilstaande Wateren en vochtige Wei-landen.*

P H E L L A N D R I U M.

aquaticum. 262. *PELLANDRIUM foliorum ramificationibus*
divaricatis. Sp. 366. *n.* 1. *Gelr.* 166. *Fris.* 131. *Phellandrium. Dod. pempt.* 591.

Cicutaria palustris tenuifolia. Baub. pin. 161. *Comm. boll.* 26.

Water-Kervel. Belg.

Op veele plaatsen in de Slooten en Graften.

Pharm. PHELLANDRII herb. sem.

Bobus innoxium est tabulum.

C I C U T A.

virens. 263. *CICUTA umbellis oppositifoliis*, petiolis margi-
natis obtusis. *Sp.* 366. *n.* 1. *Gelr.* 167. *Fris.* 132. *Cicuta aquatica gesneri. Baub. bist.* 3. *p.* 179. *Sium erucæ folio. Baub. pin.* 154. *Comm. boll.* 106. *Sium alterum. Dod. pempt.* 589. *Oed. dan. t.* 208.

Dolle-Kervel of Water-Scheerling. Belg.

Op verscheide plaatsen in de Slooten en Moerassen; aan 't Konings-meer by Meerveld op de Veluwe; in eenen diepen Sloot boven de Stad Cutlenburg; veel aan de Duinkant, en om 's Hage in de veen-plaatsen; en in de Oost- en West-beek; in de Sloo-ten

PENTANDRIA DIGYNIA.

79

ten nevens 't Hoorensche-diep, en aan de Offe-
brink agter de Mickelhorft, ook by de Water-
huizen buiten Groningen.
Pharm. Cicutæ herb.

Æ T H U S A.

264. *ÆTHUSA* foliis conformibus. Sp. 367. n. 1. *Cynopium*.
Gelr. 168. Fris. 132.
Cicuta minor, petroselinio similis. Baub. pin. 160.
Comm. boll. 26. Moris. bist. 3. p. 290. f. 9. t. 7. f. 2.
Cicutaria fatua. Lob. ic. 280.
Kleine Dulie - Kervel, *Wilde Eppe*, *Wilde Peterse-
lie*, *Honds - Peterfelie*. Belg.
*Buiten Amsterdam op de weg naar Amstelveen;
in 't Haagse-bosch tusschen de Akkers, en veel
by de Boere-boeven in de Duinen; ook veel omtrent
Deventer en Zwol; en in Friesland aan de We-
gen, in de Boschen en Moes-boven op veele plaat-
sen.*

S C A N D I X.

265. *SCANDIX* seminibus rostro longissimo. Sp. 368. *Pecten*.
n. 2. Gelr. 170. Fris. 134.
Scandix, semine rostrato, vulgaris. Baub. pin.
152. Comm. boll. 103. Moris. bist. 3. p. 304. f.
9. t. 11. f. 1.
Pecten veneris. Cam. epit. 302.
Naalde - Kervel. Belg.
Ooijevaar - Neb, *Kraanebek*. Rusticis.
In de Zaaïlanden op veele plaatsen.
266. *SCANDIX* seminibus nitidis ovato - subulatis, *Cerefolium*
umbellis sessilibus lateralibus. Sp. 368. n. 3.
Gelr. 172.
Chærophyllum sativum. Baub. pin. 152. Comm.
boll. 25.
Chærefolium. Dod. pempt. 700.
Kervel. Belg.
*Komt op veele Akkers en in Moes-boven van zelfs
voort.*
Pharm. *CHÆROPHYLLI* herb. sem.
267. *SCANDIX* seminibus ovatis hispidis, corollis *Anthriscus*
vul-

uniformibus, caule lævi. *Sp.* 368. *n.* 4. *Gelr.* 171. *Frif.* 135.

Cerrefolium sylvestre annuum, feminibus brevioribus villosis. *Morif. bist.* 3. *p.* 303. *f.* 9. *t.* 10. *f.* 2.

Myrrhis sylvestris, feminibus asperis. *Baub. pin.* 160. *Comm. boll.* 79.

Veel by de wegen op ruwe plaatsen buiten Harderwyk, Amsterdam, aan de Stads-wal te Franeker; en elders.

C H Æ R O P H Y L L U M.

sylvestre. 268. *C H Æ R O P H Y L L U M* caule lævi striato geniculis tumidiusculis. *Sp.* 369. *n.* 1. *Gelr.* 173. *Frif.* 136.

Myrrhis sylvestris, feminibus lævibus. *Baub. pin.* 160. *Comm. boll.* 79.

Myrrhis vulgaris. *Dod. pempt.* 701.

Wilde Kervel, Pyp-kruid. Belg.

By de wegen en in de velden, omtrent Scheveningen, Heemstede, Zwol, &c.

Luscinias allicere dicitur, unde Nagtegaals-kruid Westfrisijs audit.

tumulentum. 269. *C H Æ R O P H Y L L U M* caule scabro: geniculis tumidis. *Sp.* 370. *n.* 3. *Gelr.* 174.

Chærophylum sylvestre. *Baub. pin.* 152. *Comm. boll.* 79.

Myrrhis annua vulgaris, caule fusco, *Morif. bist.* 3. *p.* 302. *f.* 9. *t.* 10. *f.* 7.

Wilde Kervel. Belg.

Langs de wegen, op vochtige schaduwachtig plaatsen omtrent Harderwyk, 's Hage, Haarlem, Zwol, &c.

P A S T I N A C A.

fastiva. 270. *P A S T I N A C A* foliis simpliciter pinnatis. *Sp.* 376. *n.* 1. *Gelr.* 176. *Frif.* 137.

Pastinaca sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 155. *Comm. boll.* 85. *Morif. bist.* 3. *p.* 314. *f.* 9. *t.* 16. *f.* 2.

Wilde Pastinaken, of Pinxternakels. Belg.

In de Weiden, en aan de kanten der Akkers, ook by de wegen omtrent Harderwyk, 's Hage, Haarlem,

PENTANDRIA DIGYNIA.

81

Iem, Utrecht; in Friesland 200 op de Kley als in de Wouden; overvloedig aan de Slooten van 't laage land van 't Goregt buiten Groningen.
Pharm. PASTINACE SYLVESTRIS rad. fem.

S M Y R N I U M.

271. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis *olusatrum* ferratis. Sp. 376. n. 3.
Hippofelinum theophrasti f. Smyrnum dioscoridis. Baub. pin. 154. Comm. boll. 59.
Hippofelinum. Dod. pempt. 698.
Grootste Eppe, Wilde Eppe. Belg.
Veel op 't Eyland Texel.
Pharm. OLERIS ATRI herb. fem.

C A R U M.

272. CARUM. Sp. 378. n. 1. Fragr. 45. Frisf. 138. Dod. Carul. pempt. 299. Cam. epit. 516.
Cuminum pratense, Carui officinarum. Baub. pin. 158. Comm. boll. 29.
Caraway, Caruwy, Hof-Comyn. Belg.
In 't Broeck by Arnhem; in de Weiden om Tiel, en te Meinderswyk in de Betuwe; aan den Dyk tusschen Amsterdam en Muyden; by Houten buiten Utrecht; in verscheide Weilanden buiten Franeker; in een stuk Weiland even buiten de Ebbinge-poort te Groningen.

P I M P I N E L L A.

273. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; summis linearibus. Sp. 378. n. 1. Gelr. 179. Frisf. 139.
Pimpinella saxifraga minor. Baub. 160. Cam. epit. 775. Comm. boll. 88.
Tragofelinum foliis pinnatis, pinnis ovatis. Hall. bist. 1. p. 350.
Kleine Bevernel, Bevernaart, of Steenbreek. Belg.
Op zandige plaatsen by Hattem, Zwol, Velsen, in de wildernis by 's Huis te Bredenrode achter de Zandpoort; in de Duinen tusschen de Heide buiten 's Hage; aan de Wegen en op Heivelden by Bergum, Heerenveen en Orange-woud in Friesland

*magna.*274. PIMPINELLA foliis omnibus lobatis; impari-trilobo. *Mant.* 219.

Pimpinella saxifraga major, umbella candida.

Baub. pin. 159. *Comm. boll.* 88.Pimpinella saxifraga. *Cam. epit.* 775.Saxifraga magna. *Dod. pempt.* 315.Tragoselinum foliis pinnatis, pinnis lanceolatis, ferratis, extremis trilobatis. *Hall. bist.* 1. p. 349.

Grooté Bevernel, Bevernaart, of Steenbreek. Belg. Buiten Haarlem voorby de Zandpoort op hooge landen.

Pharm. PIMPINELLÆ ALBÆ rad. sem.

Præcedenti minus acris.

A P I U M.

graveolens. 275. APIUM foliis caulinis cuneiformibus. *Sp.* 379. n. 2. *Gelr.* 181. *Frif.* p. 87.Apium palustre & Apium officinarum. *Baub. pin.* 154. *Comm. boll.* 12.Apium palustre. *Cam. epit.* 527.

Tuffrouw-Merk, Eppe, Wilde Seldery. Belg.

Langs de Muider-dyk omtrent Amsterdam; langs de weg naar Spaarnwoude en 't Penninx-veer buiten Haarlem; in de Slooten tusschen het Riet langs de Maas agter 's Gravendyk; in Waterland; aan de kanten der Slooten op veele plaatsen buiten Alkmaar; op 't Eyland Schokland; aan den Yssel-dyk by Campen; ook in Worrummer-Nylanden in Friesland.

Pharm. APII. rad. herb. sem.

Æ G O P O D I U M.

Podagraria 276. ÆGOPODIUM foliis caulinis summis ternatis. *Sp.* 379. n. 1. *Gelr.* 180. *Frif.* 140.Angelica sylvestris minor sive erratica. *Baub. pin.* 155. *Comm. boll.* 11.Herba gerardi. *Dod. pempt.* 320.

Gerards-Kruid, Fliersin-Kruid, Haanepoot. Belg. Zevenblad. Vulgo.

Overvloedig by de Wegen, aan Wallen, in Hoven, onder de Heggen op schaduwachtige plaatsen.

PENTANDRIA TRIGYNIA

83

T R I G Y N I A

V I B U R N U M.

277. *VIBURNUM* foliis lobatis, petiolis glandulosis. *Opulus*.

Sp. 384. n. 7. *Gelr.* 183.

Sambucus aquatica, flore simplici. *Baub. pin.* 456.

Sambucus palustris. *Dod. pempt.* 846.

Water-Vlier. Belg.

By de Geldersche Toorn, Engelenborgh, in Elderik, Wehl. in 't Graafschap Zutphen; in Tonsel en Hierden buiten Harderwyk; in 't Haagse bosch; in de Herkeloer- en Salker-Waart; in 't bosch op de Mickelhorst, en te Onnen by Groningen.

Varietas hujus flore globofo pleno, quæ in hortis colitur, vulgo Geldersche-Roos, Sneeuw-ballen, Bal-Roozen vocatur.

S A M B U C U S.

278. *SAMBUCUS* cymis tripartitis, stipulis foliaceis, *Ebulus*.
caule herbaceo. *Sp.* 385. n. 1. *Gelr.* 185. *Frif.*

141.

Sambucus humilis f. *Ebulus*. *Baub. pin.* 456.

Comm. boll. 102.

Ebulus. *Dod. pempt.* 381.

Wilde Vlier, Laage Vlier, Haddig. Belg.

Overvloedig langs de weg tusschen Gend en Bemmel; te Ogten en Ommeren, en aan den Dyk tusschen Lienden en Kesteren in de Betuwe; in Tonsel en elders buiten Harderwyk; opeen braakland by ter Wolde; langs de Trekvaart by Delft; te Asch buiten Buuren; by Leerdam en Heukelum; tusschen Odyk en Werkhoven, om Wyk by Duurstede, en langs de weg by Cothen en Bunnik in 't Sticht van Utrecht; buiten Leeuwaarden, en omtrent Huysum en Oostermeer in Friesland.

Pharm. EBULI rad. cort. interior, herb. bacc.

279. *SAMBUCUS* cymis quinquepartitis, caule arbo- *nigra*.
reo. *Sp.* 385. n. 3. *Gelr.* 185. *Frif.* 142.

Sambucus fructu in umbella nigro. *Baub. pin.* 456.

F 2

Comm.

Comm. boll. 102.

Sambucus. Dod. pempt. 845.

Oed. dan. t. 545.

Vlier-boom. Belg.

β. *Sambucus laciniato folio. Baub. pin.* 456.

In losſchen en aan ruige wallen, by vervallene gebouwen, en op kerkboven aan veele plaatſen; overvloedig in de Duinen by Haarlem, Heemſtede, en Katwyk.

Pharm. SAMBUCI cort. interior, flor. bacc. ſem.

C O R R I G I O L A.

Moralis. 280. *CORRIGIOLA. Sp.* 388. *n.* 1. *Gelr.* 186.

Polygonum littoreum minus, floſculis ſpadiceo-albicantibus. Baub. pin. 284. *prodr.* 131. *Comm. boll.* 90. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 593. *f.* 5. *t.* 29. *f.* 1.

Polygoni-vel Linifolia per terram ſparſa, flore ſcorpionides. Baub. biſt. 3. *p.* 379. *Comm. boll.* 91.

Oed. dan. t. 334.

Aan den Oever van den Ouden-Yſſel by Keppel; aan de Zandvaart by 't Kraayeneſt buiten Haarlem; en aan de Bilt buiten Utrecht op zandige gronden.

A L S I N E.

media. 281. *ALSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. Sp.* 389. *n.* 1. *Gelr.* 253. *Frif.* 143.

Alſine media. Baub. pin. 250. *Comm. boll.* 7. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 550. *f.* 5. *t.* 23. *f.* 4.

Alſine vulgaris f. Moriſus gallinæ. Baub. biſt. 3. *p.* 363.

Oed. dan. t. 525. 438.

Hoenderbeet, Muur, Vogel-Kruid. Belg.

Erf. Vulgo.

β. *Alſine aquatica major. Baub. pin.* 251.

Water-Muur. Belg.

Veel in de Hoven, en aan ruige Wallen en Wegen.

Aan de Duinkant in ſtilſtaande Wateren en Slooten by Overveen buiten Haarlem, en te Westbroek in 't Sticht van Utrecht.

Pharm. α ALSINES berb.

T B.

PENTANDRIA TETRAGYNIA. 35

T E T R A G Y N I A.

P A R N A S S I A.

282. PARNASSIA. Sp. 391. n. 1. Gelr. 187. *palustris.*
 Gramen parnassi, albo simplici flore. Baub. pin.
 309. Comm. boll. 55.
 Gramen parnassium. Dod. pempt. 564.
 Oed. dan. t. 584.
 Gras van Parnas. Belg.
*In de vochtige landen tusschen 's Heeren - Loo en
 Telg; in 't Veen tusschen Hartskamp en Effen
 op de Veluwe; op de Heide by Selhem in 't Graaf-
 schap Zutphen; in de vochtige Duin - valeyen by
 's Hage. Lisse, Wyk op Zee, Raaphorst, &c.
 ook by de nieuwe Kolk buiten Haarlem; en over-
 vloedig in de Velden tusschen Alkmaar en Egmond
 op den Hoef.*

P E N T A G Y N I A.

S T A T I C E.

283. STATICE scapo simplici capitato, foliis linea- *Armeria.*
 ribus. Sp. 394. n. 1. Gelr. 188. Fris. :44.
 Caryophyllus montanus major, flore globoso. Baub.
 pin. 211. Comm. boll. 22.
 Gramen polyanthemum majus. Dod. pempt. 564.
Bloeyend Zee-gras. Belg.
 β. Caryophyllus montanus minor. Baub. pin. 211.
 Comm. boll. 22.
*Veel by Harderwyk in de Meben; buiten Naarden
 aan de booge Zee-kant, naar Huysen en Oude-
 naarden; in Zeeland op de stranden; buiten Har-
 lingen aan de Zee-dyk, en by Franeker op een
 waterachtige plaats.*
 284. STATICE scapo paniculato tereti, foliis lævibus *Linonium.*
 enerviis, subtus mucronatis. Sp. 394. n. 2. Fris.
 145.

86 PENTANDRIA. PENTAGYNIA.

*Limonium maritimum majus. Baub. pin. 192.
Comm. boll. 67.*

Valerianæ rubræ similis. Dod. pempt. 351.

Oed. dan. t. 315.

Limoen-kruid. Belg.

ƒ. *Limonium parvum, bellidis minoris folio. Baub. pin. 192.*

Overvloedig achter 's Gravezande aan't Zee-strand; op 't Kogras op de Weg naar de Helder; op de Zeeuwſche Schorren, veel op 't Eyland van Terneuse; en van de Zee-dyk by Harlingen. ƒ. Aan de Zwartewaters-dyk by Haſſelt.

Pharm. BEHEN RUBRI rad.

L I N U M.

*afflatiffi-
mum.*

285. *LINUM calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subfolitario. Sp. 397. n. 1. Gelr. 190. Frif. 146.*

Linum arvenſe. Baub. pin. 214.

Linum ſylveſtre ſativum plane referens. Baub. biſt. 3. p. 452. Comm. boll. 67.

Wild Vlas. Belg.

Onder de Haver en Garſt op verſcheide plaatſen.

Pharm. LINI ſem. far. ol.

*catharti-
cum.*

286. *LINUM foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. Sp. 401. n. 18. Gelr. 191.*

Linum pratenſe, floſculis exiguis. Baub. pin. 214.

Alfine verna glabra, floſculis albis, vel potius

Linum minimum. Baub. biſt. 3. p. 455.

Spergula bifolia, lini capitulis. Loeſ. pruff. 261. t. 80.

Purgeer-Vlas. Belg.

Op vochtige plaatſen langs den Duinkant buiten 's Hage; overvloedig tuſſchen Velfen en Beverwyk; ook in de Salker-waart by Campen.

Pharm. LINI CATHARTICI herb.

Radiola.

287. *LINUM foliis oppoſitis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. Sp. 402. n. 19. Gelr. 192. Frif. 147.*

Radiola vulgaris ſerpillifolia. Raj. angl. 3. p. 161. t. 15. f. 3.

Po-

PENTANDRIA PENTAGYNIA. 37

Polygonum minimum f. *Millegrana minima*. *Baub.*
pin. 282. *Comm. boll.* 90. *Morif.* 60. 2. p. 593.

p. f. t. 29. *f.* 3.

Oed. dan. t. 187.

Aller kleinft Duizend-graan. Belg.

Op zandige plaatfen, en ook tuffchen de fteenen; veel in 't zand by de Steene-kamer tuffchen Harderwyk en Nykerk; en in Friesland omtrent Garyp en Dragten aan de kanten tuffchen het Koorn.

D R O S E R A.

288. *DROSERA scapis radicatis, foliis orbiculatis.* *rotundifolia.*
Sp. 402. *n.* 1. *Gelr.* 193. *Ingr.* 48. *Fris.* 148.

Ros solis folio rotundo. *Baub. pin.* 357. *Comm. boll.* 98.

Rorida f. *Ros solis major.* *Lob. ic.* 811.

Zonne-dauw. Belg.

Op vochtige Hey-gronden tuffchen Dotichem en Selhem, by Uilenpas, Klein Luiking, en door de gansche Veluwe; op grasige beuveltjes by Naarden; aan de Bilt by Utrecht; by Bergum. in Friesland; in 't Heide-veld by Harender-Mooien, ook in 't witte Veen tuffchen Haren en de Waterhuizen buiten Groningen.

Pharm. RORIS SOLIS herb.

Pastoribus Taxandriae invisa planta, quum ovium capita ex esu ejus subito intumescant, pecusque illud debinc brevi ex hydropo moriatur.

Folia arida liquores igneo colore tingunt.

289. *DROSERA scapis radicatis, foliis ovali-oblongi-folia.*
gis. Sp. 403. *n.* 2. *Gelr.* 194. *Fris.* 149.

Ros solis folio oblongo. *Baub. pin.* 357. *Comm. boll.* 98.

Rorida f. *Solis ros & Drofion recentiorum.* *Lob. ic.* 811.

By de voorige; en zeer veel te Hulfen by Nymegen; ook by Gemert en Helmond in de Meyery van 's Bosch.

P O L Y G Y N I A.

M Y O S U R U S.

- murinus.* 290. MYOSURUS. Sp. 407. n. 1. *Baub. bist. p.* 512.
Gelr. 195. *Fris.* 150.
 Holosteo affinis, Cauda muris. *Baub. pin.* 190.
Comm. boll. 59.
 Cauda murina. *Dod pempt.* 112.
Oed. dan. t. 406.
 Muizen - staart. Belg.
 Op vochtige zandige Velden buiten Harderwyk,
 Hattem, Naarden, Haarlem, Zwol, Fran-
 ker, Groningen, en elders in de voorzomer tus-
 schen 't jonge Koorn.

C L A S S I S V L
H E X A N D R I A.
M O N O G Y N I A.

G A L A N T H U S.

291. GALANTHUS. Sp. 413. n. 1. *nivalis.*
Leucojum bulbosum trifolium minus. Baub. pin.
 56.
Leucojum bulbosum triphyllon. Dod. pempt. 230.
Naakte - Mannetjes, Naakte - Naarsjes, Vasten-
avond - zotjes. Vulgo.
Groeit tans menigvuldig van zelfs in de afgebouwene
bosschen by Velsen.

N A R C I S S U S.

292. NARCISsus spatha uniflora, nectario campanu- *Pseudo-*
 lato erecto crispo, æquante petala ovata. Sp. *Narcissus.*
 414. n. 2.
Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. Baub.
pin. 52.
Narcissus luteus sylvestris. Dod. pempt. 227.
Geele Tydeloozen, Sporckelle. Belg.
Te Velsen by de voorgaande. (Ampl. D I. DEUTZ.)
en omtrent Zwol. (BRUMAN. Zuoll. 16.)

A L L I U M.

293. ALLIUM caule planifolio bulbifero, staminibus *carinatis.*
 subulatis. Sp. 426. n. 13. *Gek. 197.*

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Allium montanum bicornne angustifolium, flore purpurascente. *Baub. pin.* 74. *Morif. bist.* 2. p. 386. f. 4. t. 14. f. 5.
In de Salker - Waart.

Wineale.

294. *ALLIUM* caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis. *Sp.* 428. n. 21. *Gelr.* 203. *Frif.* 151.

Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus. *Baub. pin.* 74. *Comm. boll.* 5.

Allium sylvestre tenuifolium. *Dod. pempt.* 683. t. Lob. ic. 156.

Wild - Look, Hond's - Look. Belg.

In de Velden buiten Harderwyk, Zwol, Alkmaar; in de Duinen by 's Hage; aan 't eind van den grooten Hout buiten Haarlem, op de weg naar Heemstede; in Friesland op verjcheide plaatsen aan Wallen en in Boffchen.

urfinum.

295. *ALLIUM* scapo nudo triquetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata. *Sp.* 431. n. 29. *Frif.* 152.

Allium sylvestre latifolium. *Baub. pin.* 74. *Comm. boll.* 5.

Allium urfinum. *Cam. epit.* 330.

Das - Look. Belg.

In de Duinen by 's Hage; buiten Haarlem by 't Huis te Bredenrode agter Bloemendaal; veel omtrent Maarsen; en in Friesland by Balk en Wykel aan dykjes en kanten van Koornlanden.

ORNITHOGALUM.

luteum.

296. *ORNITHOGALUM* scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Sp.* 439. n. 1. *Gelr.* 205.

Ornithogalum luteum. *Baub. pin.* 71.

Bulbus sylvestris. *Dod. pempt.* 222.

Oed. dan. t. 368.

Veld - Ajuin, Vogel - Melk. Belg.

In de Moesboven by Harderwyk, en in de Koornlanden by Zwol.

alacrinum.

297. *ORNITHOGALUM* scapo angulato diphylo, pedunculis umbellatis ramosis. *Sp.* 440. n. 2.

Or.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 91

Ornithogalum luteum minus. *Baub. pin.* 71.

Onder 't voorige, dog niet zoo veel.

Simillimum præcedenti, sed Petala acutiora.

298. *ORNITHOGALUM* floribus corymbosis, pedun- ^{umbellatum}
culis scapo altioribus, filamentis basi dilatatis.
Sp. 441. n. 9. *Gelr.* 616.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium.

Baub. pin. 70. *Comm. boll.* 83.

Bulbus leucanthemos minor. *Dod. pempt.* 221.

Morgen-Sterren. Vulgo.

In de Fortificatien te Nymegen; in 't bosch van Clarenbeek by Arnhem; in 't Koorland te Hierden by Bas buiten Harderwyk; in den Haarlemmer-Hout; op de Graspaden van Zandhorst en Marquette in Kennemerland; langs de kleyweg tusschen Utrecht en Maarssen en by de Hofstede Vegtstroom; by den Voetangel aan den Amstel; ook omtrent Leeuwaarden, Zwol, en elders.

299. *ORNITHOGALUM* floribus fecundis pendulis, ^{nutans.}
nectario stamineo campaniformi. *Sp.* 441. n. 10.

Ornithogalum exoticum magno flore minoriinnato. *Baub. pin.* 70.

Ornithogalum neapolitanum. *Chuf. app.* 2. p. 9. t. 9.

By Leiden op de booge Morfch en buiten de Hoogewoerds-poort aan den boogen Rbyn-dyk, en op andere plaatsen daar omtrent. (Hortulanus MEERBURG.)

Forſan olim ex bortis aufuga: ante annum tamen 1771. quo primum Hortulanus MEERBURG banc plantam offendit, nondum in Horto Academico Leydenſi exſtiterat.

Flores potius nutantes quam penduli dicendi.

A N T H E R I C U M.

300. *ANTHERICUM* foliis ensiformibus, filamentis *offisragum*
lanatis. *Sp.* 446. *Frisf.* 53.

Narthecium. *Moedr. E. N. C.* vol. VI. p. 389. t.

f. 1. Gelr. 204.

Pseudo-Asphodelus palustris anglicus. *Banb. pin.* 29.

Af.

92 **HEXANDRIA MONOGYNIA.**

Aphodelus luteus palustris. *Dod. pempt.* 208. *Fig. quoad habitum satis bona, descriptio imperfecta.*

Oed. dan. t. 42.

Geele Water - Afsodillen. Belg.

Overvloedig buiten Harderwyk op de Gagel-Kamp by 's Heeren-Loo; in Friesland op Bergummer Heyde; en elders in de Wouden; ook zeer gemeen in de Veenen by Haren, en elders in de Provintie Groningen en Omlanden.

De hac planta S. PAULLI refert, quod, si pecoribus pabulo intermixta detur, noxam ipsis conciliet, atque ipsa eorum ossa inde emolliantur ita, ut pedibus insistere nequeant, unde illam vocat Gramen ossifragum Norvegicum. Verum nulla apud nos experientia constat, pecori ac seorsim ovibus morbum ex esu hujus natum esse; nequaq. floris odor manifeste virosus, ut LINNÆO, sed semper gratus ac melitus mihi, ut MOEHRINGIO visus est.

A S P A R A G U S.

officinalis. 301. *ASPARAGUS* caule herbaceo tereti erecto, foliis fetaceis, stipulis paribus. *Sp.* 448. *n.* 1. *Gelr.* 206. *Asparagus sylvestris tenuissimo folio.* *Baub pin.* 490. *Comm. boll.* 13.

Aspergie, Coraal-Kruid. Belg.

Op veele plaatsen in de Valeyen der Duinen buiten 's Hage agter Zorgvliet, Haarlem, Alkmaar, en in die van de Helder.

Pharm. ASPARAGI rad. bacc. sem.

C O N V A L L A R I A.

medicinalis. 302. *CONVALLARIA* scapo nudo. *Sp.* 451. *n.* 1. *Gelr.* 207. *Fris.* 154.

Lilium convallium album. *Baub. pin.* 304. *Comm. boll.* 67.

Lelie van den Dale, Lely Convaly, Zegeltjes. Belg. *May-bloemen.* Quibusdam.

In Gelderland op Schaffelaar by Barneveld, op Clarenbeek by Arnhem; in 't Haagse-Bosch; in de Haarlemmer-Hout; op Randenbroek by Amersfoort; in Friesland in Zwartzenburgs-Bosch, by Kuikhorne &c. buiten Groningen op de Mickelhorst op de Cingel en in 't Land

HEXANDRIA MONOGYNIA. 93

aan de Westkant; en elders op schaduwachtige plaatsen.

Pharm. LILII CONVALLII flor.

303. CONVALLARIA foliis alternis amplexicauli- *Polygona-
bienn.*
bus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus sub-
unifloris. Sp. 451. n. 3. Gelr. 209. Frgr. 50.

Polygonatum latifolium vulgare. Baub. pin. 303.
Comm. boll. 90.

Polygonatum, vulgo Sigillum salomonis. Baub.
bist. 3. p. 529.

Oed. dan. t. 377.

Salomons-Zegel. Belg.

Fontein-Kruid. Groninganis.

Motte met biggen Drenthinis.

- β. Polygonatum latifolium, flore majore odoro.
Baub. pin. 303.

In 't Bosch by 't Huis de Elfe en Zuideras buiten Zutphen; in dat van Clarenbeek by Arnhem; in 't Klaverbosch en op Kortenbroek buiten Harderwyk; in 't Haagse-Bosch; in de wildernis niet verre van 't Huis te Bredenoode; in de Duinen even buiten Overveen by één met Eijcken-boomen beplant Boschje; zeldzaam in de Haarlemmer-Hout; te Hardenbroek in 't Sticht van Utrecht; by Onnen en de Mickelhorst buiten Groningen; en elders op schaduwachtige plaatsen. . . Veel in de Duinen by Haarlem.

Pharm. POLYGONATIF. SIGILLI SALOMONIS
rad. herb.

304. CONVALLARIA foliis cordatis, floribus tetra- *bifolia-
dris.* Sp. 452. n. 8. Gelr. 208. Fris. 155.

Unifolium. Dod. pempt. 205.

Lilium convallium minus. Baub. pin. 304. Comm.
boll. 67.

Oed. dan. t. 152.

Een-blad. Belg.

In Gelderland by Ubbergen, Boedelhof, Uilenpas, en elders in de Boschen; in 't Haagse-Bosch; in Friesland by het Oranje-Wout, en in een Boschje by Donkerbroek; in 't Cluivings-Bosch voor aan in 't Landschap Drenthe.

HY.

94 HEXANDRIA MONOGYNIA.

H Y A C I N T H U S.

- non scriptus* 305. HYACINTHUS corollis campanulatis sexpartitis apice revolutis. *Sp.* 453. n. 1.
Hyacinthus, oblongo flore, cæruleus major. *Baub.* pin. 43.
Hyacinthus non scriptus. *Dod. pempt.* 216.
Wilde Hyacinten. Belg.
In 't Haagse Bosch. (*Cel. SCHWENCKE.*) *In de Boschdijen te Velsen.* (*Ampl. D. I. DEUTZ.*)
en te Haarlem in den Ouden-Hout.

A C O R U S.

- Calamus.* 306. ACORUS. *Sp.* 462. n. 1. *Gelr.* 210. *Fris.* 156.
Acorus verus f. Calamus aromaticus officinarum.
Baub. pin. 34. *theatr.* 625. *Comm. boll.* 4.
Acorum. *Cam. epit.* 5.
Calmus. Belg.
In de oude Graft te Doesburg; in de Berkel by Lochum; in de Slooten en Graften by Wageningen, Maurik, Oen, Welsum, Elden, Veenendaal, en elders in Gelderland; in de Trekvaarten buiten Delft en 's Hage, tusschen Haarlem en Leiden; by Maarleveen, Tienhoven in 't Sticht van Utrecht; ook in de Slooten omtrent Wyk by Duurstede; in natte laage moerassige landen en poelen omtrent Oostermeer, Oenkerk, Oudkerk, en elders in de Wouden in Friesland; in 't Horensche-diep, en in een oude Graft aan de Oostkant van Haren buiten Groningen.
Pharm. ACORI f. CALAMI AROMATICI. *rad.*

J U N C U S.

- acutus.* 307. JUNCUS culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, involacro diphylo spinoso.
Sp. 463. n. 1.
Juncus acutus, capitalis forghii. *Baub.* pin. 12. *theatr.* 174. *Boerb. lugdb.* 2. p. 163. n. 3.
Juncus pungens five acutus, capitulis forghii. *Baub. bist.* 2. p. 520. *Morif. bist.* 3. p. 232. f. 8. t. 10. f. 15.
f. Juncus acutus maritimus anglicus. *Raf. bist.* 1303. *Morif. bist.* 3. p. 232. f. 8. t. 10. f. 14. *Boerb. lugdb.* 2. p. 163. n. 1.
Op het Kogras by de Helder. (*Ampl. D. I. DEUTZ.*)
308. JUN-

HEXANDRIA MONOGYNIA⁴ 95

308. JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo laterali. *conglomeratus*.
Sp. 464. n. 2. Gelr. 617.

Juncus lævis, panicula non sparsa. *Baub. pin. 12. theatr. 183. Boerb. lugdb. 2. p. 163.*

Op de Stads-Weide, en andere vochtige gronden omtrent Harderwyk.

309. JUNCUS culmo nudo stricto: panicula laterali. *effusus*.

Sp. 464. n. 3. Gelr. 215. Frisf. 157.

Juncus lævis, panicula sparsa, major. *Baub. pin. 12. theatr. 182. Comm. boll. 61.*

Juncus lævis. *Dod. pempt. 605.*

Onscherpe of Zagte Biezen. Belg.

Russchen Groningans.

Veel op vochtige koude gronden.

Nomen Groningantum convenit cum Anglico.

310. JUNCUS culmo nudo: apice membranaceo *in-floccus*.
curvo, panicula laterali. Sp. 464. n. 4.

Juncus, acumine reflexo, major. *Baub. pin. 12.*

prodr. 22. Morisf. bist. 3. p. 233 f. 8. t. 10. f.

25. Boerb. lugdb. 2. p. 164. n. 2.

311. JUNCUS acutus, panicula sparsa. *Baub. pin. 12.*

Comm. boll. 61.

Tzer - Biezen. Belg.

In koude vochtige Weilanden.

312. JUNCUS culmo nudo, foliis setaceis, capitulis *quarrefloris*
glomeratis aphyllis. Sp. 465. n. 7. Gelr. 214.

Frisf. 158.

Gramen junceum maritimum. Lob. ic. 18.

Gramen junceum, foliis & spica junci. Baub. pin.

5. theatr. 78. Morisf. bist. 3. p. 228. f. 8. t. 9.

f. 13. Comm. boll. 50.

Oed. dan. t. 430.

In 't Veer tusschen Uilenpas en Hummel in 't Graafschap Zutphen; te Hulsen by Nymegen; in de buitendykke landen aan de Ykant. In Friesland, menigvuldig in de Wouden.

Synonymum I. B. a COMMELINO additum pertinet ad Juncum bulbosum.

312. JUNCUS foliis nodoso-articulatis, petalis obtusis. *articulatus*.
Sp. 465. n. 8. Gelr. 213. Frisf. 159.

c. Gra-

96 HEXANDRIA MONOGYNIA.

- α. Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Baub. pin. 5. prodr. 12. theatr. 76. Comm. boll. 50.*
 - β. Gramen junceum folio articulato, cum utriculis. *Baub. prodr. 12. Scheuch. gram. 233.*
 - γ. Gramen junceum capsulis triangulis, cauliculis tenuibus, foliis ad nodos et panicularum divaricationes oblongis. *Raj. bist. 1307.*
 - δ. Gramen junceum, capsulis triangulis, minimum. *Raj. bist. 1307. Moris. bist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 3.*
 - ε. Gramen junceum minimum, capitulis foliaceis. *Moris. bist. 3. f. 8. t. 9. f. 4.*
 - ζ. Gramen junceum, folio articulato, sylvaticum. *Baub. pin. 5. theatr. 75. Moris. bist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 1. Comm. boll. 50.*
 - α. Gemeen in natte Weilanden op veele plaatsen. β. Veel aldaar in den Herfst na den Hooityd. γ. Veel in de Weilanden by Rotterdam. δ. en ε. Overvloedig te Hulzen by Nymegen in eene vogtige Weide onder de groote boomen; met de *Drosera longifolia*, *Carex dioica*, *pulicaris*, &c. ζ. Tusschen Franeker en klein Lancum in Sloots-wallen, en aan de Ryd-weg van Donkerbroek naar Makkinga; in de Zalliker-Waart in Overysfel, en te Overveen by Haarlem achter Rampen-Laan, aan het opgaan van de Duinen op donkere en vochtige plaatsen.
- Varietas β. ab insectis causatur. γ est vivipara, in qua loco florum variis in locis foliorum fasciculi nascuntur, adeoque diversa a varietate ε. optimeque describitur a RAJO. δ. et ε. quandoque vix uncias duas altitudine aequat. ε. utriculis differt a δ. sicuti β. ab α. Varietas ζ. sylvatica ab Jll. HALLERO pro distincta specie habetur, nec sine ratione, gaudet enim petalis obtusis, foliisque teretibus, cum aquatica α. β. γ. δ. ε. petala habent mucronata, foliaque magis compressa; adeoque differentia specifica ab Jll. LINNÆO data soli ζ. convenit, aquaticis vero differentia specifica funi nodosi. *Sp. 466. n. 9.*

antefl.

- 313. JUNCUS foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. *Sp. 466. n. 10. Fris. 160.*

Jun-

HEXANDRIA MONOGYNIA. 97

Juncus parvus cum pericarpis rotundis. Baub. bist. 2. p. 522. quoad iconem, non vero synonyma.
Gramen junceum polystachion. C. B. Comm. boll. 50.

Gramen junceum, junci sparsa panicula. *Morif. bist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 11. opt.*

Gesn. Schmied. 12. t. 5. f. 13. Oed. dan. t. 431.
In de Waterachtige Hooilanden, aan de kanten van de Haarlemmer-Meyr, by den Overtoom; en van de Maas by Rotterdam; in Friesland zoo wel op de Klei als in de Wouden, in natte laagten en aan de kanten der Slooten.

314. *JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. Sp. 466. n. 11. Gehr. 212. Fris. 161.*

Holosteum. Lob. ic. 18.

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis. *Baub. pin. 7. theatr. 100. Comm. boll. 53. Morif. bist. 3. p. 228. f. 8. t. 9. f. 14.*

Padde-Gras. Belg.

Op vochtige Moeschachtige plaatsen in Gelderland, Utrecht, Overysfel; in de Duin-Valeyen in Holland; in de Wouden aan de kanten van Koornvel-den, en vochtige gruppels in Friesland.

315. *JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo ramoso. pilosus. Sp. 468. n. 15. Fris. 162.*

Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus. *Baub. pin. 7. theatr. 101. Morif. bist. 3. p. 225. f. 8. t. 9. f. 1.*

Oed. dan. t. 441.

β. Gramen hirsutum latifolium minus. *Baub. theatr. 102.*

Hairig of Ruig Bosch-Gras. Belg.

In Friesland in de Wouden, en op de Kley in de Boffchen.

316. *JUNCUS foliis planis subpilosis, corymbis folio brevioribus, floribus fasciculatis. Sp. 468. n. 16.*

Gramen hirsutum angustifolium minus, paniculis albis. *Baub. pin. 7. theatr. 106. Morif. bist. 3. f. 8. t. 9. f. 39.*

Op de Heide by Nymegen. (D. RAINVILLE.)

98. HEXANDRIA MONOGYNIA.

- campestris.* 317. *JUNCUS* foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. *Sp.* 468. *n.* 17. *Gelr.* 211.
Gramen hirsutum, capitulis psyllii. *Baub. pin.* 7.
theatr. 103. *prodr.* 15. *Comm. boll.* 53. *Morif.*
bist. 3. *p.* 225. *f.* 8. *t.* 9. *f.* 4.
Klein Hairig-Gras. Belg.
In den Enck by Harderwyk; op het groote Veld aan den Haarlemmer-Hout, en in de Weilanden omtrent Zwol.

B E R B E R I S.

- vulgaris.* 318. *BERBERIS* pedunculis racemosis. *Sp.* 471. *n.* 1.
Berberis dumetorum. *Baub. pin.* 454. *Comm. boll.* 15.
Spina acida sive Oxyacantha. *Dod. pempt.* 750.
Berberisse. Belg.
Op de Velfer-Heide; in de Duinen by Overveen, en buiten 's Gravenhage naar Wassenaar; aan de Heereweg by Haren, en by de Mickelhorst buiten Groningen
Pharin. BERBERIDIS bacc. sem. succ.

P E P L I S.

- Portula.* 319. *PEPLIS* floribus apetalis. *Sp.* 474. *n.* 1. *Fris.* 163.
Glaux aquatica, folio subrotundo. *Loef. pruss.* 106. *t.* 20.
Alfene palustris minor serpillifolia. *Baub. pin.* 251. *prodr.* 118.
Oed. dan. t. 64.
In menigte langs 't Maasstrand achter 's Gravezande; in natte gruppels en stilstaande Slooten omtrent 't Wyfel, Augustinissa, Ureterp en Sygerswolde in Friesland; te Heemze in Overysfel; en elders.
Frequentissime apetala est.

T R I G Y N I A.

R U M E X.

- Sanguineus.* 320. *RUMEX* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Sp.* 476. *n.* 2. *Gelr.* 218.
La-

HEXANDRIA TRIGYNIA. 99

Lapathum folio acuto rubente. *Baub. pin.* 115.
Comm. boll. 64.

Lapathum rubens. *Dod. pempt.* 650. *Cam. epit.* 229.
Bloed-kruid, Draken-bloed. Belg.

Komt van zelfs voort in de Moes-boven.

Pharm. LAPATHI SANGUINEI rad.

321. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis inter-*crispus.*
 gris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis.

Sp. 476. *n.* 3. *Fris.* 164. *Gelr.* 219. *f.*

Lapathum folio acuto crispo. *Baub. pin.* 115.

Lapathum acutum crispum. *Tabern. ic.* 436.

β. Lapathum folio longissimo crispo. *Boerb. lugdb.* 2.
p. 85. *n.* 10.

Op veele plaatsen aan wallen en wegen.

322. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis den-*pulcher.*
 tatis subunica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. *Sp.* 477. *n.* 6.

Lapathum ramis procumbentibus, feminis involu-
 cro dentato, foliis inferioribus instar fidium.

Morif. bist. 2. *p.* 580. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 85.
n. 6.

Lapathum pulchrum bononiense sinuatum. *Baub.*

bist. 2. *p.* 988. *Raj. bist.* 1. *p.* 174.

† Volgens BOERHAAVE.

323. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis denta-*acutus.*
 tis graniferis, foliis cordato-oblongis acumina-
 tatis. *Sp.* 478. *n.* 11. *Gelr.* 217. *Fris.* 165.

Lapathum folio acuto plano. *Baub. pin.* 115.

Lapathum acutum f. Oxylapathum. *Baub. bist.* 2.
p. 85.

Patigh of Peerdick. Belg.

Zuiker-wortel in de Dortfche en Krimpener-Waar-
den.

Koesen, Koesjes-bladen, Leeken. Rusticis, quo no-
 mine & reliqua Lapatha appellant.

Ridders Groningans.

β. Lapathum minimum. *Baub. pin.* 115. *Comm. boll.* 64.

Veel op vochtige zandige gronden. f. Op steenachtige en dorre gronden

Pharm. LAPATHI ACUTI rad. herb.

324. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis den-*obtusifolius*
G 2 ta-

tatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. *Sp.* 478. n. 12. *Frif.* 166.
Lapathum sylvestre, folio subrotundo, seminis involucris dentatis. *Morif. bist.* 2. p. 580. *Boerb. lugdb.* 2. p. 85.

Lapathum folio minus acuto. *Baub. pin.* 111. *Comm. boll.* 64.

Lapathum. *Cam. epit.* 228.

Overvloedig op zandige gronden, en in de Moes-boven buiten Haarlem, Zwol, Franeker, &c.

aquaticus. 325. *RUMEX* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Sp.* 479. n. 14. *Gelr.* 219. *Frif.* 197.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Baub. pin.* 116. *Comm. boll.* 63.

Hippolapathum. *Dalech. bist.* 604. *Cam. epit.* 232.

Herba britannica. *Munt. brit.* t. 1.

Groot Water-Patigh. Belg.

Water - Ridders. Groninganis.

β. *Lapathum aquaticum minus.* *Baub. pin.* 116. *Baub. bist.* 2. p. 987. *Comm. boll.* 64.

Klein Water-Patigh. Belg.

Aan de kanten der Slooten en Graften op veele plaatsen. β. Veel aan de kanten der Slooten en Beekjes buiten Haarlem, Utrecht, Zwol, en elders.

Pharm. *LAPATHI AQUATICI* rad.

Cl. BOEHMER *flor. lipf.* 576. *varietatem.* β. *pro distincta specie* habet.

seutatus. 326. *RUMEX* floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis, caule tereti. *Sp.* 480. n. 20.

Acetosa rotundifolia hortensis. *Baub. pin.* 114.

Morif. bist. 2. p. 583. f. 5. t. 28. f. 9.

Oxalis rotundifolia. *Dod. pempt.* 649.

Spaansche-Zuuring. Vulgo.

Overvloedig aan de Muur van 't Huis te Bronkhorst in 't Graafschap Zutphen.

Acetosa. 327. *RUMEX* floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Sp.* 483. n. 24. *Gelr.* 220. *Frif.* 168.

Acetosa pratensis. *Baub. pin.* 114. *Comm. boll.* 4.

Oxalis vulgaris, folio oblongo. *Baub. bist.* 2. p. 989.

Veld-

HEXANDRIA TRIGYNFA. 101

Veld-Zuuring of *Zurkel*. Belg.
Veel in de Weilanden.
 Pharm. *ACETOSÆ rad. herb. sem.*

328. *RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. Sp. 481. n. 25. Gelr. 221. Frif. 169.*

Acetosa arvensis lanceolata. Baub. pin. 114. Comm. boll. 4.

Oxalis ovina. Tabern. ic. 440.
Schaaps-Zuuring of *Zurkel*. Belg.

β. *Acetosa lanceolata angustifolia repens. Baub. pin. 114. prodr. 55.*

Veel op booge zandige Velden en Zaai-landen. β. Te Heemze in Overysfel.

T R I G L O C H I N.

329. *TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublineari-ribus. Sp. 482. n. 1. Gelr. 222. Frif. 170.*

Gramen junceum spicatum, sive Triglochin. Baub. pin. 6. theatr. 81. Comm. boll. 51.

Oed. dan. t. 411.

Nier-Gras, Zee-Gras met airen. Belg.

By de Waterkanten op den Haek en 't Nieuwe-land achter 's Gravezande; aan de Duiſen van Heemſtede; in de Wei-landen by Haarlem, Zandhorſt; ook zeer gemeen in die van de Provin-tien Frieſland en Groningen.

330. *TRIGLOCHIN capsulis sexlocularibus ovatis. Sp. 483. n. 2. Gelr. 223. Frif. 171.*

Gramen spicatum alterum. Baub. pin. 6. theatr. 82. Comm. boll. 51.

Oed. dan. t. 306.

By 't voorige op veele plaatſen, en aan de Zee-kant by de Beeken buiten Harderwyk.

P O L Y G Y N I A.

A L I S M A.

331. *ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe tri-gonis. Sp. 486. n. 1. Gelr. 224. Frif. 172.*

G 3

Plan-

102 **HEXANDRIA POLYGYNIA.**

Plantago aquatica latifolia. *Baub. pin.* 19. *Comm. boll.* 88.

Plantago aquatica. *Cam. epit.* 264.

Oed. dan. t. 561.

Water - Weegbree. Belg.

In stilstaande zoete Wateren en Slooten op veele plaatsen.

ranunculoides. 332. *ALISMA foliis lineari-lanceolatis, fructibus globofo - squarrosis.* *Sp.* 487. *n.* 6. *Gelr.* 225. *Fris.* 173.

Plantago aquatica angustifolia. *C. B. Comm. boll.* 89.

Plantago aquatica humilis angustifolia. *Baub. bist.* 3. *p.* 788. *Lob. ic.* 300.

Oed. dan. t. 122.

Klein Water - Weegbree. Belg.

Klein Lepelblad. Groninganis.

Overvloedig in de Trekvaart tusschen Haarlem, Leiden en Utrecht; by en in Water-plaatsen, en uitgeveende en andere moerige landen in Friesland omtrent Tjetjerk, Hardegaryp, Bergum &c. in de Slooten en Griften tusschen Deventer en Zwol; in de Slooten langs den dyk tusschen Haren en de Waterhuizen buiten Groningen.

Synonymum C. Baub. est varietas Alismatis Plantaginis.

CLAS.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

ÆSCULUS.

333. *ÆSCULUS* floribus heptandris. *Sp.* 488. n. 1. *Hippo-Castanum.*
Gelr. 226.
Castanea folio multifido. *Baub. pin.* 419. *Cluj.*
bist. 1. p. 7.
Castanea equina, folio multifido. *Baub. bist.* 1.
p. 128.
Paarde-Castanie-boom. Belg.
Veel in de Steden, en by Adelyke Huizen.
Pharm. CASTANEE EQUINÆ fruct.
Incola est Asia septentrionalis, indeque Aō. 1550.
in Europam translata, ubi hodie vulgaris. Cetero-
quin nulla bujus Classis planta apud nos indigena.

C L A S S I S VIII.

O C T A N D R I A

M O N O G Y N I A.

O E N O T H E R A.

- biennis.* 334. *OENOTHERA* foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoso. *Sp.* 492. *n.* 2. *Gelr.* 229.
Lyfimachia lutea corniculata. *Baub. pin.* 245.
Comm. boll. 70. *Morif. bist.* 2. *p.* 271. *f.* 3. *t.* 11. *f.* 7.
Hyoscyamus virginianus. *Alp. exot.* 325. *t.* 324.
Oed. dan. t. 416.
Geboornde geele Wederik. Belg.
St. Teunis-bloem. Vulgo.
Overvloedig op Karmestein te Lienden in de Betuwe; in de Fortificatien om Zutphen; op Uilenpas; by Emaus of Bloembleek buiten Arnhem; op de Kerke-Kamp buiten Harderwyk; en in de Duinen op veele plaatsen.

E P I L O B I U M.

- angustifolium.* 335. *EPILOBIUM* foliis sparsis lineari-lanceolatis, floribus inæqualibus. *Sp.* 493. *n.* 1. *Gelr.* 230.
Frif. 174.
Lyfimachia Chamænerion dicta angustifolia. *Baub. pin.* 245. *Comm. boll.* 70.
Oed. dan. t. 289.
*Aan de kanten der Graften en Slooten op schaduw-
 acb-*

OCTANDRIA MONOGYNIA. 105

acbtige plaatfen.

336. *EPILOBIUM* foliis oppositis lanceolatis ferratis *hirsutum*.
decurrenti - amplexicaulibus. *Sp.* 494. n. 3.

Gelr. 231. *Frigr.* 57. *Fris.* 175.

Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno flore. *Baub.*
pin. 245. *Comm. boll.* 70. *Morif. bist.* 2. p. 270.

f. 3. *t.* 11. *f.* 3.

Oed. dan. t. 326.

Als de voorguande.

337. *EPILOBIUM* foliis oppositis ovatis dentatis. *Sp. montanum*.

494. n. 4. *Gelr.* 232.

Lyfimachia filiquosa glabra major. *Baub. pin.*

245. *Comm. boll.* 70.

Pseudo-Lyfimachium purpureum primum. *Ded.*
pempt. 85.

Op vochtige zandgronden by Harderwyk, Haarlem,
Utrecht, Zwol, en elders; in de Duinen by 's Ha-
ge; in de Bosfchen by Leeuwarden en Franeker;
aan de kanten van Graffen en Slooten by Haren
buiten Groningen.

338. *EPILOBIUM* foliis lanceolatis denticulatis: imis *tetragonum*
oppositis, caule tetragono. *Sp.* 494. n. 5.

Lyfimachia filiquosa glabra minor. *Baub. pin.* 303.

Comm. boll. 70.

Lyfimachia minor. *Tabrn. ic.* 854.

In de vochtige Duin valeren. (COMM.)

339. *EPILOBIUM* foliis oppositis lanceolatis integer- *palustre*.
rimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Sp.*

495. n. 5. *Gelr.* 233. *Fris.* 176.

Lyfimachia filiquosa glabra angustifolia. *Baub.*
pin. 245.

Oed. dan. t. 347.

In de Sydel by Harderwyk; in de Nunspeeter-
beek tuffchen Harderwyken Elburg; in de Veen-
landen by de Wildervank, by Haren, in de
Pekelder-Veenen, en elders in de Provintie Gro-
nningen; ook in de Hoven tuffchen het geboomte op
veele plaatfen.

340. *EPILOBIUM* foliis oppositis ovato-lanceolatis *alpinum*.
integerrimis, filiquis sessilibus, caule repente.

G 5

Sp.

106 OCTANDRIA MONOGYNIA.

Sp. 495. *n.* 7. *Fris.* 177.
Chamaenerion alpinum, *alpine foliis.* *Scheuch.*
alp. 132. 332.
Oed. dan. t. 322.
Aan ruige Wallen omtrent Baccaveen en Sygers-
Wolde in Friesland. (MEESE.)

C H L O R A.

perfoliata. 341. *CHLORA foliis perfoliatis.* *Syst. edit.* 13. *p.* 299.
Gentiana perfoliata. *Sp.* 335. *n.* 28.
Centaurium luteum perfoliatum. *Baub. pin.* 278.
Morif bist. 2. *p.* 505. *f.* 5. *t.* 26. *f.* 1. 2.
Veel omtrent de Stad Brielle, en op Staalduin bui-
ten 's Hage.

V A C C I N I U M.

Myrillus. 342. *VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis serra-*
tis ovatis deciduis, caule angulato. *Sp.* 498. *n.*
1. Gelr. 236. *Fris.* 178.
Vaccinia. *Dod. pempt.* 768.
Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigrican-
te. *Baub. pin.* 470. *Comm. boll.* 116.
Bosch-bessen, Wald-bessen, Kraakel-beziën, Postel-
beziën. Belg.
Bleeken. Groninganis.
Overvloedig in de meeste Bosschen op de Veluwe;
in 't Bosch by Amerongen in 't Sticht van
Utrecht; in Friesland by het Heereveen, Drag-
ten, Gorradyk, &c. op 't witte Veen by Haren,
en op 't Heyde-veld by Haarender-moolen buiten
Groningen.

uliginosum. 343. *VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis inte-*
gerrimis obovatis obtusis lævibus. *Sp.* 499. *n.* 3.
Jngr. 58.
Vitis idæa foliis subrotundis exalbidis. *Baub. pin.*
470.
Vitis idæa II. Clus. bist. 1. *p.* 61. *t.* 62.
Oed. dan. t. 231.
Stronk-beziën. Varseveldensibus.
Overvloedig in 't Veen by Varseveld in 't Graaf-
schap Zutphen.
Floret Junio.

Bac-

OCTANDRIA MONOGYNIA. 107

Baccæ in aliis fruticibus ovata, in aliis tetragona.
Hæ baccæ Rufforum palato placent, sed largius co-
mestæ capitis dolorem inferunt, unde ipfis PIANI-
ZA id est ebrîæ audiunt.

344. *VACCINIUM* racemis terminalibus nutantibus, *Vitis idæa.*
 foliis obovatis revolutis integerrimis subtus
 punctatis. *Sp. 500. n. 10. Gelr. 237. Frif. 179.*
Vaccinia rubra. Dod. pempt. 770.
Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis
rubris. Baub. pin. 470.
Oed. dan. t. 40.
Rode Kraakel - beziën. Belg.
Vosse - beßen. Rusticis Velaviæ.
Aan bet Elspeeter, Wiselfe, Sourensche en andere
Boschen op de Veluwe; ook by 't Vaccinium Myr-
tillus in Friesland en buiten Groningen.
 III. *HALLERUS (Bibl. bot. tom. 2. p. 309.) mira-*
tur plantam banc in Gelria, regione maritima,
habitare; ast sylva illa satis longe a mari distita
sunt.
345. *VACCINIUM* foliis integerrimis revolutis ovatis, *Oxycoccus.*
 caulibus repentibus filiformibus nudis. *Sp. 500.*
n. 11. Gelr. 602. Frgr. 59.
Vaccinia palustris. Dod. pempt. 770.
Vitis idæa palustris. Baub. pin. 471. Comm. boll.
116.
Oed. dan. t. 80.
Veen - beßen, Kroosen. Belg.
In 't Veen tusschen Hummel en Uilenpas; in de
Veenen by Meydrecht, Groningen, en elders.

E R I C A.

346. *ERICA* antheris aristatis, corollis campanulatis *vulgaris.*
 subæqualibus, calycibus duplicatis, foliis op-
 positis sagittatis. *Sp. 501. n. 1. Gelr. 235. Frif.*
180.
Erica vulgaris glabra. Baub. pin. 485. Comm. boll.
34.
Heide. Belg.
 β. *Erica vulgaris glabra, flore albo. Tourn inst. 602.*
Overvloedig op de Veluwe; buiten Naarden, Amers-
foort; en door de geheele Woud - kant in Fries-
land.
 347. E-

108 OCTANDRIA MONOGYNIA.

arbores. 347. *ERICA* antheris aristatis, corollis campanulatis, stylo exserto, foliis ternis, ramulis incanis. *Sp.* 502. n. 9. *Gelr.* 618.

Erica maxima alba. Baub. pin. 485. *Comm. boll.* 34.

Erica coris folio I. Clus. bist. 1. p. 41.

Veel op de booge Veluwe.

Tetraflx. 348. *ERICA* antheris aristatis, corollis ovatis, stylo incluso, foliis quaternis ciliatis, floribus capitatis. *Sp.* 502. n. 8. *Gelr.* 234. *Frif.* 181.

Erica ex rubro-nigricans scoparia. Baub. pin. 486.

Erica brabantica, folio coridis hirsuto quaterno.

Baub. bist. 1. p. 358.

Oed. dan. t. 81.

Dop-Heide, Fyne Heide. Vulgo.

Overvloedig op de Veluwe, en in 't Graaffschap

Zutphen, ook in Friesland en buiten Groningen

op vochtige Hei-gronden.

Corolla est plerumque purpurea, nonnumquam alba reperitur.

cinerea. 349 *ERICA* antheris cristatis, corollis ovatis, stylo subexserto, foliis ternis, stigmatate capitato. *Sp.* 501. n. 4.

Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore. Baub. pin. 486. *Comm. boll.* 34.

Erica coris folio VI. Clus. bist. 1. p. 43.

Oed. dan. t. 38.

Buiten Naarden, en voorby de Bilt buiten Utrecht aan 't opgaan van de Heide.

mediterranea. 350. *ERICA* antheris muticis exsertis, corollis ovatis, stylo exserto, foliis quaternis patentibus, floribus sparsis. *Mant.* 229.

Erica maxima purpurascens, longioribus foliis.

Baub. pin. 485. *Comm. boll.* 34.

Erica coris folio II. Clus. bist. 1. p. 42.

Erica foliis corios quaternis, flore purpurascente.

Baub. bist. 1. p. 356.

Op veele plaatsen op de Veluwe, als ook buiten Utrecht, Amersfoort, en Zwol.

Olim Ericam multifloram LINN. probac planta habui ob synonyma bujus eo relata, & data conveniens nomen triviale buic datum.

DA.

OCTANDRIA MONOGYNIA. 109

D A P H N E.

351. DAPHNE floribus sessilibus ternis caulinis, foliis *Mezerium*.
 lanceolatis deciduis. *Sp.* 509. n. 1.
 Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis
 Laureola fœmina. *Baub. pin.* 462.
 Chamelæa germanica. *Dod. pempt.* 364.
Peper-boompje. Vulgo.
Overvloedig in 't Bosch by 't Huis de Fese, en in 't
Klembroekfe - Bosch by Olthuisen aan de Toldyks-
straat in 't Graafschap Zutphen.
 Pharm. MEZERÆI bacc.

T R I G Y N I A.

P O L Y G O N U M.

352. POLYGONUM caule simplicissimo monostachyo, *Bistorta*.
 foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp.* 516.
 n. 2.
 Bistorta major, radice minus intorta. *Baub. pin.*
 192. *Comm. boll.* 16.
 Bistorta. *Cam. ept.* 683.
Oed. dan. t. 421.
Nater - wortel, Slangen - wortel, Adder - wortel,
Harts - tong met bloemen. Belg.
Op Essenburg by Harderwyk; aan den Dyktusschen
Maiden en Weesp; te Neer - Langbroek in 't
Sticht van Utrecht; aan de Westkant van de
Mickelhorst aan 't Poppe - laantje buiten Gronin-
gen.
 Pharm. BISTORTÆ rad.
353. POLYGONUM floribus pentandris semidigynis, *amphibium*.
 spica ovata. *Sp.* 517. n. 6. *Gelr.* 238. *Jngr.* 61.
Erf 182.
 Potamogeton salicis folio. *Baub. pin.* 93. *Comm.*
boll. 93.
 Potamogeton. *Dod. pempt.* 582.
Oed. dan. t. 282.
Fontein - kruid. Belg.
Roewillig. Quibusdam.
 β. Persicaria foliis salicinis. *Comm. boll.* 86.

Aan

HO OCTANDRIA TRIGYNIA.

Aan de kanten van en in stilstaande zoete Wateren en Vyvers, veel by Harderwyk en Twello op de Veluwe, en elders. β. In de Weiden by Harderwyk, Haarlem, Utrecht, &c.

Mire variat hæc planta a loco; in aquis si crescat, stamina semper corolla breviora sunt.

Hydropiper 354. *POLYGONUM* floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Sp.* 517. *n.* 9. *Gelr.* 239. *Jngr.* 61. *Fris.* 183.

Persicaria urens f. *Hydropiper*. *Baub.* *pin.* 101. *Comm. boll.* 87.

Hydropiper. *Dod. pempt.* 607.

Water - Peper. Belg.

Veel op vochtige zand-gronden, en in de Slooten langs de Weiden.

Pharm. PERSICARIÆ ACRIS f. *URENTIS* *herb.*

Persicaria. 355. *POLYGONUM* floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Sp.* 518. *n.* 10. *Gelr.* 240. *Jngr.* 61. *Fris.* 184.

Persicaria mitis. *Baub. bist.* 3. p. 779.

Persicaria mitis maculosa & non maculosa. *Baub.* *pin.* 101. *Comm. boll.* 86.

Persik - Kruid, Wilde - Wilge. Belg.

Rits. Rusticis.

β. *Persicaria mitis*, floribus candidis. *Tourn. inst.* 509.

γ. *Persicaria minor*. *Baub. pin.* 101. *Comm. boll.* 87. *Morif. bist.* 2. p. 589. f. 5. t. 29. f. 5.

Veel by de Wegen, en in de Hoven, en Bouw-landen.

Pharm. PERSICARIÆ *herb.*

aviculare. 356. *POLYGONUM* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Sp.* 519. *n.* 15. *Gelr.* 241. *Fris.* 185. *Polygonum latifolium*. *Baub. pin.* 281. *Comm. boll.* 90.

Polygonum f. *Centinodia*. *Baub. bist.* 3. p. 374.

Weg - gras, Kreupel - gras, Varkens - gras, Duizend - knoop. Belg.

ρ. *Polygonum brevi angustoque folio*. *Baub. pin.* 281.

γ. Po-

OCTANDRIA TRIGYNIA

III.

γ. Polygonum oblongo angusto folio. *Baub. pin.* 281.

δ. Polygonum angustis foliis, calycibus purpureiscentibus. *Dill. giff. app.* 65.

Veel by de Wegen, en op ruwe plaatsen.

Pharm. POLYGONI herb.

357. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtusatis. *Sp.* 522. n. 25. *Gelf. lus.*

242. *Fris.* 187.

Convolvulus minor, femine triangulo. *Baub. pin.*

295. *Comm. boll.* 28.

Convolvulum nigrum. *Dod. pempt.* 396.

Zwarte Winde, Wilde Boekweit. Belg.

In Bouwlanden, Moeshoven, en Heggen.

C L A S S I S IX.

E N N E A N D R I A.

H E X A G Y N I A.

B U T O M U S.

- umbellatus.* 358. BUTOMUS. *Sp.* 582. *n.* 1. *Gelr.* 244. *Fris.* 188.
Juncus floridus major, Baub. pin. 12. *Comm. boll.*
 61.
Gladiolus aquatilis. Dod. pempt. 600.
Water - Lisch. Belg.
Zwaane-bloem. Vulgo.
 β. Butomus flore albo. *Tourn. inst.* 271. *Boerb. lugdb.*
 1. *p.* 299.
 γ. Butomus flore saturate purpureo. *Boerb. lugdb.* 1.
 1. *p.* 299.
Aan de kanten der Slooten en Graften op veel
plaatsen.

CLAS-

C L A S S I S X.

D E C A N D R I A

M O N O G Y N I A

M O N O T R O P A.

359. MONOTROPA floribus lateralibus octandris: *Hypopitys*.
 terminali decandro. *Sp.* 555. n. 1.
 Orobanche quæ Hypopitys dici potest. *Baub. pin.*
 88. *prodr.* 34.
 Orobanche Hypopitys lutea. *Mentz. pug.* 3. f. 2.
 Orobanche flore brevior duplici, verbasculi
 odore. *Morif. bist.* 3. p. 504. f. 12. t. 16. f. 20.
Oed. dan. t. 232.
In bet Dennen-bosch by Uilenpas in 't Graafschap
Zurphen.
Legi dicto loco banc plantam florentem mense Julio
1777. Characterem genericum optime descripsit
Cel. DILLENIIUS nov. gen. p. 134. t. 7. *Nume-*
rum autem petalorum & staminum in hac planta
sæpe variare recte notarunt Cl. WILlich obs. p.
 37. & III. *HALLERUS flor. helv.* 1. p. 427.

A N D R O M E D A.

360. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis *Polifolia*.
 ovatis; foliis alternis lanceolatis revolutis.
Sp. 564. n. 5.
Polifolia. Buxb. cent. 5. p. 28. t. 55. f. 1.
Erica humilis, rosmarini foliis, unedonis flore,
capsula cistioide. Pluk. alm. 136. t. 175. f. 1.

114 DECANDRIA MONOGYNIA.

*Op vochtige plaatsen te Zuideras, in 't Graaffschap
Zutphen.*

*Pedunculi apud nos communiter uniflori, uti in Linn.
Lapp. t. 1. f. 2.*

P Y R O L A.

rotundifolia 361. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillo
declinato. *Sp. 567. n. 1.*

*Pyrola rotundifolia major. Baub. pin. 191. Comm.
boll. 94.*

Pyrola. Dod. pempt. 138.

Oed. dan. t. 110.

Winter-groen. Belg.

*Overvloedig in de Duin-waleyen van Holland en
Zeeland; ook in 't Bosch op Uilenpas; en by Ber-
gum in Friesland.*

Pharm. PYROLÆ herb.

uniflora. 362. PYROLA scapo unifloro. *Sp. 558. n. 6. Jngr. 66.*

*Pyrola rotundifolia minor. Baub. pin. 191. Boerb.
lugdb. 1. p. 278.*

Pyrola minima alpina. Baub. bist. 3. p. 536.

Oed. dan. t. 8.

† *Juxta BOERHAAVIUM, a me in Belgio non vi-
sa, sed copiose in sylvis vastissimis Russia.*

D I G Y N I A.

S A X I F R A G A.

tridactylites. 363. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus tri-
fidis alternis, caule erecto ramoso. *Sp. 578. n.
32. Getr. 247.*

*Sedum tridactylites tectorum. Baub. pin. 285.
Comm. boll. 104. Meris. bist. 3. p. 479. f. 12.
t. 9. f. 31.*

Paronychia altera. Dod. pempt. 113.

*Veel op vochtige gronden en oude muuren te Deuti-
chem, Harderwyk, Hattem, Haarlem, Ut-
recht, en elders; overvloedig in de Duinen by
Overveen.*

364. SAX-

DECANDRIA MONOGYNIA. 115

364. *SAXIFRAGA* foliis caulinis linearibus integris *hypnoides*. trifidisve, stolonibus procumbentibus, caule erecto nudiusculo. *Sp.* 579. *n.* 37. *Gelr.* 248.
Sedum alpinum trifido folio. *Baub. pin.* 284. *Morif. bist.* 3. *p.* 479. *f.* 12. *t.* 9. *f.* 26.
Oed. dan. t. 348.
Op de Heide tusschen Harderwyk en Ermello.

SCLERANTHUS.

365. *SCLERANTHUS* calycibus fructus patulis. *Sp. annuus.* 580. *n.* 1. *Gelr.* 246.
Knawel. Dod. pempt. 115.
Polygonum angustissimum & acuto, vel gramineo folio, minus repens. Baub. pin. 281. *Comm. boll.* 90.
Oed. dan. t. 504.
Engelsche - Steenbreek. Belg.
 β. *Polygonum gramineo folio, majus erectum. Baub. pin.* 281.
In de zandige Koornlanden by Harderwyk, Haarlem, Alkmaar; ook in de Duinen; als mede in 't zand by Groningen.
Magna varietas in hac planta a loco. Vid. Dill. giff. 87. 236. *Sp. Linn. b. Cliff.* 166.
 366. *SCLERANTHUS* calycibus fructus clausis. *Sp. perennis.* 580. *n.* 2.
Knawel incanum, flore majore, perenne. Raj. angl. 3. *p.* 160. *t.* 5. *f.* 1.
Polygonum cocciferum. Baub. pin. 281.
Oed. dan. t. 563.
Overvloedig in de Duinen by 's Hage tusschen Bickershagen en Langenhorst. (MEERBURG.)

GY SOPHILA.

367. *GY SOPHILA* foliis linearibus planis, caule di- *rigida.* chotomo, pedunculis bifloris, petalis emarginatis. *Sp.* 583. *n.* 10.
Lychnis sylvestris minima, exiguo flore. Baub. pin. 206. *prodr.* 103. *Boerb. lugdb. t.* *p.* 214. *n.* 60.
Tunica minima. Dalecb. bist. 1191.
BOERHAAVIUS ut indigenam notat, LINNEUS suspicatur in Belgio habitare.

S A P O N A R I A.

- officinalis.* 368. *SAPONARIA* calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Sp.* 584. n. 1. *Gelr.* 245.
Saponaria major lævis. *Baub.* pin. 206.
Saponaria vulgaris. *Cam. epit.* 152.
Oed dan. t. 543.
Zeep-kruid. Belg.
 β. *Lychnis*, seu *Saponaria flore pleno.* *Tourn. inst.* 336. *Boerb. lugdb.* 1. p. 212. n. 36.
 γ. *Lychnis Saponaria concava anglica.* *Boerb. lugdb.* 1. p. 212. n. 37.
Veel aan den Dyk te Ysendoorn, Tuil, en Waardenburg in de Betawe, en te Wamel over Tiel; aan de Wegen by Zutphen en Doesburg; in 't Bosch van Clarenbeek by Arnhem; aan 't voetpad by den grooten Boeren-Hol buiten Cuilenburg; ook by Everdingen; buiten 's Hage langs den weg naar Scheveningen; aan den Duinkant buiten Haarlem by Overveen, en achter 't Huis te Breddenrode; ook tusschen Velsen en Beverwyk by de Hofstede Westerhout.
Pharm. SAPONARIÆ rad. berb.

D I A N T H U S.

- prolifer.* 369. *DIANTHUS* floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus. *Sp.* 587. n. 4.
Armeria prolifera. *Lob. ic.* 449.
Caryophyllus sylvestris prolifer. *Baub.* pin. 209.
Segu. ver. 26. t. 7. f. 1.
Oed dan. t. 221.
Op Zuideras in 't Graafschap Zutphen; aan den Berg by Arnhem, en elders.
arenarius. 370 *DIANTHUS* caulibus subunifloris, squamis calycinis ovatis obtusis, petalis multifidis, foliis linearibus. *Sp.* 589. n. 13. *Gelr.* 619.
Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico. *Baub.* pin. 209.
Armerius flos tertius. *Dod. pempt.* 176.
Wilde Duizend-Schoon. Belg.
In de Allee van den Kranenborg en elders by Zwol.

T R I.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS.

371. CUCUBALUS calycibus campanulatis, petalis di-^{baccifera.}
stantibus, pericarpis coloratis, ramis divarica-
tis. *Sp.* 592. n. 1. *Gelr.* 620.
Lychnanthus volubilis. *Gmel. act. petr.* 1759. vol.
xiv. p. 525. t. 17. f. 1.
Alfine scandens baccifera. *Baub. pin.* 250.
Alfine repens. *Dod. pempt.* 403.
In 't Loſch van den Uilenpas.

372. CUCUBALUS calycibus subglobosis glabris reti-^{Behen.}
culato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis
subnudis. *Sp.* 591. n. 2. *Fris.* 189.
Lychnis sylvestris, quæ *Behen album vulgo.*
Baub. pin. 205.
Papaver ipumeum. *Lob. ic.* 340.
Wit-Been of Beben. Belg.
Aan de Stadswal te Franeker, en by het Heeren-
veen, op vochtige ruige plaatsen. (MEESE.)
Buiten Bloemendaal by Haarlem gevonden door
Æg. de KOKER.

373. CUCUBALUS floribus dioicis, petalis linearibus ^{Ottus.}
indivisis. *Sp.* 591. n. 12.
Lychnis viscosa, flore muscosa. *Baub. pin.* 206.
Sesamoides magnum salmanticum. *Clus. hist.* 1.
p. 295.
Oed. dan. t. 518.
In de Duinen by 's Hage dicht by Langenhorst, en
overvloedig buiten Haarlem by Bloemendaal, en
elders.

SILENE.

374. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus fe-^{nutans.}
cundis cernuis, panicula nutante. *Sp.* 596. n. 8.
Lychnis montana viscosa alba latifolia. *Baub. pin.*
205.
Lychnis viscosa, folio otitidis. *Loef. pruff.* 150. t. 40.
Oed. dan. t. 242.
¶ Ocymoides minus f. album. *Dalech. hist.* 683.

In de Duinen by 's Hage en Catwyk. (MEERBURG.)

β. ook aldaar, en in de Duinen tusschen Velsen en Beverwyk by de Hofstede Westerhout, en daar omtrent (D. FABRICIUS SIX.)

Varietas β. folia multo angustiora habet, hinc pro diversa specie recensita a Tournefortio.

- conoides.* 375. *SILENE* calycibus fructus globosis acuminatis striis triginta, foliis glabris, petalis integris. *Sp.* 598. *n.* 15.
Lychnis fylvestris latifolia caliculis turgidis striatis. Baub. pin. 205.
Lychnis fylvestris flore albo, cauliculis striatis. Comm. boll. 69.
Lychnis fylvestris 2. Clus. bist. 8. *p.* 288.
Langs den Weg van 't Kraayeneest naar de Duinen.

- pendula.* 376. *SILENE* calycibus fructiferis pendulis inflatis: angulis decem scabris. *Sp.* 599. *n.* 19.
Lychnis supina ficula, calyce amplissimo striato. Tourn. inst. 336.
Viscago hirsuta ficula, lychnidis aquaticæ facie supina. Dill. elth. 421. *t.* 312. *f.* 404.
In de Duinen by Catwyk en Noordwyk. (MEERBURG.)
Rarioribus Belgii stirpibus merito adnumeranda.

S T E L L A R I A.

- nemorum.* 377. *STELLARIA* foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramosis. *Sp.* 603. *n.* 1. *Gels.* 621. *Fris.* 190.
Alfne altissima nemorum. Baub. pin. 251. *Comm. boll.* 6. *Morif. bist.* 2. *p.* 550. *f.* 5. *t.* 23. *f.* 1.
Boerb. lugdb. 1. *p.* 208.
Oed. dan. *t.* 271.
Groote Bosch-Muur. Belg.
Wilde-Rogge. Groninganis.
Op schaduwachtige plaatsen by Uilenpas, Harderwyk, Haarlem, Alkmaar, Heerenveen, Oran-jewoud; in 't Klaverbosch by Harderwyk; overvloedig in 't Goreght buiten Groningen; en elders.

- anagallis.* 378. *STELLARIA* foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bi-

DECANDRIA TRIGYNIA. 119

bifidis. Sp. 603. n. 4. Gehr. 272. Frif. 70.
Frif. 192.

Caryophyllus arvensis glaber, flore majore. Baub.
pin. 210. Comm. boll. 22.

Holofteum. Lob. ic. 46.

Oogentrooft - Gras. Belg.

Overvloedig in 't Klaverbosch by Harderwyk; in 't
Haagse-Bosch; in den Haartemmer-hout; in
de Salkerwaart; te Utrecht by de Malibaan; in
Friesland by het Oranjewoud; en elders.

379. STELLARIA foliis linearibus integerrimis, flori-
bus paniculatis. Sp. 604. n. 5. Gehr. 251. Frif.
193.

Caryophyllus arvensis glaber, flore minore. Baub.
pin. 210. Comm. boll. 22.

Gramen floridum minus. Tabern. ic. 232.

Klein Oogen-trooft - Gras. Belg.

In de Zaaï-landen, en ook by de voorgaande.

380. STELLARIA foliis lanceolatis, petalis biparti-
tis, calycem longitudine æquantibus. Pollich.
palat. 429.

Alfine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petio-
lis unifloris. Hall. bist. 881.

Alfine hyperici folio. Vaill. par. 9. Tourn. inst.
242. Boerb. kugdb. 1. p. 209. n. 12. Lind. al-
fat. 112.

Alfine aquatica, folio gratiolæ, stellato flore.
Dill. giff. 58.

† Volgens BOERHAAVE.

Hanc in LINNÆANIS scriptis non reperio.

A R E N A R I A.

381. ARENARIA foliis ovatis acutis carnosiss. Sp. peploides.
605. n. 1. Gehr. 622. Frif. 194.

Alfine littoralis, foliis portulacæ. Baub. pin. 251.

Alfine maritima, foliis portulacæ. Loef. pruss.
12. t. 2.

Anthyllis maritima lentifolia. Baub. pin. 282.
Comm. boll. 11.

Zee-Forcelyn. Vulgo.

Veel aan 't Zee-strand by Harderwyk; in de Dut-
nen agter Bergen en Wummenum buiten Alk-

maar, en op verscheide andere plaatsen; in Friesland by Koebool, Dyks-hoek, en elders; te Delfzyl aan den Dollart.

- serotina.* 382. *ARENARIA* foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *Sp.* 605. *n.* 4. *Gelr.* 255. *Fugr.* 71.
Alsine plantaginis folio. Baub. bist. 3. *p.* 364.
Oed. dan. t. 329.
Aan de Heggen en in de Boschen op verscheide plaatsen.
- serpyllifolia* 383. *ARENARIA* foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Sp.* 606. *n.* 6. *Gelr.* 254. *Fris.* 195.
Alsine minor multicaulis. Baub. pin. 250. *Comm. boll.* 7.
Alsine minor. Fuchf. bist. 23.
Kleine Muur. Belg.
β. Alsine minor, lini capitulis. Baub. pin. 251. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 3.
In de Hoven en Moes-tuinen.
- rubra.* 384. *ARENARIA* foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Sp.* 606. *n.* 8. *Gelr.* 256. *Fris.* 196.
- campestris. α.* *Spergula purpurea. Baub. bist.* 3. *p.* 722.
Alsine Spergulæ facie minor, five spergula minor, flosculo subcæruleo. Baub. pin. 251. *prodr.* 119.
Boerb. lugdb. 1. *p.* 209. *n.* 7.
Polygonum foliis gramineis, spergulæ capitulis. Loef. pruss. 203. *t.* 63.
- marina.* *β.* *Alsine spergulæ facie media. Baub. pin.* 251. *Comm. boll.* 8. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 6.
Spergula marina. Dalech. bist. 1385. *Baub. bist.* 3. *p.* 723.
Zee-Spurrie. Belg.
Te Heemze in Overysfel aan de kanten der Bouwlanden, alwaar weinig gras is; aan de dykjes in 't Goreght, en aan de kanten der Zaailandden by Groningen; ook buiten Franeker, en elders. β. op 't Koegras by de Helder, en langs de Zeekant by Harderwyk, Muiderberg, &c.
- β-tota.* 385. *ARENARIA* foliis linearibus erectis oppressis, calycibus oblongis striatis. *Sp.* 608. *n.* 14.

DECANDRIA TRIGYNIA 121

Alfine folio gali, flore magno albo purpurascente.

Loerb. lugdb. 1. p. 209. n. 10.

Auricula muris, pulchro flore; folio tenuissimo.

Baub. bist. 3. p. 361.

† *Volgens BOERHAAVE.*

P E N T A G Y N I A.

S E D U M.

386. *SEDUM* foliis planiusculis ferratis, corymbo *Telephium.*
folioso, caule erecto. *Sp. 616. n. 2. Gelr. 266.*

Krif. 197.

Telephium vulgare. Faub. pin. 287. Comm. boll.
109.

Telephium alterum f. Crassula. Dod. pempt. 130.

Anacampseros vulgo Faba crassa. Baub. bist. 3.
p. 681.

Smeer-Wortel, Groot Breuk-kruid, Woud-kruid,
Donder-Boonen, Wolfs-Loonen. Belg.

St. Jans-kruid. Groningans.

Op de Wallen te Zutphen, aan de dykjes by Uilen-
pas, Twello, in 't Clarenbeeksche-Bosch, en
elders in Gelderland; aan de dykjes by Velsen;
in Friesland omtrent Bergum, Oostermeer, Hee-
renveen en elders in de Wouden, aan dykjes,
ruige wegen en onbebouwde stukken lands; op
boschagtige plaatsen by de Mickelhorst, by On-
nen, en elders in 't Goreght.

Pharm. CRASSULÆ herb.

387. *SEDUM* foliis planis, caule ramofo, floribus pa- *Cepæa.*
niculatis. *Sp. 617. n. 8.*

Cepæa. Baub. pin. 288. Cam. epit. 673. Clus. bist.

2. p. 68. Comm. boll. 23.

Wilde Porcelyn. Belg.

Langs de Zee-kusten van Holland, veel op 't Koe-
gras omtrent de Helder, en aan de Muidetberg.
(HALL. Elem. Physiol. tom. 7. p. 172.)

388. *SEDUM* foliis subulatis quinquafariam confertis *rupestre.*
basi solutis, floribus cymosis. *Sp. 618. n. 11.*
Gelr. 267.

523 DECANDRIA PENTAGYNIA.

Sedum minus luteum, folio acuto. Baub. pin. 282.

Morif. bist. 3. p. 471. f. 12. t. 6. f. 8.

Tripmadam. Vulgo.

Op de Muuren te Arnhem en Harderwyk; langs de Maas dyken; aan de Kerk te Wyk by Duurstede; op de daken der huizen te Amerongen, en aan de Wal om 't Huis te Beverwaart in 't sticht van Utrecht; overvloedig aan een dykje agter Stelpen, aan de westkant van de Heereweg, en agter Haren by Voorveld buiten Groningen.

album.

389. *SEDUM* foliis oblongis obrufis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. *Sp. 619. n. 13. Gelr. 269.*

Sedum minus teretifolium album. Baub. pin. 283.

Comm. boll. 104. Morif. bist. 3. p. 472. f. 12.

t. 7. f. 23. & 24.

Oed. dan. t. 66.

Klein Huis- Look. Belg.

Schot-kruid. Groningans.

Op oude Daken en Muuren.

Pharm. SEMPERVIVI MINORIS herb.

acre.

390. *SEDUM* foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Sp. 619. n. 15. Gelr. 268. Frif. 198.*

Sempervivum minus vermiculatum acre. Baub. pin. 283. Comm. boll. 104.

Illecebra f. Sempervivum tertium. Dod. pempt. 129.

Muur-Peper. Belg.

Berg-Knop. Vulgo.

Aan den Dyk by Arnhem; op de Heide by Zelhem in't Graafschap Zutphen; op de Stads-muuren te Tiel, Harderwyk, Utrecht, Wyk by Duurstede; in de Duinen en aan de kanten der Zandige Bouwlanden by Haarlem, Alkmaar, Naarden, en elders. Menigvuldig langs de gansche Friesche Zee-kust, en op veele andere plaatsen binnen-dyks.

Pharm. ILLECEBRÆ MINORIS herb.

O X A L I S.

acerosella. 391. *OXALIS* scapo unifloro, foliis ternatis obcorda-

DECANDRIA PENTAGYNIA. 123

- datis, radice dentata. *Sp.* 620. *n.* 1. *Gelr.* 264.
Trifolium acetosum vulgare. *Baub.* *pin.* 330. *Comm.*
boll. 112. *Morif. bist.* 2. *p.* 184. *f.* 2. *t.* 17. *f.* 1.
Klaver - Zuuring, Koekkoeks - brood. Belg.
 β. *Trifolium acetosum vulgare, flore purpurascens.*
Morif. bist. 2. *p.* 183. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 319.
In de Koorn-landen en Moesboven; ook in 't Haag-
se-Bosch.
Pharm. ACETOSELLÆ herb.

392. *OXALIS pedunculis umbelliferis, caule ramoso corniculata*
diffuso. *Sp.* 623. *n.* 11. *Gelr.* 265. *Frisf.* 200.
Oxyslutea. *Baub.* *bist.* 2. *p.* 388. *Boerb. lugdb.* 1.
p. 319.
Trifolium acetosum corniculatum. *Baub.* *pin.*
 330. *luteum minus repens, etiam procumbens.*
Morif. bist. 2. *p.* 183. *f.* 2. *t.* 17. *f.* 2.
Koekkoeks - brood. Belg.
In de Moesboven; en in de Besschedie by Uilenpas.

A G R O S T E M M A.

393. *AGROSTEMMA hirsuta, calycibus corollam Githago.*
æquantibus, petalis integris nudis. *Sp.* 624. *n.* 1.
Gelr. 262. *Frisf.* 201.
Nigellastrum. *Dod. pempt.* 173.
Lychnis segetum major. *Baub.* *pin.* 204. *Comm.*
boll. 69.
Oed. dan. t. 576.
Koorn-Roozen of Nagel-bloemen. Belg.
Bol of Bolderik. Rusticulis.
In de Zaailanden onder 't Koorn op verscheide plaat-
sen.

L Y C H N I S.

394. *LYCHNIS petalis quadrifidis fructu, subrotundo. Flos cuculi.*
Sp. 625. *n.* 2. *Gelr.* 263. *Frisf.* 202.
Caryophyllus pratensis, flore laciniato simplici,
f. Flos cuculi. *Baub.* *pin.* 213. *Comm. boll.* 22.
Oed. dan. t. 590.
Koekkoeks-bloem, Kraaye-Bloem. Belg.
Pinxter-bloemen. Groningans.
 β. *Lychnis pratensis, flore laciniato albo simplici.*
Tourn. inst. 336.

Zeer

124 DECANDRIA. PENTAGYNDA.

Zeer veel in de Heer- en Wey-Landen. B. aan de Sloot omtrent den Tryfelberg by Hattem; ook by Groningen.

- Boica.* 395. *LYCHNIS* floribus dioicis. *Sp.* 626. n. 6. *Gelr.* 249. *Fris.* 203.
a. *Lychnis sylvestris* f. *aquatica purpurea simplex.*
Laub. pin. 204. *Comm. boll.* 69.
Ocimoides purpureum multis. *Baub. hist.* 3. p. 343.
f. *Lychnis sylvestris alba simplex.* *Baub. pin.* 204. *Comm. boll.* 69.
By de wegen op schaduwachtige plaatsen by Vanenburg, Ouden-Aller, in Hierden, en elders in Gelderland, by Haarlem, Veltien; in 't Haagse-Bosch; by Utrecht; op den Rhenenfe-Berg; en veele andere plaatsen. B. Langs de Duinen en aan zandige wegen.
Variat etiam a corolla colore rubro, pallido, albicante, &c.

C E R A S T I U M.

- virgatum.* 396. *CERASTIUM* foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, caulibus diffusis. *Sp.* 627. n. 2.
Alfne hirsuta magno (parvo potius) flore. *Baub. pin.* 251. *Comm. boll.* 7.
Auricula muris quorundam, flore parvo, vasculo longo. *Baub. hist.* 3. p. 359.
In de Hoven, en langs de Wegen by Harderwyk, Hattem, Haarlem, Utrecht, Zwol, en elders.
viscosum. 397. *CERASTIUM* erectum villosa-viscosum. *Sp.* 627. n. 3. *Gelr.* 260.
Alfne hirsuta altera viscosa. *Baub. pin.* 251. *Comm. boll.* 7.
Alfne spuria quarta. *Dod. pempt.* 31.
Ruig Muur. Belg.
Langs de Wegen en in de Hoven.
semidecandrum. 398. *CERASTIUM* floribus pentandris, petalis emarginatis. *Sp.* 627. n. 4. *Gelr.* 261.
Alfne hirsuta minor. *Baub. pin.* 211.
Myosotis arvensis hirsuta minor. *Tourn. inst.* 245.
Vaill. par. 142. t. 30. f. 2.

Veel

DECANDRIA PENTAGYNIA. 125

Veel op Zandige plaatsen by Harderwyk.

Tempore vernali inprimis conspicitur.

399. CERASTIUM foliis lineari-lanceolatis obtusis *arvensis*.
glabris, corollis calyce majoribus. *Sp.* 628. n.
6. *Gelr.* 259 *Fris.* 205.

Caryophyllus holosteus arvensis hirsutus, flore
majore. *Baub. pin.* 210. *Comm. boll.* 22.

Auricula muris, pulchro flore albo. *Baub. bist.* 3.
p. 360.

Kleine witte Ginoffelen, Ruig Oogen-troost-Gras.
Belg.

• *Scheele Oogen. Vulgo.*

*In den Enck en elders by Harderwyk; langs de
zandige Wegen en Akkers by Velsen; aan de dyk-
jes om trent Oudega en Rotteval in Friesland.*

S P E R G U L A.

400. SPERGULA foliis verticillatis, floribus decan- *arvensis*.
dris. *Sp.* 630. n. 1. *Gelr.* 257. *Fris.* 206.

Spergula. Dod. pempt. 537.

Alfne Spergula dicta major. *Baub. pin.* 250. *Comm.*
boll. 8.

Spurrie. Belg.

Water-Gal. Groninganis.

- β. *Spergula pentandra. Sp.* 630. n. 2. *Fris.* 307. Belg.
378.

Alfne *spergulæ* facie minima, flosculis albis.
Comm. boll. 8.

*Overvloedig op de Akkers van 't Duin, en in de
zandige Bouw-landen by Arnhem, Harderwyk,
Haarlem, Alkmaar; in Gooiland; in de Wou-
den in Friesland; in 't Goreght by Groningen;
en elders. Overvloedig agter den Hoef en Ber-
gen buiten Alkmaar; in 't Bentveld by Haarlem;
en elders.*

III. LINNÆUS (*Mant. p.* 390.) recte monet *Sper-
gulam arvensem & pentandram meras esse varieta-
tes.*

401. SPERGULA foliis oppositis subulatis lævibus, *nodosa*.
caulibus simplicibus. *Sp.* 630. n. 3. *Gelr.* 258.
Alfne *nodosa germanica. Baub. pin.* 251. *prodr.*
118.

Ara.

126 DECANDRIA PENTAGYNIA.

*Arenaria. Baub. bist. 3. p. 720. f. 721. Comm:
boll. 12.*

*Polygonum, foliis gramineis, alterum. Loef. pruss.
204. t. 64.*

Oed. dan. t. 96.

Zand - kryd. Belg.

*In de Duin - Valeyen by 's Hage, Raaphorst, Wes-
terhout, Heemstede; ook op vochtige plaatsen
omtrent Hattem en Zwol; in 't Veenland by Ha-
ren buiten Groningen.*

CLAS-

C L A S S I S XI.

D O D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

L Y T H R U M.

402. *LYTHRUM* foliis oppositis cordato - lanceolatis, *Salicaria*.
 floribus spicatis dodecandris. *Sp.* 640. n. 1.

Gelr. 270. *Fris.* 208.

Lythimachia spicata purpurea. *Baub. pin.* 246. *Comm.*
boll. 70.

Pseudo-Lythimachium purpureum alterum. *Dod.*
pempt. 86.

Partyrke. Belg.

Katte - Staarten. Groninganis.

Veel aan de Water - kanten.

403. *LYTHRUM* foliis alternis linearibus, floribus
 hexandris. *Sp.* 642. n. 8. *Gelr.* 271. *Hoffm.*

Salicaria hyssopi folio latiore. *Tourn. inst.* 253.
Hall. jen. 147. t. 6.

Hyssopifolia f. *Gratiola* minor angustioribus fo-
 liis. *Baub. prodr.* 108.

Hyssopifolia. *Baub. pin.* 218.

In Overysfel te Westerholte in de laagte omtrent
't huis van de groote Kerk.

MEESE cum precedenti crescere dicit. Cl. BOEHMER
Flor. Lips. 540. modo stamina 4. aliquando, ut
III. HALLERUS, 5. vel 6. vidit.

DI-

D I G Y N I A.

A G R I M O N I A.

- Eupatoria.* 404. *AGRIMONIA* foliis caulinis pinnatis: impari
petiolato, fructibus hispidis. *Sp.* 648. n. 1.
Gelr. 272. *Fris.* 210.
Eupatorium veterum f. *Agrimonia*. *Baub.* pin. 321.
Comm. boll. 36.
Eupatorium. *Fuchf. bist.* 244. *Cam. epit.* 756.
Oed. dan. t. 588.
Agrimony, *Lever-kruid*. Belg.
Veel in de Betuwe en 't Graaffschap Buuren; in de
Weiden omtrent den Yssel; aan den Dyk by Wa-
geningen en de Poll; in 't Ribben-Boschje by Har-
derwyk; aan den Dyk by Gouda; in de grasige
Valeyen der Duinen buiten 's Hage, Haarlem en
Alkmaar; aan de Wegen om Utrecht en Wyk by
Duurstede; by Balk en Veenhuizen in Friesland;
by Zwol; te Hemmen en Haren by Groningen;
en elders.
Pharm. *AGRIMONIA herb.*

T R I G Y N I A.

R E S E D A.

- Luteola.* 405. *RESEDA* foliis lanceolatis integris basi utrinque
unidentatis, calycibus quadrifidis. *Sp.* 643. n. 1.
Gelr. 309.
Luteola herba falicis folio. *Baub.* pin. 100. *Comm.*
boll. 69.
Luteola herba. *Dod. pempt.* 80.
Wouw, Belg.
Aan den Weg tusschen Zutphen en Doesburg; op de
Wal te Tiel en Bommel, langs de Wegen by
's Hage; in de Duinen niet verre van Wyk op
Zee; aan den Dyk tusschen Naarden en Muiden;
by 't Casteel Duurstede; te Groningen by Ebbinge-
poort onder aan de Wal by 't Boterdiep; en elders.
406. R. B.

DODECANDRIA TRIGYNIA. 129

406. *RESEDA* foliis omnibus trifidis: inferioribus pin-
natis. *Sp.* 645. *n.* 8 *Gelr.* 310.
Reseda vulgaris. *Baub. pin.* 100. *Comm. boll.* 98.
Reseda lutea. *Baub. bist.* 3. p. 467.
Om Arnhem by 't Slakke-gat; te Hattem op de Ho-
moets-poort; aan de Dyken by Amsterdam; in
't Haagsche - Bosch; aan de Duinkant buiten
Haarlem; en elders.

EUPHORBIA.

407. *EUPHORBIA* dichotoma, foliis crenulatis subro-
tundis glabris, floribus solitariis axillaribus,
caulibus procumbentibus. *Sp.* 452. *n.* 25.
Chamaefyce. *Baub. pin.* 293. *Clus. bist.* 2. p. 187.
† *Volgens BOERHAAVE.*
408. *EUPHORBIA* umbella trifida: dichotoma, in-
volucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis
petiolatis. *Sp.* 653. *n.* 31. *Gelr.* 303. *Frif.* 211.
Peplus f. *Esula* rotunda. *Baub. pin.* 292. *Comm.*
boll. 86.
Peplus. *Fuchf. bist.* 603. *Dod. pempt.* 375.
Duivels - Melk; Hexe - Melk; Kroontjes - kruid,
Kleine Spurge. Belg.
In de Zaaï-landen, Moes-boven, en by de Wegen.
409. *EUPHORBIA* umbella trifida: dichotoma, in-
volucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Sp.* 654.
n. 34. *Gelr.* 304.
Tithymalus f. *Esula* exigua. *Baub. pin.* 291. *Comm.*
boll. 110. *Morif. bist.* 3. p. 339. *f.* 16. t. 2. f. 5.
Oed. dan. t. 592.
In de Koorn-landen by Bunnik; Odyk in de Pro-
vinctie Utrecht; by Zwol; en elders.
410. *EUPHORBIA* umbella quinquefida: bifida, in-
volucellis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis:
infirmis involutis retrorsum imbricatis. *Sp.* 656.
n. 41.
Tithymalus foliis brevibus aculeatis. *Baub. pin.*
292.
Pithyusa. *Dalech. bist.* 1652.
In de Duinen. (LINN.)

530 DODECANDRIA TRIGYNIA

- Paralias*. 411. *EUPHORBIA umbella subquinquefida: bifida*, involucellis cordato reniformibus, foliis sursum imbricatis. *Sp.* 657. n. 13. *Gelr.* 306.
Tithymalus maritimus. *Baub.* pin. 291. *Dod. pempt.* 370. f. 1. 2. *Comm. boll.* 110.
Tithymalus paralias. *Cam. epit.* 962.
Zee-Wolfs-Melk. Belg.
By Zandvoort op de Zee-duinen.
- helioscopia*. 412. *EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma*, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis. *Sp.* 658. n. 46. *Gelr.* 302.
Fris. 212.
Tithymalus helioscopius. *Baub.* pin. 291. *Dod. pempt.* 371. *Lob. bist.* 192. *Comm. boll.* 111.
Morif. bist. 3. p. 359. f. 10. t. 2. f. 9.
Zonnewendend Wolfs-Melk of *Kroontjes-kruid*. Belg.
In de Zaaï-landen by het Huis te Marquette; te Salk in Overysfel; en in Friesland op veel plaatsen onder 't Koorn.
- platyphyllos* 413. *EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma*, involucellis carina pilosis, foliis serratis lanceolatis, capsulis verrucosis. *Sp.* 660. n. 53.
Tithymalus arvensis latifolius germanicus. *Baub.* pin. 291.
Tithymalus platyphyllos. *Fuchf. bist.* 813.
† *Volgens BOERHAAVE.*
- Esula*. 414. *EUPHORBIA umbella multifida: bifida*, involucellis subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus. *Sp.* 660. n. 54.
Gelr. 305. app. p. 249.
Tithymalus foliis pini, forte dioscoridis Pityusa. *Baub.* pin. 293. *Comm. boll.* 110.
Esula minor. *Dod. pempt.* 374.
Kleine Esula of *Wolfs-Melk*, *Kleine Spurge*. Belg.
Overvloedig in de Velden, en aan den Dyk langs den Yssel in Gelderland en Overysfel.
Pharm. ESULE MINORIS rad.
- Cyparissias*. 415. *EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma*, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis se-

DODECANDRIA TRIGYNIA. 431

setaceis; caulinis lanceolatis. *Sp.* 661. n. 55.

Gelr. 624

Tithymalus cyparissius. Baub. pin. 291.

Tithymalus cypripellinus Tabern. bist. 990.

Omsrent de Waart te Salk by Campen.

416. *ELPHORBIA umbella multifida: subtrifida: palustris.*

bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis,

ramis sterilibus. *Sp.* 662. n. 57. *Gelr.* 307.

Tithymalus palustris fruticosus. Baub. pin. 292.

Comm. boll. 110. *Morif. bist.* 3. p. 341. f. 10.

t. 2. f. 1.

Esula major. Dalech. bist. 1653. *Dod. pempt.* 374.

Groot Wolfs-Melk, Groote Spurge, Duivels-Melk.

Belg.

Aan de Slooten by Nymegen en Doesburg; in 't

Bosch van den Uilenpas; in de Riet-landen aan

den Hoogendyk tusschen Amsterdam en Muiden;

en in sommige slooten in Friesland; en elders.

Pharm. ESULÆ MAJORIS rad.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

417. *SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus pa-* *testorum.*
tentibus. Sp. 664. n. 3. *Gelr.* 273.

Sempervivum majus alterum f. Barba jovis. Dod.

pempt. 127.

Sedum majus vulgare. Baub. pin. 283. *Comm. boll.*

t. 4.

Huis-look, Donderbaart Belg.

Op de Daken en Muuren van oude Huizen.

Pharm. SEMPERVIVI MAJORIS herb.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

PRUNUS.

- Padus.* 418 **PRUNUS** floribus racemosis, foliis deciduis basi
 fimbriatis biglandulosis *Sp.* 677. n. 1. *Gelr.* 277.
Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli.
aub. pin. 451.
Pseudo-Ligusticum. *Dod. pempt* 777.
Oed. dan. t. 205.
Zwarte Vogel-Kars, Hondskars. Belg.
Wilde Syringe. Vulgo.
By Harderwyk in den Enk, aan 't eind van de
Zandsteeg, aan de kant van de booge Sydel, en
op andere vocutige plaatjen.
- cyum.* 419. **PRUNUS** umbell'is sessilibus, foliis ovato-lance-
 olatis conduplicatis subtus pubescentibus. *Sp.*
 680. n. 10.
Cerasus sylvestris, fructu rubro. *Baub. bist.* 1. p.
 270
Wilde Karsen-boom. Vulgo
In 't Bosch van den Uilenpas.
- domestica.* 420. **PRUNUS** pedunculis subsolitariis, foliis lance-
 olato ovatis convoluti, ramis mucicis *Sp.*
 680. n. 11. *Gelr.* 275. *Fris.* 213.

Pru.

ICOSANDRIA MONOGYNIA. 133

Prunus. *Baub. pin.* 443.
Pruna *majora dulcia & parva atro-cærulea.*

Baub. pin. 442. n. 23.

Wilde kleine zwart blauwe Pruim. Belg.

*In Friesland omtrent Bergum, 't Wyfel, Kooten,
 en Drogeham in ruige Wallen, Kreupelbosjes,
 en op sommige afgelegene plaatjen.*

Pharm. PRUNI fruct.

Multa bujus in hortis coluntur varietates.

421. *PRUNUS* pedunculis solitariis, foliis lanceolatis spinosis
 glabris, ramis spinosis *Sp.* 681. n. 13 *Gelr.*

274. *Fris.* 214.

Prunus sylvestris. *Baub. pin.* 444. *Dod. pempt.*

753. *Comm. boll.* 91.

Slee-doorn, Slee-pruim. Belg.

Slyen Groninganis

*Veel buiten Tiel, Harderwyk, Zwol, Naarden
 omtrent Cralo; Haarlem agter Overveen; in 't
 Haagse-Bosch; by Doorn in 't Sticht van U-
 trecht; in Friesland by de voorige, als nog te
 Suy-huysum by Haule, en omtrent Donkerbidek;
 menigvuldig aan de dykjes door t geheele Goroght
 by Groningen; en op meer plaatjen aan de wegen
 tusschen kreupelhout.*

Pharm PRUNI SYLVESTRIS flor. fructus, quo-
 rum succus *Acacia germanica.*

DIGYNIA.

CRATÆGUS.

422. *CRATÆGUS* foliis obtusis subtrifidis serratis; *Sp. Oxyacan-
 683. n. 8. Gelr.* 278. *Fris.* 215. *tha.*

*Mespilus, apii folio, sylvestris spinosa f. Oxy-
 acantha.* *Baub. pin.* 454. *Comm. boll.* 74.

Oxyacantha f. Spina acuta. *Dod. pempt.* 751.

Haage-doorn. Belg.

Fructus vulgo Haag-appels, Spinne-koorns.

*In de Wildernissen op veele plaatjen, ook in de Dui-
 nen by Overveen en Westerhout, en op het
 Hoogveld by den Haarlemmer hout.*

Flores sepius monogyni, quam digyni.

T R I G Y N I A

S O R B U S.

- aucuparia.* 423. *SORBUS* foliis pinnatis utrinque glabris. *Sp.* 683.
n. 1. Gelr. 279 *Fris.* 216.
Sorbus sylvestris, formis domesticæ similis. Baub.
pin. 415. *Comm. boll.* 107.
Sorbus aucuparia. Aub. bist. 1. p. 62.
Lyster - Beziën - boom, Sorbe - boom, Qualster - boom.
Belg.
Quetze - bezen - boom Groningans.
In 't Haagse - Bosch, in de Duinen niet verre van
Wassenaar; veel aan de aykjes in 't Goreghe
buiten Groningen; en elders aan de Wegen op
schaduwachtige plaatsen, en aan de kanten der
Boomgaarden.

P E N T A G Y N I A.

P Y R U S.

- communis.* 424. *PYRUS* foliis ferratis lævibus, floribus corym-
bosis. Sp. 686. *n. 1. Gelr.* 282. *Fris.* 217.
Pyrus sylvestris. Baub. pin. 439. *Dod. pempt.* 799.
Comm. boll. 94.
Wilde Peere - boom Belg.
In 't Salker - bosch tusschen Campen en Salk aan den
Yssel; ook van zelf uit 't zaad in de Ent - boven.
- Malus.* 425. *PYRUS* foliis ferratis, umbellis sessilibus. *Sp.*
689. n. 2. Gelr. 281. *Fris.* 218.
Malus sylvestris. Baub. pin. 435. *Dod. pempt.* 790.
Comm. boll. 71.
Wilde Appel boom Belg.
By de voorige; ook aan de Heereweg agter Helpen,
agter Haren, en aan de Weg naar Onnen buiten
Groningen.

S P I R Æ A.

- Filipendula.* 426. *SPIRÆA* foliis pinnatis; foliolis uniformibus ser-
ra.

ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 133

ratis, caule herbaceo, floribus corymbosis. *Sp.*

702. n. 9

Filipendula vulgaris. *Baub. pin.* 163. *Boerb. lugdb.*

1. p. 43.

Filipendula. *Cam. epit.* 608. *Dod. pempt.* 56.

Roode Steen-breek, Drop-wortel. Belg.

Op een Waard aan de Leck tusschen Wyk by Duurstede en Schaalkwyk.

Pharm. FILIPENDULÆ rad. herb.

427. *SPARREA* foliis pinnatis: impari majore lobato, *Ulmaria*,
floribus cymosis. *Sp.* 702. n. 10. *Gehr.* 284.

Fris. 219.

Barba capræ floribus compactis. *Baub. pin.* 164.

Comm. boll. 15

Regina prati. *Dod. pempt.* 57.

Oed. dan. t. 547.

Geiten baard, Reinette. Belg.

Veel op vochtige schaduwachtige plaatsen.

P O L Y G Y N I A.

R O S A.

428. *ROSA* germinibus globosis pedunculisque glabris, *Eglanteria*,
caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliis acutis. *Sp.* 703. n. 3.

Rosa sylvestris, foliis odoratis. *Baub. pin.* 483.

Comm. boll. 99.

Rosa eglanteria. *Talern. ic.* 1087.

Wilde Rooze-boom, Eglantier, of Neglantier. Belg.

By Velsen aan de kanten der Akkers.

429. *ROSA* germinibus globosis glabris, pedunculisque ~~spinosis~~
hispidis, caule petiolisque aculeatissimis. *Sp.*

705. n. 14.

Rosa campestris spinosissima, flore albo odorato.

Baub. pin. 483. *Comm. boll.* 99.

Rosa dunensis. *Dod. pempt.* 182.

Oed. dan. t. 398.

Duin-Roos. Belg.

Te Maurik op den Bikkelenberg in de Betuwe; in de Duinen aan de Weg tusschen Haarlem en Zandvoort.

136 ICOSANDRIA POLYGYNIA

voort, en in die agter Westerhout.

- canina.* 430. *Rosa* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Sp.* 704. n. 10. *Gelr.* 285. *Fris.* 220.
Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. *Baub.* pin. 483.
Rosa canina vulgo dicta. *Dod. pempt.* 187.
Honds-Roos. Belg.
Wipe-doorn. Harderovicenis.
Veel aan de kanten der Akkers in de Betuwe, ook by Harderwyk; in Twente by Enschede; in Friesland omtrent Eestrum, Drogeham, Kooten, en elders; in 't Goreght, en manigvuldig aan de Oostkant van Haren buiten Groningen.
Pharm. CYNOSBATI fruct. Bedeguar.

R U B U S.

- levis.* 431. *Rubus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Sp.* 706. n. 1. *Gelr.* 288.
Rubus idæus spinosus. *Baub.* pin. 479. *Comm. boll.* 99.
Rubus idæus. *Dod. pempt.* 743.
Framboizen, Braamboizen. Hinne-Beziën. Belg.
Heining-Bessen. Veenendalensibus.
Veel by de Wegen te Venendaal op de Veluwe; en in 't Eosch by de Mickelhorst buiten Groningen.
Pharm. RUBI IDÆI bacc.
- castus.* 432. *Rubus* foliis ternatis subnudis: lateralibus bilobis, caule aculeato tereti. *Sp.* 707. n. 4. *Gelr.* 287.
Rubus repens, fructu cæsius. *Baub.* pin. 479.
Rubus minor. *Dod. pempt.* 742.
Blaauwe Brummelen *Gelris*
Tusschen Nykerk en de Beerekamp; ook by Uilenpas, Zuideras, Oën, en elders in Gelderland.
- fruticosus.* 433. *Rubus* foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Sp.* 707. n. 5. *Gelr.* 286. *Fris.* 221.
Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro. *Baub.* pin. 479. *Comm. boll.* 92.

Ru-

ICOSANDRIA POLYGYNIA. 137

Rubus. *Dod. pempt.* 743. *Cam. epit.* 751.

Braam - beziën. Belg.

Brummels. Vulgo.

Tonbeyen. Frisius.

Langs de Wegen in Gelderland, Utrecht, Overysel, Twente; overvloedig in de Haarlemmerhout en 't Haagse - Bosch; langs de Duinkant in Holland; door de gantsche Woudekant in Friesland; en in 't Goreght buiten Groningen.

Pharm. RUBI VULGARIS. bacc.

F R A G A R I A.

431. *FRAGARIA flagellis reptantibus*. *Sp.* 708. *n.* 1. *vesca*.
Gelr. 289. *Fris.* 222.

Fragaria vulgaris. *Baub. pin.* 326. *Comm. boll.* 78.

Aard - beziën. Belg.

ƒ. *Fragaria fructu albo*. *Baub. pin.* 326.

In verschâde Poffchadien in Gelderland, Overysel, Friesland; aan de Duinkant van Holland; aan de dykjes by Haren buiten Groningen.

Pharm. FRAGARIÆ rad. herb. fruct.

Varietatem olim etiam legi in peribolo turris Hardevicene, e seminibus a vento vel avibus ibi procul dubio adlatis enatam.

P O T E N T I L L A.

435. *POTENTILLA foliis pinnatis ferratis, caule repente, pedunculis unifloris*. *Sp.* 710. *n.* 2. *Gelr.* 290. *Fris.* 223.

Potentilla. *Baub. pin.* 321. *Comm. boll.* 93.

Argentina. *Dod. pempt.* 600.

Oed dan. t. 544.

Zilverſchoon, Zilver kruid, Blik, Ganferik Belg.

Menigvuldig aan de Wegen en Paden, en in de Weilanden.

Pharm. ARGENTINÆ f. ANSERINÆ herb.

436. *POTENTILLA foliis pinnatis, caule dichotomo supino, decumbente*. *Sp.* 711. *n.* 9.

Pentaphyllum supinum quorundam, potentillæ facie. *Clus. hist.* 2. p. 107.

Quinquefolio fragifero affinis. *Baub. pin.* 326.

Comm. boll. 94.

15

Op

138 ICOSANDRIA POLYGYNIA.

Op zandige dorre plaatsen in de Duinen en omérent den Haalemmer-hout, en buiten Utrecht achter de Bilt.

- argentea.* 437. **POTENTILLA** foliis quinatis cuneiformibus incisifidis subtus tomentosis, caule erecto. *Sp.* 712. *n.* 11. *Gelr.* 292. *Fris.* 224.

Quinquefolium folio argenteo. Baub. pin. 325.

Pentaphyllum minus. Cam. epit. 760.

In de Duinen by Raaphorst en Westerhout; te Heemze by de Kalfsboom in Overysfel; in Friesland op verscheide plaatsen in de Wouden in Bosschen, lauge gruppels en Heivelden.

- rupe.* 438. **POTENTILLA** foliis radicalibus quinatis acute ferratis retusis; caulinis ternatis, caule declinato. *Sp.* *n.* 15.

Quinquefolium minus repens luteum. Baub. pin. 325.

Pentaphyllum f. Quinquefolium minus. Tabern. ic. 123.

Oed. dan. t. 114.

In de Landen by den Essenburg buiten Harderwyk.

- repans.* 439. **POTENTILLA** foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Sp.* 714. *n.* 22. *Gelr.* 291, *Fris.* 225.

Quinquefolium majus repens. Baub. pin. 325. *Comm. boll.* 94.

Quinquefolium majus. Dod. pempt. 116.

Vyf-vinger-kruid Belg.

Veel op de Stads wey by Harderwyk; in de Duinvalen van Holland, en in de Wouden in Friesland.

Pharm. **PENTAPHYLLI** rad.

T O R M E N T I L L A.

- scilla.* 440. **TORMENTILLA** caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Sp.* 716. *n.* 1. *Gelr.* 293. *Fris.* 226.

Tormentilla sylvestris. Baub. pin. 326. *Comm. boll.* 111.

Tormentilla. Cam. epit. 685.

Oed. dan. t. 589.

Tormentille, ook Zeven-bled. Belg.

Meer.

ICOSANDRIA POLYGYNIA. 135

Meer-wortel *Ruricolis* *Gelræ.*

*Veel op de Heide in Gelderland; in de Duin-wa-
leyen, en op zandige gronden by Haarlem, Naar-
den, Utrecht, Zwol; in de Wouden in Fries-
land; en elders.*

Pharm. *L'ORMENTILLE rad. berb.*

*Radice bujus p antæ rustici utuntur ad miltum cru-
entum pecorum curandum, quæ tunc ipsis dituntur
aan 't Meer te staun; unde ratio denominationis.*

G E U M.

441. *GEUM* floribus erectis, fructibus globosis villosis: *urbanum.*
aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Sp.* 716.

n. 2. Gelr. 295. Fris. 227.

Caryophyllata vulgaris. Baub. pin. 321. Comm.
boll. 21.

Caryophyllata. Dod. pempt. 137.

Nagel-kruid, Gezegend kruid Belg.

*Op schaduwachtige plaatsen in Gelderland, U-
trecht, Overysel, Friesland; in den Hout by
Haarlem en Alkmaar; in 't Haagse-bosch en
aan den Weg naar Scheveningen; te G oningen
op de Stads-wal tusschen de Ebbinge- en Heensil-
poort, ook aan de Heereweg aan de dykjes, dog
weinig.*

Pharm. *CARYOPHYLLATE rad.*

442. *GEUM* floribus nutantibus, fructu oblongo: *ari-rivale.*
stis plumosis tortis. *Sp.* 717. *n. 3. Fris. 228.*

Caryophyllata aquatica, nutante flore. Baub. pin.
321.

Caryophyllata septentrionalium. Lob. ic. 694.

Nagel-kruid met neergebogene bloemen. Belg.

In de ruige Laanen en Doffchen in Friesland.
(MEESE.)

C O M A R U M.

443. *COMARUM. Sp.* 718. *n. 1. Gelr. 294. Fris. 229. palustre.*

Quinquefolium palustre rubrum. Baub. pin. 326.
Comm boll. 95.

*Pentaphyllum f. Heptaphyllum majus rectum ru-
brum palustre. Moris. bist. 2. p. 189. f. 2. t.*

19. f. 4.

Wa-

140 ICOSANDRIA POLYGYNIA.

Water-Vyf-vinger-kruid. Belg.

Kroofen. Vulgo.

*By Hulfen buiten Nymegen; in 't Veen by Uilen-
pas; aan de Stads wey by Harderwyk; en elders
in Gelderland in stilstaande Slooten en moerassige
Landen; ook by Kraalingen buiten Rotterdam;
by Overveen buiten Haarlem; by Maarleveen
in 't Sticht van Utrecht; by Zwol; in veele
Woudplaatjen in Friesland; en door gantsch Gro-
ningen.*

GLAS

C L A S S I S XIII.

P O L Y A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

C H E L I D O N I U M.

444. CHELIDONIUM pedunculis umbellatis. Sp. 723. majus.

n. 1. Gelr. 300. Frisf. 230.

Chelidonium majus vulgare. Faub. pin. 144. Comm.

boll. 25. Morisf. bist. 2. p. 257. f. 3. t. 11. f. 2.

Oed. dan. t. 5. 12.

Stinkende Gouwe, Oogen-klaar, Schel-kruid Belg.

β. Chelidonium majus vulgare, folio magis dissecto.

Boerb. lugdb. 1. p. 305. n. 5.

Veet onder de Heggen op ruwe plaatsen.

Pharm. CHELIDONII MAJORIS rad. herb.

P A P A V E R.

445. PAPAVER capsulis clavatis hispidis, caule fo- Argemone.

liso multifloro. Sp. 725. n. 2. Gelr. 623. Frisf.

231.

Argemone capitulo longiore Baub. pin 172. Lob.

fc. 276.

Argemone capitulo tenuiore longiore hirsuto.

Morisf. bist. 2. p. 278. f. 3. t. 14. f. 10.

Wilde Ruige-bastard-Heul Belg.

Op de Akkers in Hierden buiten Harderwyk, in

Bronkhorst, en elders in Gelderland; by bet

Dorp Heemskerk in Kennemerland; en by Pie-

ters.

142 POLYANDRIA MONOGYNIA.

tersbierum in Friesland.

- Rhous.* 446. PAPAVER capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incis. Sp. 726. n. 6. *Gelr.* 299. *Fris.* 232.
Papaver erraticum majus. *Baub. pin.* 171. *Comm. boll.* 85.
Papaver erraticum. *Dod. pempt.* 447.
Klap-Roozen, Koorn-Roozen, Koorn-Heul, Kollbloemen, Kanker-bloemen. Belg.
Honds-Roozen. Ultrajectinis.
Overvloedig in de Koorn-landen
Pharm. PAPAVERIS RHÆADOS flor.

- foamiferum* 447. PAPAVER calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incis. Sp. 726. n. 7. *Gelr.* 298.
Papaver hortense semine nigro. *Baub. pin.* 170.
Zwarte-Heul of Slaap-bol. Belg.
In de Bouwlanden, tusschen 't Koorn, by Zwol, Uilenpas, en elders.
Pharm. PAPAVERIS NIGRI sem.

N Y M P H Œ A.

- lutea.* 448. NYMPHŒA foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo majore. Sp. 729. n. 1. *Gelr.* 295. *Fris.* 233.
Nymphæa lutea major. *Raub. pin.* 193. *Comm. boll.* 81.
Nymphæa lutea. *Dod. pempt.* 585. *Cam. epit.* 635. *Gele Plompen.* Belg.
Gele Pompe bloemen. Groninganis.
β. Nymphæa lutea minor, magno flore. *Baub. pin.* 193. *Boerb. lugdb.* p. 281.
Op veele plaatsen in staande Wateren. & By Oldbroek, en in den Ouden Yssel in Gelderland; ook by Rotterdam, Gouda, Schoonhoven, Leerdam, en elders.
Pharm. NYMPHŒE LUTEE flor.
- alba.* 449. NYMPHŒA foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido Sp. 729. n. 2. *Gelr.* 297. *Fris.* 234.
Nymphæa alba major. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 80.
Nymphæa alba. *Dod. pempt.* 585.

Wit.

POLYANDRIA MONOGYNIA. 143

- Witte Plompen, Water-rozen, Water-Plompen,
Witte Water-Kruiken, Meirbladeren. Belg.
Witte Pompe bloemen. Groningans.*
β. *Nymphæa alba minor. Baub. pin. 193. Baub. bist.
3. p. 773. Comm. boll. 81.
Leuconymphæa minor, Boerb. lugdb. 1. p. 281.
Kleine witte Plompen. Belg.
By de voorgaande, maar niet zo menigvuldig. β.
Tusschen Muiden en Naarden, binnenayks in de
Braaken.*
Pharm. NYMPHÆE ALBÆ rad. herb. flor.

T I L I A.

450. *TILIA floribus nectario destitutis. Sp. 733. n. 1. europæa.
Gehr. 301. Frisf. 235.
Tilia foetmina, folio majore. Baub. pin. 426.
Comm. boll. 110.
Oed. dan t. 553.
Lindeboom Wyfke. Belg.*
β. *Tilia mas, foliis ulmi. Baub. pin. 426. Comm.
boll. 110.
Lindeboom Manneke. Belg.
Op veele plaatsen aan de Wegen, en in de Steden en
Dorpen.*
Pharm. TILIAE flor.

C I S T U S.

451. *CISTUS herbaceus exstipulatus, foliis opposi-
tis lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis.
Sp. 741. n. 22.
Cistus flore pallido, macula nigro-rufescente
insignito. Baub. pin. 465. Comm. boll. 27.
Helianthemum flore maculoso. Col. expbr. 2. p.
78. t. 77.
Op Vlieland by de Kerk.
Primum ibi hac rarissima Belgii planta lecta a Cl.
BREYNIO.*

T R I G Y N I A.

D E L P H I N I U M.

452. *DELPHINIUM nectaris monophyllis, caule* *Corollae*
sub-

144 POLYANDRIA TRIGYNIA.

- subdiviso. Sp. 748. n. 1. Gelr. 311.
Consolida regalis arvensis. Baub. pin. 142. Comm. boll. 21.
Flos regius sylvestris. Dod. pempt. 252.
Wilde Ridderspooren, Calketrip. Belg.
In de Koorn-velden op sommige plaatsen; veel te Maurik in de Betuwe.
 Pharm. *CALCATRIPPE* f. *CONSOLIDÆ REGALIS* herb. flor.

P E N T A G Y N I A.

A Q U I L E G I A.

- vulgaris.* 453. *AQUILEGIA nectariis incurvis.* Sp. 752. n. 1. Gelr. 312.
Aquilegia sylvestris. Baub. pin. 144. Comm. boll. 12.
Aquileja. Dod. pempt. 180.
Wilde Aguiley of Akkeley. Belg.
In de Laan voor Uilenpas, en in de Koorn-velden by Utrecht.
 Pharm. *AQUILEGIÆ* flor. sem.

H E X A G Y N I A.

S T R A T I O T E S.

- Aloides.* 454. *STRATIOTES foliis ensiformi-triangulis ciliato-aculeatis.* Sp. 754. n. 1. Gelr. 313. Frif. 236.
Aloë palustris. Baub. pin. 286. Comm. boll. 6.
Sedum aquatile f. *Stratiotes potamicos.* Dod. pempt. 588. & 589.
Oed. dan. 1. 337.
Ruiters-kruid, Water-Ruiters, Krabben-Klauw. Belg.
Stikel-Kreusen. Groningans.
Scheeren, Kaarten. Rusticis.
Zeer gemeen in veele Slooten in de Betuwe en in de Grift tusschen Nymegen en Arnhem; in den Ouden Yssel by Uilenpas; in de Slooten by Gouda; Oudewater, Haastrecht, Haarlem, buiten 's Hage

POLYANDRIA HEXAGYNIA. 145

's Hage langs den weg naar Wassenaar; in de Graafschappen Cuilenburg, Leerdam, Buuren; by Wyk te Duurstede, Veenendaal, Hardenbroek, Maarssen, Zuilen, Abcoude, Lopik, en elders in de Proventie Utrecht; in de Wouden en op de Kley in Friesland; ook veel in de Provintie Overysfel en Groningen, en by Zwartsluis in Drenthe.

Herba pabulo mixta remedium in Coryza equorum.
(de Droes.)

P O L Y G Y N I A.

A N E M O N E.

455. ANEMONE pedunculo involucrato, petalis *Pulsatilla* rectis, foliis bipinnatis. *Sp.* 759. n. 5.

Pulsatilla folio crassiflore & majore flore. *Baub pin.*

177. *Helvo puls.* 62. t. 8.

Pulsatilla. Cam epit. 398. *Dod. pempt.* 433.

Oed. dan. t. 153.

Wildemans - kruid. Belg.

Te Brunsberg buiten Zutphen; en op den Paaschbeuvel by ter Borch. (*Ill. Baro de ROUWENOORT.*)

456. ANEMONE feminibus acutis, foliolis incisfis, *nemorosa*. caule unifloro. *Sp.* 762. n. 15. *Gelr.* 314.

Anemone nemorosa, flore majore. *Baub. pin.* 176.

Comm. boll. 10.

Anemone V. Dod. pempt. 435.

Oed. dan. t. 549.

Bosch - Haanevoet. Belg.

Melk - wortel. Groninganis.

Wind - bloem. Vulgo.

β. *Anemone nemorosa*, flore majore ex purpura rubente. *Baub. pin.* 176.

γ. *Anemone nemorosa*, flore pleno albo. *Baub. pin.* 176.

Op schaduwachtige plaatsen buiten Harderwyk omtrent 's Heeren - Loo; in de Haarlemmer - Hout; in 't Haagse - Bosch; by Mickelhorst, Hemmen, Haren buiten Groningen; en elders.

146 POLYANDRIA POLYGYNIA.

- ranunculoides.* 457. ANEMONE feminibus acutis, foliolis incisfis, petalis subrotundis, caule subbifloro Sp. 762. n. 17. *Jngr.* 86. *Fris.* 237.
Ranunculus nemorosus luteus. *Baub. pin.* 178. *Comm. boll.* 96.
Ranunculus phragmites luteus nemorosus. *Baub. bist.* 3 p. 413.
Oed. dan. t. 140.
In den Aarden-hout by Haarlem omtrent de plaats Nuizenburg; in 't Haagse-Bosch; in Friesland omtrent Franeker, Orangewoud en Klein Katlyk op schaduwachtige plaatsen.

C L E M A T I S.

- Vitalba.* 458. CLEMATIS foliis pinnatis: foliolis cordatis scandentibus Sp. 766. n. 8. *Gelr.* 315.
Clematis sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 300.
Vitalba. Dod. pempt. 405.
Lynen. Belg.
Overvloedig te Perfsingen by Nymegen; in de Heggen te Bronkhorst in 't Graaffschap Zutphen; aan den Yssel-dyk by Terwolde op de Veluwe; en in de Herkeloer-waart in Overysfel.

T H A L I C T R U M.

- foetidum.* 459. THALICTRUM caule paniculato filiformi ramossimo. Sp. 768. n. 2.
Thalicttrum minimum foetidissimum. *Baub. pin.* 337. *prodr.* 147. *Baub. bist.* 3. p. 488. *Morif. bist.* 3. p. 325. *f. 9. t. 20 f. 13.*
Agter bet Jooden Kerkhof by 's Gravenhage. (Cel. SCHWENCKE.)
- minus.* 460. THALICTRUM foliis sexpartitis, floribus cernuis. Sp. 769. n. 6. *Gelr.* 625.
Thalicttrum minus. *Baub. pin.* 337. *Dod. pempt.* 58.
Thalicttrum alpinum minus saxatile, rutæ folio, staminibus luteis. *Segu. ver.* 476. *t. 11.*
In de Salker-waart by Campen, en de Weiden langs den Yssel by Zutphen; overvloedig by den Steenoven aldaar.
- saxum.* 461. THALICTRUM caule folioso sulcato, panicula

mul-

POLYANDRIA POLYGYNIA. 147

multiplīci erecta. *Sp.* 770. n. 10. *Gelr.* 316.
Frif. 238.

Thalictrum majus, filiqua angulosa aut striata.
Baub. pin. 336. *Comm. boll.* 109.

Thalictrum magnum. *Dod. pempt.* 58.

*Water-Ruit. Poel-Ruit, Heilblad, Valsch-Rba-
bärber.* Belg.

*Te Eghteid in de Betuwe aan den voet van den Dyk;
by Harderwyk in de Ooster-Mehen, aan 't
einde van de Weysteeg, en aan de booge Syppel
over de eerste Moolen; buiten Wageningen aan
den Dyk by de Tol-boom; aan den Weg tusschen
Diemen en Abkoude; in de Weilanden aan de
Muider-Dyk; aan de Kaade buiten de Leuter-
poort te Wyk by Duursteede; in Friesland
tusschen Tjetjerk, en 't Huis ter Heide, en elders
in de Wouden aan de kanten der Slooten en We-
gen, en in sommige Bosschen; ook in de Salker-
waart.*

A D O N I S.

462. *Adonis floribus pentapetalis, fructibus ovatis. aestivalis.*

Sp. 771. n. 1.

Adonis sylvestris, flore phoeniceo, ejusque foliis
longioribus. *Baub. pin.* 178. *Boerb. lugdb.* 1.
p. 35.

Adonis flore pallido. *Cam. epit.* 648.

Adonis-bloem, Bruinettekens. Belg.

Komt van zelf voort onder het Koorn.

R A N U N C U L U S.

463. *Ranunculus foliis ovato-lanceolatis peti- Flammula.*

olatis, caule declinato. *Sp.* 773. n. 1. *Gelr.*
317. *Frif.* 239.

Ranunculus longifolius palustris minor. *Baub. pin.*
186. *Comm. boll.* 96.

Flammula Ranunculus. *Dod. pempt.* 432.

Oed. dan. t. 572.

Kleine Egel-Koolen. Belg.

Egel-gras. Rusticis.

In vochtige Wei-landen, en Moerassige plaatsen.

*Ruricolæ Gelriæ adfirmant oves ex esu hujus plantæ
hydropicos (gellig) fieri & exinde mori; minus
autem boves adfici.*

148 POLYANDRIA POLYGYNIA.

- Lingua.* 464. *RANUNCULUS* foliis lanceolatis, caule erecto.
Sp. 773. *n.* 3. *Gelr.* 318. *Fris.* 240.
Ranunculus longifolius palustris major. *Baub. pin.*
 34. *Comm. boll.* 96.
Lingua Plinii. Dalech. bist. 1037.
Egel - Koolen. Belg.
In de Slooten te Persingen, Ommeren, Ryswyk
in de Betuwe; in de Kolken aan den Ouden Ys-
sel; in de Slooten by Bauren; en in die van de
Sillik by Haarlem; in de Graften van 't Huis te
Brederode; in de Slooten by Utrecht; in moeras-
sige en laage landen omtrent Tjetjerk, Bergum
en Augultinisga in Friesland; in de Slootea en
Griften tusschen Deventer en Zwol; ook op ver-
scheide plaatsen in de Provintie Groningen en
Omlanden.
- Ficaria.* 465. *RANUNCULUS* foliis cordatis angulatis petio-
 latis, caule unifloro. *Sp.* 774. *n.* 9. *Gelr.* 319.
Jngr. 88. *Fris.* 241.
Chelidonia rotundifolia minor. *Baub. pin.* 309.
Comm. boll. 25.
Chelidonium minus. *Fuchsf. bist.* 866. *Dod. pempt.*
 49.
Oed. dan. t. 499.
Speen - kruid, Kleine Gouwe. Belg.
Haane - klootjes. *Arnhemensibus.*
 β. *Chelidonia rotundifolia minor, folio maculoso.*
Baub pin. 309.
 γ. *Chelidonia rotundifolia major.* *Baub. prodr.* 137.
 δ. *Chelidonium minus, flore pleno.* *Boerb. lugdb.* 1.
 p. 29.
Overvloedig op vochtige schaduwachtige plaatsen, in
de Bosschen, Hoven, en onder de Heggen.
Pharm. CHELIDONII MINORIS. rad. berb.
Varietati γ. Perianthium frequentissime pentaphyl-
lum, atque cauliculi ramosi. *BOERH.*
- sceleratus.* 466. *RANUNCULUS* foliis inferioribus palmatis:
 summis digitatis, fructibus oblongis. *Sp.* 776.
n. 15. *Gelr.* 320. *Fris.* 242.
Ranunculus palustris, apii folio lævis. *Baub. pin.*
 180. *Comm. boll.* 96.
Ranunculus sylvestris. *Dod. pempt.* 426.
Oed. dan. t. 570.

Wa-

Water - Haanevoet. Belg.

Feuk-kruid. Rusticis.

Overvloedig in Slooten, stilstaande Wateren, en
vochtige Wei-landen.

*In partibus nudis, quas attingit, pruritus concitat,
easque exulcerat.*

467. *RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis fulcatis, caule erecto multifloro, foliis compositis. Sp. 778. n. 25. Gelr 322.* *bulbosus.*

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda. *Baub. pin.* 179. *Comm. boll.* '95.

Ranunculus tuberosus. *Dod. pempt.* 431.

Oed. dan. t. 551.

St. *Antthonis Raapje.* Belg.

*In de Velden langs den Yssel, en op 't Bergje in de
groote Laan by den Haarlemmer-Hout.*

468. *RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis repens.*
fulcatis, stolonibus repentibus, foliis compo-
sitis. *Sp.* 779. *n.* 26. *Gerl.* 323. *Frif.* 243.

Ranunculus pratensis repens hirsutus. *Baub. pin.*
179. *Comm. boll.* 95.

Ranunculus hortensis. 1. *Dod. pempt.* 425.

Kruipend - Haanevoet of Haanepoot. Belg.

- β. *Ranunculus pratensis erectus dulcis. Baub. pin. 179.*

Boerb. lugdb. 1. p. 31.

- γ. *Ranunculus hortensis* inclinatus. *Baub. pin.* 179.

Boerb. lugdb. 1. p. 31.

Ranunculus repens, flore pleno. *Baub. hist.* 3.
p. 420.

In de Hoven en Velden op schaduwachtige plaatsen.

469. *RANUNCULUS* calycibus patulis, pedunculis *polyantho-*
fulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Sp. mus.*
779. n. 27.

Ranunculus polyanthemus simplex. *Lob. ic.* 666.

Boerb. lugdb. i. p. 31. n. 1c.

Ranunculus fylvestris. *Tabern. ic.* 42. *bist.* 117.

In vette Weiden in de Betuwe.

Facile confunditur cum sequente.

470. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis ^{acris} teretibus, foliis tripartito-multifidis: summis

150 POLYANDRIA POLYGYNIA.

- linearibus. *Sp.* 779. *n.* 28. *Gelr.* 324. *Jngr.* 89.
Frif. 244.
Ranunculus pratensis erectus acris. *Baub. pin.* 178.
Comm. boll. 95.
Ranunculus hortensis. 2. *Dod. pempt.* 426.
Veld - Haanevoet of *Haanepoot*, *Poter - bloem.*
Belg.
♀. Ranunculus pratensis erectus acris, in folii medio
maculatus. *Loerb. lugdb.* 1. *p.* 30.
γ. Ranunculus hortensis erectus, flore pleno. *Baub.*
pin. 179 *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 31.
Overvloedig in de Wei-landen. γ. te Zutphen,
buiten de Nieuwstads-poort.
- lanuginosus.* 471. *RANUNCULUS* calycibus patulis, pedunculis
teretibus, caule petiolisque hirsutis, foliis tri-
fidis lobatis crenatis holofericeis. *Sp.* 779. *n.* 9.
Ranunculus magnus valde hirsutus, flore luteo.
Baub. bist. 3. *p.* 417. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 51.
n. 8.
Oed. dan. t. 397.
† *Volgens BOERHAAVE.*
- arvensis.* 472. *RANUNCULUS* seminibus aculeatis, foliis su-
perioribus decompositis linearibus. *Sp.* 780. *n.*
31. *Gelr.* 321. *Frif.* 245.
Ranunculus arvensis echinatus. *Baub. pin.* 179.
Comm. boll. 95.
Ranunculus sylvestris. 3. *Dod. pempt.* 427.
Oed. dan. t. 219.
Akker - Haanevoet. *Belg.*
In de Zaai-landen en Koorn-akkers.
- muricatus.* 473. *RANUNCULUS* seminibus aculeatis; foliis sim-
plicibus lobatis obtusis glabris, caule diffuso.
Sp. 783. *n.* 32. *Frif.* 246.
Ranunculus palustris echinatus. *Baub. pin.* 180.
prodr. 95. *Baub. bist.* 3. *p.* 842.
In Friesland het meeste op de Kley in laagten, en
aan uitwateringen (MEESE.)
- parviflorus* 474. *RANUNCULUS* seminibus muricatis, caule
diffuso. *Sp.* 780. *n.* 33.
Ranunculus hirsutus annuus, flore minimo. *Raj.*
angl. 3. *p.* 248. *t.* 12. *f.* 1. *Boerb. lugdb.* 1. *p.*
31. *n.* 15. *Ra-*

POLYANDRIA POLYGYNIA. 151

Ranunculus arvensis annuus hirsutus, flore omnium minimo. *Morif. bist.* 2. p. 440. f. 4. t. 28. f. 21.

† *Volgens* BOERHAAVE.

475. *RANUNCULUS* foliis subrotundis trilobis inter-hederaceis. gerrimis, caule repente. *Sp.* 781. n. 37. *Gelr.* 325.

Ranunculus aquaticus hederaceus luteus. *Baub. pin.* 180. *Comm. boll.* 96. *Morif. bist.* 2. p. 441. f. 4. t. 29. f. 29. *Oed. dan. t.* 321.

In een Beekje aan de laage Sydel by Harderwyk; aan de Duinkant in stilstaande ondiepe Wateren; by den Aardenhout buiten Haarlem; in de Slooten by Groningen.

Corolla buic est alba, non lutea, ut *C. Baubini* synonymum dicitur.

476. *RANUNCULUS* foliis submersis capillaceis, aquatilis. emeris peltatis. *Sp.* 781. n. 38. *Fris.* 247.

α. *Ranunculus* foliis inferioribus capillaceis, superioribus peltatis. *Linn. lapp.* 234. *Gelr.* 326.

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, supremis reniformibus orbicularibus palmatis. *Hall. bist.* 1163.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo. *Baub. pin.* 180. *Comm. boll.* 96.

Ranunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 587. *Oed. dan. t.* 376.

β. *Ranunculus* foliis omnibus capillaceis circumscriptione rotundis. *Linn. b. Cliff.* 231. *Gelr.* 327.

Millefolium aquaticum cornutum majus. *Baub. pin.* 141.

Millefolium aquaticum cornutum. *Baub. prodr.* 72. *Baub. bist.* 3. p. 784. quoad iconem. *Comm. boll.* 76.

γ. *Ranunculus* caule fluitante, petiolis unifloris, foliis capillaribus, laciniis divergentibus. *Hall. bist.* 1162.

Ranunculus aquatilis omnino. *Baub. bist.* 3. p. 781.

Ranunculus trichophyllus aquaticus medio luteus. *Col. ecphr.* 1. p. 315. t. 316.

152 POLYANDRIA POLYGYNIA.

Millefolium aquaticum, foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

2. *Ranunculus* foliis omnibus capillaceis circumscriptione oblongis. *Roy. lugab.* 492. *Gelr.* 328.

Ranunculus caule fluitante, petiolis unifloris, foliis capillaceis longissimis, laciniis parallelis. *Hall. bist.* 1161.

Ranunculo f. *Polyanthemo* aquatili albo affine *Millefolium* maratriphyllum fluitans. *Baub. bist.* 3. p. 782.

Millefolium aquaticum, foliis foeniculi, ranunculi flore & capitulo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

a. Overvloedig in de Graften en Slooten om Harderwyk; aan de Duinkant in stilstaande ondiepe Wateren by den Aardenhout; en in de Slooten aan den Oosterweg te Haren en Hemmen buiten Groningen. β. Op veele plaatjen in de Vyvers. γ. In de Beetjes by Hoophuizen omtrent Harderwyk, en langs de Duinkant. δ. In den Yssel op verscheide plaatjen, en overvloedig in de Rivier 't Spaarne op den inham by 't Huis te Heemstede.

II. HALLERUS varietates has pro distinctis speciebus habet, sed Cels. LUDWIG (Epist. erud. ad Hall. vol. II. p. 165.) recte monet folia superiora subrotunda, si sub aquis immersa manent, capillacea fieri, si vero rapido flumine feruntur, ita elongari, ut peucedani foliis similia sint. *Millefolium aquaticum cornutum* *Baub.* bis occurrit in hoc *Essencho*, quippe quo ad descriptionem & iconem *Baub. prodr.* 73. t. 73. est bujus generis varietas. β. Quo ad descriptionem vero *Baub. bist.* est *Ceratophyllum demersum*.

C A L T H A.

477. *CALTHA*. Sp. 731. n. 1. *Gelr.* 329. *Fris.* 248. *Caltha palustris*, flore simplici. *Baub. pin.* 276. *Comm. boll.* 19.

Caltha palustris *Dad. pempt.* 598.

Roter - Moer, *Datter - Bloem*. Belg.

Kruine Pompe - Noemen. Groningans.

Veel

POLYANDRIA POLYGYNIA. 153

Veel in vochtige Wei-landen in de Betuwe, en omtrent Harderwyk, 's Hage, Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Leeuwaarden, Zwol; in de Bergermeer by Alkmaar; in 't Gorecht by Groningen.

Petalorum numerus in hac planta inconstans, frequentissime 5 adfunt, rarius 6 vel 7. rarissime 8.

C L A S S I S XIV.

D I D Y N A M I A.

G Y M N O S P E R M I A.

A J U G A.

- reptans.* 478. A J U G A glabra, stolonibus reptantibus. *Sp.* 785.
n. 4. *Gelr.* 330. *Fris.* 249.
 Contolida media pratenfis cærulea. *Baub.* *pin.* 260.
Comm. boll. 27.
 Bugula. *Dod. pempt.* 135.
 Zenegroen, Ingroen. Belg.
 Veel in de Wei-landen; in de pannen en laagten
 der Duinen; en ook by de Wegen.
 Pharm. BUGULÆ herb. flor.
 Variat interdum corollâ albâ & carnâ.

T E U C R I U M.

- Scordonia.* 479. T E U C R I U M. foliis cordatis ferratis petiolatis,
 racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Sp.*
 789. *n.* 18. *Gelr.*..
 Scordium alterum, five Salvia agrestis. *Baub.* *pin.*
 247. *Comm. boll.* 103.
 Salvia agrestis five Sphacelus. *Dod. pempt.* 291.
Oed. dan. t. 485.
 Wilde-Salie. Belg.
 Op zandige plaatsen omtrent Uilenpas, Arnhem,
 Billoen, Harderwyk, en elders in Gelderland;
 Overvloedig in de Duinen by 's Hage, Raaphorst,
 Ben-

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 155

Bennenbroek, Heemstede, Hillegom, Wyk op Zee, agter den Ardenhout en by Hartecamp buiten Haarlem; aan den Weg tusschen Lisse en de Leidsche-Vaart; ook omtrent Zwol, en aan den Berg by Amerongen in 't Sticht van Utrecht.
Pharm. SALVIÆ AGRESTIS herb.

480. TEUCRIUM foliis oblongis sessilibus dentato-Scordium.
serratis, floribus geminis axillaribus peduncu-
latis, caule diffuso. *Sp.* 790. n. 20.

Scordium. *Baub. pin.* 247. *Cam. epit.* 588. *Dod. pempt.* 126. *Comm. boll.* 103.

Oed. aan. t. 593.

Water-Look. Belg.

Aan de Slooten in 't Graaffschap Zutphen omtrent Zevenaar; en in de vochtige Duin-Valeyen tusschen de Sillik en 't Dorp Lisse.

Pharm. SCORDII herb.

481. TEUCRIUM foliis cuneiformi-ovatis incisif Chamædrye
crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus
procumbentibus subpilosis. *Sp.* 790. n. 22. *Frij.*
250.

Chamædrye major repens. *Baub. pin.* 248. *Dod. pempt.* 43. *Morif. bist.* 3. p. 422. f. 11. t. 22.
f. 11. *Boerb. lugdb.* 1. p. 182.

Gamander, Batbengel. Belg.

- β. Chamædrye minor repens. *Baub. pin.* 248. *Dod. pempt.* 43. *Comm. boll.* 24. *Morif. bist.* 3. p. 422.
f. 11. t. 22. f. 12.

In 't Haagse-Bosch, en in Friesland by Bergum, Heerenveen, Dragten, &c. op Heide-velden, en in sommige Bosschen.

Pharm. CHAMÆDRIOS herb.

H Y S S O P U S.

482. HYSSOPUS spicis secundis, foliis lanceolatis. *officinalis.*
Sp. 796. n. 1. *Gelr.* 335.

Hyssopus officinarum cærulea seu spicata. *Baub. pin.* 217.

Hyssopus vulgaris. *Dod. pempt.* 287.

Tzooop. Belg.

Te Harderwyk op de muur van 't Cboor der vervallen Broederen-Kerk, eneertyds op de muur van 't Huis

te

156 DIDYNAMIA GYMNOSPERMA.

te Bronkhorst in 't Graaffschap Zutphen.

Pharm. HYSSOPI herb.

Qui viderit binis illis in locis magna in copia e muris crescentem banc plantam, vix dubitaret eam esse veram Hyssopum Hebraeorum. Conf. Eph. Nat. Cur. Vol. 1. Obs. DXX. nisi obstaret observatio. Cl. FR. HASSELQUIST de Bryo truncatulo. Linn. Suec. 2. 1001.

N E P E T A.

- Cataria.* 483. NEPETA floribus spicatis: verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ser-ratis. *Sp.* 796. n. 1.
Mentha cataria vulgaris & major. *Baub. pin.* 220.
Comm. boll. 74.
Cataria herba. *Dod. pempt.* 99.
Oed. dan. t. 580.
Katte - kruid, Nipt. Belg.
In de Duinen by Overveen, en groeit ook van zelf in de Zaaï - landen en Hoven.
Pharm. NEPETÆ herb.

S I D E R I T I S.

- hirsuta.* 484. SIDERITIS foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, bracteis dentato-spinosis, caulibus hirsutis decumbentibus. *Sp.* 803. n. 10.
Sideritis hirsuta procumbens. *Baub. pin.* 233.
Comm. boll. 105.
Herba judaica. *Dod. pempt.* 93.
Glis - kruid. Belg.
By de Wegen en Paden.

M E N T H A.

- sylvestris.* 485. MENTHA. spicis oblongis tomentosis ferratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Sp.* 804. n. 1. *Gelr.* 341.
Mentha sylvestris folio longiore. *Baub. pin.* 227.
Comm. boll. 74. *Morif. list.* 3. p. 368. f. 11. t. 6. f. 6.
Oed. dan. t. 484.
Wilde Munte. Belg.
Aan de kanten der Zaaï - landen op veele plaatsen.

Pharm.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 157

Pharm. MENTHÆ SYLVESTRIS *herb.*

486. MENTHA spicis oblongis, foliis subrotundis *rotundifolia.*
 rugosis crenatis sessilibus: *Sp.* 805. *n.* 3.
 Mentha sylvestris, rotundiore folio. *Baub. pin.* 227.

Menthastrum, folio rugoso rotundiore, spontaneum, flore spicato odore gravi. *Baub. bist.* 3. p. 219.

In de laage vochtige pannen der Duinen buiten 's Hage
(Cel. SCHWENCKE.)

487. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis *aquatica.*
 ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus.
Sp. 805. *n.* 3. *Gelr.* 342. *Fris.* 251.

Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica major.
Baub. pin. 227. *Comm. boll.* 73. *Morif. bist.* 3. p. 370. *f.* 11. *t.* 7. *f.* 6.

Water - Munte, Bruin - beilig. Belg.

Aan de kanten der Slooten en Graften, en in vochtige Duin - Valeyen.

Pharm. MENTHÆ AQUATICÆ *herb.*

488. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis *arvensis.*
 cutis ferratis, staminibus corollam æquantibus.
Sp. 806. *n.* 9. *Gelr.* 343. *Fris.* 252.

Mentha palustris, folio oblongo. *C. B. Comm. boll.* 73.

Mentha arvensis verticillata hirsuta. *Baub. bist.* 3. p. 217. *Morif. bist.* 3. p. 369. *f.* 11. *t.* 7. *f.* 5.

Calamintha arvensis verticillata. *Baub. pin.* 229. *Oed. dan. t.* 512.

Veld - Munte. Belg.

Kruis en Munt. Groninganis.

Aan de Slooten by Uilenpas, Zwol, Campen; aan de Duinkant van Holland; in Friesland op de Kley en in de Wouden overvloedig aan de Wegen, en kanten van Koorn-landen, op dykjes en aan ruige Wallen, en aan Slooten; ook in de Koorn-landen en boven van 't Goreght buiten Groningen.

489. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis *Pulegium.*
 obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus re-

pen-

158 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

pentibus, staminibus corolla longioribus. *Sp.*
807. *n.* 12. *Gelr.* 344.

Pulegium latifolium. *Baub.* *pin.* 222.

Pulegium. *Fuchf. bist.* 199. *Dod. pempt.* 282.

Poley. Belg.

Op vochtige plaatsen aan de Waal by Wamel over Thiel; en in de Thielers-waard; omtrent den Yssel by Gorfel, Uilenpas, en elders in't Graafschap Zuiphen; ook by Salk in Overysfel.

Pharm. PULEGII LATIFOLII *berb.*

G L E C O M A.

hederacea. 490. GLECOMA foliis reniformibus crenatis. *Sp.* 807.
n. 1. *Gelr.* 338. *Jngr.* 92. *Frif.* 253.

Hedera terrestris vulgaris. *Baub.* *pin.* 306. *Comm.*
boll. 57. *Morif. bist.* 3. *p.* 409. *f.* 11. *t.* 21. *f.* 1.

Hondsdras, Aard-Veil, Onder-bave. Belg.

Kruip door den tuin. Hortulanis.

β. *Hedera terrestris minor & elegantior.* *Baub.* *pin.*
306. *Comm.* *boll.* 57.

Klein Hondsdras. Belg.

Overvloed g langs de wegen en paden. β. *Op vochtige gronden omtrent oude boomen.*

Pharm. HEDERÆ TERRESTRIS *berb.*

L A M I U M.

Oryza. 491. LAMIUM foliis cordatis inæqualiter arguteque
ferratis, corollis fauce inflata, calycibus colo-
ratis. *Sp.* 88. *n.* 1.

Lamium maximum sylvaticum alterum. *Baub.*
pin. 231.

Galeopsis maxima pannonica. *Clusf. bist.* 2. *p.* 35.
In de Salkers-waart in Overysfel.

Levigatum. 492. LAMIUM foliis cordatis rugosis, caule lævi,
calycibus glabris longitudine corollæ. *Sp.* 808. *n.* 3.

Lamium purpureum non foetens, folio oblongo.
Baub. *pin.* 231. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 157.

Galeopsis flore purpurascens majore, folio non maculato. *Baub. bist.* 3. *p.* 321.

† *Volgens BOERHAAVE.*

Album. 493. LAMIUM foliis cordatis acuminatis ferratis pe-
ti-

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 159

- tiolatis, verticillis vigintifloris. *Sp.* 809. n. 5.
Gelr. 307. *Frif.* 254.
Lamium album non foetens, folio oblongo. Baub.
pin. 251. *Comm. boll.* 63.
Urtica iners sive Lamium primum. Dod. pempt. 153.
Oed. dan. t. 594.
Doove Netelen, Hond's - Netelen. Belg.
Suiker - Netel. Buuranis.
Melk - bloem. Westfrisiis.
 β. *Lamium urticae folio, flore purpureo spicato.*
Comm. boll. 63.
By de Wegen en in de Hoven. β. op het Kraaijenest
langs den weg naar Heemstede, en om Utrecht.
Pharm. URTICAE MORTUAE herb. flor.
494. *LAMium foliis cordatis obtusis petiolatis. Sp. purpureum*
809. n. 6. Gelr. 346. *Jngr.* 93. *Frif.* 255.
Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo,
sive Galeopsis. dioscoridis. Baub. pin. 230.
Comm. boll. 62.
Urtica iners altera. Dod. pempt. 153.
Oed. dan. t. 523.
Stinkende Doove Netelen. Belg.
 ε. *Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo*
minus. Boerb. lugdb. i. p. 157.
 γ. *Lamium album foetidum, folio subrotundo. Baub.*
pin. 251. *Boerb. lugdb. i. p.* 157.
 δ. *Lamium album foetidum, folio subrotundo minus.*
pin. 251. *Boerb. lugdb. i. p.* 157.
By de Wegen, en in de Hoven.
495. *LAMium foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. Sp.* 809. n. 7. *Gelr.* 345. *Frif.* 256. *caule.*
Lamium, folio caulem ambiente, minus. Baub.
pin. 232. *Comm. boll.* 63.
Morsus gallinae, folio hederulae, alter. Lob. ic.
463.
Hoender - beet Belg.
 β. *Lamium, foliis caulem ambientibus, majus. Baub.*
pin. 232. *Boerb. lugdb. i. p.* 158.
In de Zaay - landen en Moesboven; veel by Arnhem.

G A L E O P S I S.

496. *GALEOPSIS internodiis caulinis aequalibus: Ladanum.*
 ver-

160 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

verticillis omnibus remotis, calycibus inermibus.
Sp. 810. n. 1. *Gelr.* 348. *Frisf.* 257.
Sideritis arvensis angustifolia rubra. Baub. pin. 232.
Ladanium segetum, flore rubro quorundam. Baub. bist. 3. p. 855.
Op de Akkers langs de Duinen, en in de Koorn- velden op verscheide plaatsen.

- Tarabiti.* 497. *GALEOPSIS* internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguïs, calycibus subpungentibus. *Sp.* 810 n. 2. *Gelr.* 349. *Frisf.* 258.
 β. *Cannabina* flore purpurascente. *Boerb. lugdb.* 1. p. 159.
Cannabis sylvestris quorundam urticæ inertæ affinis. Baub. bist. 3. p. 854.
Urtica aculeata, foliis ferratis. Baub. pin. 232. *Comm. boll.* 116.
 γ. *Cannabina* flore albo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 159.
 δ. *Galeopsis* corolla flava: labiò inferiore maculato. *Linn. lapp.* 193.
Cannabina flore magno luteo, labiis purpureis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 159.
Urtica aculeata, foliis ferratis altera. Baub. pin. 232. *Comm. boll.* 117.
Urtica mortua quarta. Dod. pempt. 153.
Geele Doove Netelen, Leeuwebekken. Groninganis. In de Koorn-landen. β. Buiten Haarlem, aan de Duinkant, en by Zwol. γ. & δ. veel by Utrecht, Harderwyk, Zwol, in 't Haagse-Bosch; in de Wouden in Friesland; aan de dykjes by Haren buiten Groningen; en elders.

- Galeobdolon.* 498. *GALEOPSIS* verticillis sexfloris: involucro tetraphyllo. *Sp.* 810. n. 3. *Gelr.* 354.
Galeopsis f. Urtica iners, flore luteo. Baub. bist. 3. p. 323. *Boerb. lugdb.* 1. p. 162.
Lamium folio oblongo luteum. Baub. pin. 231.
In de Boffchadien by Uilenpas, Zwol, in Friesland by Bergum; en in 't Haagse-Bosch.

S T A C H Y S.

- Sylvatica.* 499. *STACHYS* verticillis sexfloris, foliis cordatis
 pe-

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 161

petiolatis Sp. 811. n. 1. Gehr. 350. Frif. 259.
Lamium maximum sylvaticum foetidum. Baub.
pin. 231.

Urtica heraclea. Tabern. ic. 536.

In 't Bosch van Ouden-Aller op de Veluwe; in 't
Haagse-Bosch; in Bosch en aan ruige Wallen,
en aan de Wegen omtrent Dragten, Oudega en
Rotteval in Friesland; te Zwol op de Wal; in de
Salkerwaard; op den Dyk naar Paterwolde, by
de Mickelhorst, en elders buiten Groningen; en
op veele andere plaatsen in de Bosch en Heggen.

500. STACHYS verticillis subsexfloris, foliis linearibus lanceolatis semiamplexi caulibus sessilibus. Sp.

811. n. 2. Gehr. 351. Frif. 260.

Stachys palustris foetida. Baub. pin. 236.

Stachys aquatica. Tabern. ic. 577.

Aan de kanten der Slooten by 's Hage, Zandhorst;
op veele plaatsen in Friesland; aan de Griften
tusschen Deventer en Zwol; in 't Veenland by 't
Cluivings-bosch in 't Landschap Drenthe.

501. STACHYS verticillis sexfloris, foliis obtusis nudiusculis, corollis longitudine calycis, caule debili. Sp. 814. n. 11. (Gehr. 339.)

Sideritis alpine trixaginis folio. Baub. pin. 233.
prodr. 111.

Oed. dan. t. 587

6. Lamium paludosum belgicum, melissæ folio.

Herm. lugdb. 351. t. 353.

In een Koorn-land by Marquette; in 't Zand achter
den Kranenborgh, en in de Hoven by Zwol.

B A L L O T A.

502. BALLOTA foliis cordatis indivisis serratis, calycibus acuminatis. Sp. 814. n. 1. Gehr. 352.
Frif. 261.

Balloté f. Marrubium nigrum. Dod. pempt. 90.

Marrubium nigrum foetidum. Baub. pin. 230.

Comm. boll. 72.

Zwarte Mulrove, Stinkende Andoorn. Belg.

Veel by de wegen en op ruwe plaatsen omtrent Har-
derwyk, Muiderberg, 's Hage, Utrecht, Zwol;

162 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

in Friesland omtrent Sumeer, Bergum, Gorradyk, en elders.

- alba.* 503. *BALLOTA* foliis cordatis indivisis serratis, calycibus subtruncatis. *Sp.* 814 n. 2.
Ballote flore albo. *Tourn. inst.* 185. *Boerb. lugdb.* 1. p. 175
Ballote. *Cam. epit.* 572.
† Volgens BOERHAAVE.

M A R R U B I U M.

- vulgare.* 504. *MARRUBIUM* dentibus calycinis fetaceis uncinatis. *Sp.* 816. n. 5. *Gelr.* 353.
Marrubium album vulgare. *Baub. pin.* 230. *Comm. boll.* 72. *Morif. bist.* 3. p. 376. f. 11. t. 9. f. 1.
Malrove, Witte Andoorn. Belg.
Tusschen Maas en Waal over Tiel; op verscheide plaatsen buiten Zutphen, en in de Duinen; aan de Weg tusschen Rotterdam en Schiedam; en tusschen Deventer en Twello.
Pharm. MARRUBII herb.

L E O N U R U S.

- Cardiaca.* 505 *LEONURUS* foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Sp.* 817. n. 1. *Gelr.* 355.
Marrubium Cardiaca dictum. *Baub. pin.* 230. *Comm. boll.* 72. *Morif. bist.* 3. p. 378. f. 11. t. 9. f. 18.
Herts-ge-span. Belg.
Op Steenachtige ruwe plaatsen, en by de Wegen.

O R I G A N U M.

- vulgare.* 506. *ORIGANUM* spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Sp.* 824. n. 7. *Gelr.* 335.
Origanum sylvestre. *Baub. pin.* 223. *Dod. pempt.* 285.
Wilde Orego, Wilde Majolein. Belg.
Overvloedig tusschen Nymegen en Gend; tusschen Zutphen en Doesburg; by 't Dorp Voorst op de Veluwe; aan den Rhyndyk in de Betuwe; in de Duinen achter Zotgelyet; aan de Wegen om Wyk by

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 163 :

by Duurstede; in de Herkeloer- en Salker-
Wart; en elders.
Pharm. ORIGANI VULGARIS herb.

T H Y M U S.

507. **THYMUS** floribus capitatis; caulibus repenti- *Serpyllum.*
bus, foliis planis obtusis basi ciliatis. Sp. 825.
n. 1. *Gelr.* 332 *Fris.* 262.
Serpyllum vulgare minus. *Baub. pin.* 220. *Comm.*
boll. 105.
Serpyllum vulgare. *Dod. pempt.* 277.
Quendel, Wilde Thym. Belg.
f. Serpyllum vulgare; flore albo. *Tbarn. inst.* 197.
Op zandige dorre gronden en Hei-velden in 't Graaf-
schap Zutphen; op de Veluwe; te Wamel voer
Tiel; buiten 's Hage, Haarlem, Rhenen,
Zwol; in Friesland omtrent Bergum, Heeren-
veen, en andere Woud-plaatsen; buiten Gronin-
gen by Harender-Moolen, &c. &c. Op de Heide
by Elspeet, en in de Laan voor Uilenpas.
Pharm. SERPILLI herb.

508. **THYMUS** floribus verticillatis, pedunculis uni- *Acinos.*
floris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis
serratis. Sp. 826 n. 4. *Gelr.* 333. *Fris.* 263.
Clinopodium arvensis ocyimi facie. *Baub. pin.* 225.
Acinos multis *Baub. hist.* 3. p. 295.
Op zandige plaatsen omtrent den Ouden-Yssel in 't
Graafschap Zutphen; in de Duinen niet verre
van Westerhout, en by Overveen; in Friesland
op verscheide plaatsen op bezaaide en beplante gron-
den; in de Herkeloersteeg in Overysel.

M E L I S S A.

509. **MELISSA** pedunculis axillaribus dichotomis *Nepeta.*
folio longioribus, caule ascendente hirsuto.
Sp. 828. n. 4. *Gelr.* 337.
Calamintha pulegii odore. *Baub. pin.* 228 *Comm.*
boll. 19.
Pulegium sylvestre, sive Calamintha altera. *Dod.*
pempt. 98.
Wilde Poley. Belg.
Veel in braakleggende Koorn-velden by Uilenpas,
L 2 U.

164. DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA:

Utrecht, de Bilt, Zeist; in de Duinen buiten's Hage, en aan de Weg in 't groot Bentveld by Haarlem, en elders.

S C U T E L L A R I A.

galericulata 510. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Sp.* 835. *n.* 5. *Gelr.* 357. *Fris.* 264.

Lysimachia cærulea galericulata, vel *Gratiola cærulea*. *Baub. pin.* 246. *Comm. boll.* 71.

Lysimachia galericulata. *Dalech. bist.* 1060.

Glid-kruid. Belg.

β. *Cassida palustris vulgarior*, flore albo. *Tourn. inf.* 182. *Boerb. lugdb.* 1. p. 177.

By de wegen en paden, veel aan de Sypel by Harderwyk, en op Princen-Loo; in de Duin-valleyen achter Zorgvliet; in Friesland by Langweer en Orange-woud; aan de dykjes by Haren buiten Groningen.

P R U N E L L A.

vulgata 511. PRUNELLA foliis omnibus ovato-oblongis serratis petiolatis. *Sp.* 837. *n.* 1. *Gelr.* 356. *Fris.* 265.

Brunella major, folio non dissecto. *Baub. pin.* 260. *Comm. boll.* 17.

Brunella. *Dod. pempt.* 136.

Brinelle. Belg.

β. *Brunella major*, folio non dissecto, flore albo. *Baub. pin.* 261. *Boerb. lugdb.* 1. p. 169.

In de Velden en Wei-landen.

Pharm. BRUNELLE herb.

laciniata 512. PRUNELLA foliis ovato-oblongis petiolatis: supremis quatuor lanceolatis dentatis. *Sp.* 837. *n.* 2.

Brunella folio laciniato. *Baub. pin.* 261. *Comm. boll.* 17.

Brunella II non vulgaris. *Clus. bist.* 2. p. 43.

Bentveld-kruid. Vulgo.

In het Bent-veld buiten Haarlem.

ANGIOSPERMIA.

RHINANTHUS.

513. RHINANTHUS corollis labio superiore compresso brevior. *Sp.* 840. n. 3. *Gelr.* 361. *Fris.* 266. *Crista galli.*
 Pedicularis pratensis lutea, vel Crista galli. *Baub.* pin. 163. *Comm. boll.* 86. *Morif. bist.* 3. p. 426. f. 11. t. 23. f. 1.
 Gele Ratelen of Haane-Kammen. Belg.
 Horde. Rusticis.
 Overvloedig in de Hooi-landen.

EUPHRASIA.

514. EUPHRASIA foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Sp.* 841. n. 2. *Gelr.* 364. *Fris.* 267. *officinalis.*
 Euphrasia officinarum. *Baub.* pin. 233. *Comm. boll.* 36. *Morif. bist.* 3. p. 430. f. 11. t. 24. f. 1.
 Oogen-troost. Belg.
 β. Euphrasia ramosa pratensis, flore albo. *Boerb.* lugdb. 1. p. 236.
 Overvloedig op vochtige zandige plaatsen in de Tielwaard; in 't Graafschap Zutphen; op de Veluwe; in 't Haagse-bosch, en daaromtrent in de Duinen; te Heiloo buiten Alkmaar, by Haarlem, Utrecht; in Friesland in de Wouden en op de Kley omtrent Tjum, Spannum, &c. te Haren buiten Groningen; en elders.
 Pharm. EUPHRASIAE herb.

515. EUPHRASIA foliis linearibus: omnibus serratis. *Odontites.*
Sp. 841. n. 4. *Gelr.* 365. *Fris.* 268.
 Euphrasia pratensis rubra. *Baub.* pin. 234. *Comm. boll.* 36. *Morif. bist.* 3. p. 431. f. 11. t. 24. f. 10.
 Tweede Oogen-troost. Belg.
 Overvloedig op vochtige Zand-gronden aan de wegen en kanten van Koorn-landen by Uilenpaal, Langhuizen, Oldbroek, en elders in Gelderland;

266 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

op Staalduin buiten 's Hage; ook by Loosduinen, Monster, Haarlem, Utrecht, Franeker, Zwol, en elders.

M E L A M P Y R U M.

arvensis. 516. MELAMPYRUM spicis conicis laxis: bracteis dentato-setaceis coloratis. *Sp.* 842. *n.* 2. *Gelr.*

367.

Melampyrum purpurascens coma. *Baub. pin.* 224.

Comm. boll. 72.

Triticum vaccinum. *Dod. pempt.* 541.

Paards-bloemen. Belg.

Overvloedig in de Koorn-velden by Uilenpas, Steenderen, Bronkhorst, en elders in 't Graafschap Zutphen; ook by Thiel, Utrecht en Zwol.

pratensis. 517. MELAMPYRUM floribus secundis lateralibus; foliorum conjugationibus remotis, corollis clausis *Sp.* 843. *n.* 4. *Gelr.* 368. *Fris.* p. 87.

Melampyrum luteum latifolium. *Baub. pin.* 243.

Comm. boll. 73. *Morif. bist.* 3. p. 429. *f.* 11. *t.*

21. *f.* 3.

Geele Paards-bloemen. Belg.

Henge. Rusticis

Overvloedig in de Poffchen, en op schaduwachtige plaatjen in Gelderland, Utrecht, Friesland en Overysel; ook in 't Haagse-bosch.

Oves ex esu hujus pinguescere testantur Rustici.

L A T H R Œ A.

Squamaria. 518. LATHRŒA caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. *Sp.* 844. *n.* 4.

Orobanche, radice dentata, major. *Baub. pin.* 88.

Orobanche, radice dentata altius radicata, foliis

& floribus albo purpureis. *Mentz. pug.* t. 3. *f.*

3. *Morif. bist.* 3. p. 504. *f.* 12. *t.* 16. *f.* 14

In Delfland langs den Dyk tusschen Moniter en de Hey. (Cel. SCHWENCKE.)

P E D I C U L A R I S.

palustris. 519. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus cristatis calloso-punctatis, corollis labio obliquis.

Sp.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 167

Sp. 845. n. 1.
Pedicularis pratensis rubra elatior. *Raj. bist.* 700.
Pedicularis danica maxima. *Lob. illustr.* 147.
Oed. dan. t. 225.
Luis-kruid. Belg.
Op de Stads-weide by Harderwyk.

520. *PEDICULARIS* caule ramoso, calycibus oblongis angulatis laevibus, corollis labio cordato.
Sp. 845. n. 2. *Gelr.* 362. *Fris.* 269
Pedicularis pratensis purpurea. *Baub. pin.* 163.
Comm. boll. 86.
Fistularia. *Dod. pempt.* 556.
Roo de Raatelen, Pyp-kruid. Belg.
In vochtige zandige Wei-landen en Hei-velden op verscheide pluutsen; ook in de Veen-landen by Amsterveen.

A N T I R R H I N U M.

521. *ANTIRRHINUM* foliis cordatis quinquelobis alternis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 851. n. 1. *Gelr.* 358.
Cymbalaria. *Baub. pin.* 306. *Cam. epit.* 860.
Aan de Muuren te Nymegen, Bommel, Zutphen, Arnhem, Delft, Haarlem, Schoonhoven, Vianen, Utrecht, Ysselstein; aan de Grotten op Rosendaal buiten Arnhem; aan de ingewaterde Muuren der Bruggen by 's Hage; aan een brug te Neer-Langbroek, aan de Sluis te Vreeswyk, en aan de broeibakken op Hardenbroek in 't Sticht van Utrecht.
522. *ANTIRRHINUM* foliis ovatis alternis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 851. n. 3. *Gelr.* 604.
Elatine folio subrotundo. *Baub. pin.* 252. *Comm. boll.* 32.
Veronica femina. *Dod. pempt.* 42.
Te Elderik en Wehl by 't Graafschap Zutphen; in 't Haagse-Bosch; in de Bouwlanden by Haarlem, Utrecht en Zwol.

523. *ANTIRRHINUM* foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo diffuso. *Sp.* 852. n. 7. *Gelr.* 359.

168 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Antirrhinum arvense minus. *Baub. pin.* 212. *Comm. boll.* 11.

Antirrhinum tertium. *Cam. epit.* 922.

Oed. dan. t. 502.

Klein Veld. - *Orant.* Belg.

In de Koorn-landen en Hoven by Harderwyk, Velsen, Utrecht, Zwol, en elders.

Linaria. 524. *ANTIRRHINUM* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Sp.* 858. *n.* 33. *Gelr.* 360. *Fris.* 270.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Baub. pin.* 212. *Comm. boll.* 67.

Oxyris. *Fuchs. bist.* 543. *Cam. epit.* 930.

Vlas-kruid, Wild Vlas. Belg.

Overvloedig langs de Duinen, en op veele plaatsen langs de wegen.

Pharm. LINARIÆ herb.

Antirrhinum. 525. *ANTIRRHINUM* corollis ecaudatis, floribus subspicatis, calycibus corolla longioribus. *Sp.* 860. *n.* 36. *Gelr.* 603.

Antirrhinum arvense majus. *Baub. pin.* 212.

Antirrhinum sylvestre, Phyteuma. *Dod. pempt.* 182.

Orant, Knappers, Leeuwenbek, Kalfs-jruit. Belg.

By Keppel in 't Graafschap Zutphen, en op de Akkers langs de Duinen by s Hage.

S C R O P H U L A R I A.

nodosa. 526. *SCROPHULARIA* foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo. *Sp.* 854. *n.* 2. *Gelr.* 370. *Fris.* 271.

Scrophularia nodosa foetida. *Baub. pin.* 235.

Comm. boll. 103. *Morif. bist.* 2. *p.* 482. *f.* 5. *t.* 8. *f.* 3.

Scrophularia. *Cam. epit.* 136. *Dod. pempt.* 50.

Groot Speen-kruid. Belg.

Helm-kruid. *Quibusdam.*

Aan ruige wallen en wegen by Tiel, te Maurik in de Betuwe; te Zutphen op de Wal; by Wilp op de Veluwe; rondsom Arnhem; in 't Haagse-Bosch; in de Haarlemmer-Hout; omtrent het Orange-woud in Friesland; en elders.

Pharm.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 169

Pharm. SCROPHULARIÆ NODOSE f. FORTIDE
rad. herb.

527. SCROPHULARIA foliis cordatis obtusis petio-^{aquatica.}
latis decurrentibus, caule membranis angulato,
racemis terminalibus. Sp. 864. n. 3. Gelr. 626.
Frisf. 272.

Scrophularia aquatica major. Baub. pin. 235.
Comm. boll. 104.

Betonica aquatilis. Dod. pempt. 50.

Oed. dan. t. 507.

St. Anthonis-kruid. Beek-schuim, Water-Speen-
kruid, Water-Betonie Belg.

Aan de kanten van de Wei-steeg by Harderwyk;
aan de Slooten in de Tielerwaard; by Uilenpas
in 't Graaffschap Zutphen; by Overveen buiten
Haarlem; omtrent Kooten en Drogeham in
Friesland; in 't Haagse-Bosch; en op andere
vochtige plaatsen.

Pharm. BETONICÆ AQUATICÆ herb.

D I G I T A L I S.

528. DIGITALIS calycinis foliolis ovatis acutis, ^{purpurea.}
corollis obtusis: labio superiore integro. Sp.
866. n. 1. Gelr. 371.

Digitalis purpurea, folio aspero. Baub. pin. 243.

Digitalis purpurea. Dod. pempt. 168.

Oed. dan. t. 74.

Fingerboed-kruid. Belg.

In de Diergaarde van Billion, en aan den weg by
Middagten, Rhederoort, en elders tusschen
Arnhem en Dieren; te Lichtevoorde en Varfe-
veld in 't Graaffschap Zutphen; in een Bosch
tusschen 't Huis ter Heide en Bergum in Fries-
land.

L I M O S E L L A.

529. LIMOSELLA. Sp. 881. n. 1. Gelr. 627.

Plantaginella palustris. Baub. pin. 190. Comm. boll. ^{aquatica.}

89. Morisf. bist. 3 p. 605 f. 15. t. 2. f. 1.

Alfine palustris exigua, flosculis albis, foliis lan-
ceolatis plantaginellæ aquaticæ instar. Mentz.
pug. 2. t. 7. f. 6. Comm. boll. 8.

L 5

Plan-

370 DIBYNAMIA ANGIOSPERMTA

- Plantago aquatica minima.* *Clus. bist. 2. p. 110.*
Boerb. lugdb. 1. p. 45.
Spergula perpusilla, lanceolatis foliis. Loef. pruss.
261. 7. 81.
Oed. dan. 1. 69.
In de vochtige Valeyen op Vlieland, en buiten Haar-
lem; en in een vochtig Valeyje omtrent Veldwyk
buiten Harderwyk.

O R O B A N C H E.

- major.* 530. OROBANCHE caule simplicissimo pubescente,
 staminibus subexsertis. *Sp. 882. n. 2. Gêr. 368.*
Orobanche major garyophyllum olens. Baub. pin.
87. Comm. boll. 84.
Limodoron sive Orobanche. Dod. pempt. 552.
Brem-Raap, Smeer-kruid. Belg.
In de Zaaï-landen op de wortels van verscheiden ge-
wassen, veel by Hulfen buiten Nymegen; by
Uilenpas en Rhenen op de wortels van de Brem,
en in de Duinen buiten Haarlem en Alkmaar.
- ramosa.* 531. OROBANCHE caule ramoso, corollis quinque-
 fidis. *Sp. 882. n. 4. Gêr. 369.*
Orobanche ramosa. Baub. pin. 88. Comm. boll.
84.
Orobanche. Cam. epit. 311.
 β. Orobanché ramosa, floribus cæruleis. *Baub. pin.*
88. Boerb. lugdb. 1. p. 240.
 γ. Orobanche ramosa, floribus subalbidis. *Baub. pin.*
88. Boerb. lugdb. 1. p. 240.
In de Duinen tusschen de Holm, en by Heemstede.

CL A S S I S XV.

TETRADYNAMIA.

S I L I C U L O S A.



M Y A G R U M.

532. MYAGRUM filiculis biarticulatis monospermis, *perennans*,
foliis exteriorum sinuatis denticulatis. *Sp.* 893.
n. 1. (*Gelr.* 404.)
Rapistrum monospermum. *Baub. pin.* 95. *prodr.*
37. t. 37.
Aan de Zeekant by Harderwyk.

533. MYAGRUM filiculis obovatis pedunculatis poly-sativum.
spermis. *Sp.* 894. n. 6. *Gelr.* 372.
Myagrum sativum Baub. pin. 109.
Camelina f. Myagrion. Dod. pempt. 532.
Vlas-Dotter. Belg.
Vit en tuit. Vulgo.
Komt van zelf voort uit 't Zaad, onder 't Vlas; en
word veel gezaait in Twello by Deventer.

D R A B A.

534. DRABA scapis nudis, foliis subserratis. *Sp.* 890. *varna.*
n. 2. *Gelr.* 381. *Fris.* 273.
Bursa pastoris minor, loculo oblongo. Baub. pin.
108. Comm. boll. 18. *Morif. bist.* 2. p. 305. f. 3.
t. 20. f. 6.
Paronychia vulgaris. Dod. pempt. 112.

172 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

- Alysson vulgare, polygoni folio, caule nudo.
Tourn. inst. 217. *Boerb. lugdb.* 2. p. 4. n. 9.
Vroegeling. Belg.
 β. Alysson vulgare, polygoni folio, loculo rotundo.
Boerb. lugdb. 2. p. 4. n. 10.
 γ. Alysson vulgare, polygoni folio trifido. *Boerb.*
lugdb. 2. p. 4. n. 11.
Veel in de Duinen, en op dorre zandige plaatsen.

L E P I D I U M.

- patrum.* 535. LEPIDIUM foliis pinnatis integerrimis calyce minoribus. *Sp.* 899. n. 7.
 Nasturtium alpinum tenuissime divisum. *Baub. pin.* 105.
 Nasturtium pumilum vernal. *Baub. pin.* 105.
Boerb. lugdb. 2. p. 8.
 Cardamine pusilla saxatilis montana discoides. *Col. ecphr.* 1. p. 274. t. 272.
 † *Volgens BOERHAAVE.*
- anastatum.* 536. LEPIDIUM foliis ovato-lanceolatis integris serratis. *Sp.* 899. n. 11.
 Lepidium latifolium. *Baub. pin.* 97. *Comm. boll.* 65.
 Lepidium plinii. *Dod. pempt.* 716.
Oed. dan. t. 557.
Peper-kruid. Belg.
In sommige Moes-boven; in de Zee-Duinen by de Vuurbaak van Wyk op Zee; en omtrent de kanten van sommige Slooten by Haarlem.
- ruderals.* 537. LEPIDIUM floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. *Sp.* 900. n. 14. *Gelt.* 374. *Ingr.* 102. *Fris.* 274.
 Nasturtium sylvestre, osyridis folio. *Baub. pin.* 105. *Comm. boll.* 80. capsulis minimis. *Morif. bist.* 2. p. 301. f. 3. t. 19. f. 7.
Oed. dan. t. 184.
Klein Bezem-kruid. Belg.
Buiten Arnhem by de wegen; by Amsterdam aan de Dyken; in Friesland aan de Westkant van Stavoren dicht aan Zee, by Vulnis-boopen.

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 173:

T H L A S P I.

538. *THLASPI* filiculis orbiculatis, foliis oblongis *arvens.*
dentatis glabris.. *Sp.* 901. *n.* 2. *Gelr.* 378. *Fris.*

p. 87.

Thlaspi arvense, filiquis latis. *Baub. pin.* 105.

Comm. boll. 109.

Thlaspi latius. *Dod. pempt.* 712.

Boere - Kers, *Vissel - kruid.* Belg.

*In de Zaaï-landen en Moesboven; veel op den Haek
achter 's Gravzande.*

Pharm. THLASPIOS sem.

539. *THLASPI* filiculis subrotundis, foliis sagittatis *campestre.*
dentatis incanis. *Sp.* 902. *n.* 6. *Gelr.* 379.

Thlaspi arvense, vaccariæ folio incano, majus.

Baub. pin. 106. *Comm. boll.* 109.

Thlaspi latifolium. *Fuchf. bist.* 306.

Boere - Kers. Belg.

Tusschen Amersfoort en Nykerk, en by Zwol.

Pharm. THLASPIOS sem.

540. *THLASPI* filiculis obcordatis, foliis radicali- *Bursa pas-*
bus pinnatifidis. *Sp.* 903. *n.* 10. *Gelr.* 380. *Fris.*
275.

Bursa pastoris. *Dod. pempt.* 103.

Bursa pastoris major, folio sinuato. *Baub. pin.* 108.

Comm. boll. 18.

Tasjes - kruid, *Beursjes - kruid*, *Harders - Tasjes.*
Belg.

Moeders - Tasjes. *UltrajeQinis.*

- β. *Bursa pastoris major*, folio non sinuato. *Baub. pin.*
108. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 9.

- γ. *Bursa pastoris major*, folio sinuato eleganti instar
coronopi repentis. *Baub. pin.* 108. *Boerb. lugdb.*
2. *p.* 9.

- δ. *Bursa pastoris major media.* *Baub. pin.* 108. *Boerb.*
lugdb. 2. *p.* 9.

By de Wegen en in de Hoven.

Pharm. BURSÆ PASTORIS berb.

C O C H L E A R I A.

541. *COCHLEARIA* foliis radicalibus cordato-subro- *officinale.*
tundis, caulinis oblongis subsinuatis. *Sp.* 903.
n. 1.

174 TETRADYNAMIA SILICULOSA

n. 1. Gehr. 375. *Fris.* p. 87.

Cochlearia folio subrotundo. *Baub. pin.* 110. *Comm. boll.* 27.

Cochlearia. *Dod. pempt.* 591.

Oed. dan. t. 135.

Lepel-blad of *Lepel-kruid*. Belg.

β. Cochlearia major batavica erecta, folio oblongo.

Boerb. lugdb. 2. p. 10.

Overvloedig aan de Dyken van het Y buiten Amsterdam en by Sparendam; en aan de Hierder beek by Harderwyk; veel ten westen de Lemmer aan de Zee-dyk; en langs de Duinen aan de Zee-kant by Scheveningen.

Pharm. COCHLEARIA herb. sem.

anglica. 542. COCHLEARIA foliis omnibus ovato-lanceolatis. *Sp.* 903. n. 2.

Cochlearia folio sinuato. *Baub. pin.* 110. *Comm. boll.* 27.

Cochlearia britannica. *Dod. pempt.* 594.

Oed. dan. t. 329.

Engelsch Lepel-blad. Belg.

Buiten Amsterdam aan het Y buiten Harderwyk; en by Scheveningen by de voorige aan het Zee-strand.

denica. 543. COCHLEARIA foliis hastato-angulatis; omnibus detoidibus. *Sp.* 903. n. 3.

Cochlearia aremorica. *Tourn. inst.* 215.

Cochlearia hederæ folio. *Morif. bist.* 2. p. 308. f. 3. t. 20. f. 3. *Boerb. lugdb.* 2. p. 10.

Thlaspi hederaceum. *Lob. ic.* 615.

Oed. dan. t. 100.

† Volgens BOERHAAVE.

Coronopus. 544. COCHLEARIA foliis pinnatifidis, caule depresso. *Sp.* 904. n. 5. *Fris.* 276.

Ambrosia campestris repens. *Baub. pin.* 138.

Cornu cervi alterum repens. *Dod. pempt.* 110.

Oed. dan. t. 110.

Kruipend Harts-boorn, Zaynen-Kers, Varkens-Kers. Belg.

Overvloedig eben buiten Franeker aan den Leeuwaarder Trekweg, en elders aan de wegen.

Pharm. CORONOPUS SYLVESTRIS herb.

TETRADYNAMIA SILICULOSA: 171

545. *COCHLEARIA* foliis radicalibus lanceolatis cre- *Armoracia*
natis, caulinis incis. *Sp.* 904. n. 6 *Gelr.* 376.
Raphanus rusticus. *Baub.* pin. 96. *Comm. boll.* 97.
Morif. bist. 2. p. 237. f. 3. t. 7. f. 2.
Meer-Edik, Peper-Wortel, Meer-Radys. Belg.
Op 't Bouwland by Uilenpas.
Pharm. RAPHANI RUSTICANI rad.

I B E R I S.

546. *IBERIS* herbacea, foliis sinuatis, caule nudo *nudicaulis*.
simplici. *Sp.* 907. n. 12. *Gelr.* 377. *Fris.* 277.
Bursa pastoris minor, foliis incis. *Baub.* pin. 108.
Comm. boll. 18.
Bursa pastoris minor. *Dod. pempt.* 103.
Oed. dan. t. 323.
Klein Tasjes-kruid. Belg.
In de Duinen, en op oude muuren en dorre steenach-
tige plaatzen, veel buiten Harderwyk by s' Hee-
ren-Loo; buiten Haarlem op den weg naar Sparen-
dam; buiten Alkmaar op de booge landen en krof-
ten naar Heiloo; in Friesland aan de dykjes en
wegen by Balk, Bergum en 't Heerenveen.

S I L I Q U O S A.

C A R D A M I N E.

547. *CARDAMINE* foliis pinnatis incis. stipulatis; *impatiens*.
floribus apetalis. *Sp.* 914. n. 9.
Cardamine annua, exiguo flore. *Tourn. inst.* 224.
Boerb. lugdb. 2. p. 17.
Sisymbrii cardamines species quædam insipida.
Baub. bist. 2. p. 886
Sisymbrium montanum tenuifolium, flore musco-
so purpurascente. *Barr. rar. t.* 155.
Sium impatiens. *Alp. exot.* 331.
Nasturtium minimum annuum, flore albo. *Morif.*
bist. 2. p. 221. f. 3. t. 4. f. 1.
† *Volgens BOERHAAVE.*

548. *CARDAMINE* foliis pinnatis extipulatis, foli- *parviflora*.
olis

176 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

- olis lanceolatis obtusis, floribus corollatis. *Sp.* 914. n. 10.
Cardamine pratensis, parvo flore. *Tourn. inst.* 224. *Boerb. lugdb.* 2. p. 17. n. 4.
Nasturtium pratense, parvo flore. *Baub. pin.* 104. *prodr.* 14.
In de Duinen op verscheide plaatsen.
- hirsuta.* 549. *CARDAMINE* foliis pinnatis, floribus tetrandris. *Sp.* 915. n. 12. *Gelr.* 628.
Sisymbrium cardamine hirsutum minus, flore albo. *Baub. bist.* 2. p. 888.
Nasturtium aquaticum minus. *Baub. pin.* 154.
In een Tuin aan de oude Touwbaan by Harderwyk, en te Byfel by Mulmer tusschen Harderwyk en Elburg; in de Duinen by 's Hage; in de Busschen van Zandhorst; in den Haarlemmer-Hout; en langs de wegen op zommige plaatsen.
- pratensis.* 550. *CARDAMINE* foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. *Sp.* 915. n. 13. *Gelr.* 385. *Jngr.* 104. *Fris.* 278.
Nasturtium pratense, magno flore. *Baub. pin.* 104. *Comm. boll.* 79.
Flos cuculi. *Dod. pempt.* 592.
Koekoeks-bloem, Water-Vioelen, Klein Water-Kers. Belg. Kievits-bloem. Ultrajectinis. Pinxter-bloem. Frisiis.
- β. *Cardamine pratensis*, magno flore albo. *Tourn. inst.* 224. *Boerb. lugdb.* 2. p. 16.
 γ. *Cardamine pratensis*, magno flore pleno. *Tourn. inst.* 224. *Boerb. lugdb.* 2. p. 16.
Veel in vechtige Wei- en Hooi-landen, en langs de Slooten.
- amara.* 551. *CARDAMINE* foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *Sp.* 915. n. 14. *Jngr.* 104. *Fris.* 279.
Nasturtium aquaticum majus & amarum. *Baub. pin.* 104. *prodr.* 45.
Nasturtium Cardamine seu Nasturtium aquaticum flore majori elatius. *Baub. bist.* 2. p. 885.
In de Slooten te Hullen by Nymegen; omtrent Tjetjerk by de Hoffstede Hanenburg in Friesland; te Mastebroek in Overysel; en elders.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 177

S I S Y M B R I U M.

552. *SISYMBRIUM* filiquis declinatis, foliis pinnatis: *Nasturtium*
foliolis subcordatis. *Sp.* 916. *n.* 1. *Fris.* 280.
Gelr. 398.

Sisymbria Cardamine. *Fuchf. bist.* 723.

Nasturtium aquaticum lupinum. *Baub. pin.* 104.

Comm. boll. 80.

Water-Kers. Belg.

*Veel in de Slooten by Harderwyk en agter Ryswyk
in de Betuwe; bier en daar omtrent Tiel; om
Haarlem, en langs de Duinkant; by Holten in
Overysfel; in de laage Landen by Utrecht,
Wyk by Duurstede, en Zwol; in veele Slooten
in Friesland; en in 't Gorecht buiten Groningen.*

Pharm. NASTURTII AQUATICI herb.

553. *SISYMBRIUM* filiquis declinatis oblongo-ova- *sylyvestra-*
tis, foliolis lanceolatis ferratis. *Sp.* 916. *n.* 4.
Gelr. 399.

Eruca palustris, nasturtii folio, filiqua oblonga.

Baub. pin. 98. *Comm. boll.* 35.

Eruca sylvestris. *Fuchf. bist.* 263.

Water-Raket. Belg.

*Veel op vochtige plaatsen in Hoorn in Overysfel;
by Uilenpas; en elders; ook in de Moes-boven.*

554. *SISYMBRIUM* filiquis declinatis oblongo-ova- *amphibium-*
tis, foliolis pinnatifidis ferratis. *Sp.* 917. *n.* 5.
Ingr. 105. *Fris.* 281.

α. *Sisymbrium* foliis infimis capillaceis, summis pin- *palustre.*
natifidis. *Linn. b. Cliff.* 337. *Gelr.* 632.

*Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias
divisis. Baub. pin.* 97. *prodr.* 38. *t.* 38. *Comm.*
boll. 97.

Wilde Water-Radys. Belg.

β. *Sisymbrium* foliis simplicibus dentatis ferratis. *aquaticus.*
Linn. b. Cliff. 336. *Gelr.* 631.

Raphanus aquaticus alter. Baub. prodr. 38. *t.* 38.

Veel aan de kanten der Slooten, en in dezelve.

555. *SISYMBRIUM* foliis integerrimis: infimis tripin- *tenuifolium*
natifidis; supremis integris. *Sp.* 719. *n.* 6.

Sinapi erucæ folio. Baub. pin. 99. *Comm. boll.* 106

Eruca tenuifolia perennis. Baub. bist. 2. *p.* 861.

M

Wild

178 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

Wild Mostaart - zaad. Belg.

Veel aan de Dyken by Amsterdam, en by de Wegen om Utrecht.

- Sophia.* 556. *SISYMBRIUM* petalis calyce minoribus, foliis decomposito - pinnatis. *Sp.* 920. *n.* 18. *Gelr.* 403. *Fris.* 282.
Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. Baub. pin. 105. *Comm. boll.* 80.
Sophia chirurgorum. Lob. ic. 738.
Oed. dan. t. 528.
Vuur - kruid, Sophie - kruid, Fie - kruid. Belg.
 β. *Nasturtium sylvestre tenuissime divisum, folio latiore. Baub. pin.* 105.
Aan de Dyken, by de Wegen, op Kerkboven; veel aan de Duinkant buiten Haarlem.
Pharm. SOPHIE herb. sem.

- Iris.* 557. *SISYMBRIUM* foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, siliquis erectis. *Sp.* 921. *n.* 21.
Erysimum alterum silquis erucæ. Baub. pin. 101.
Boerb. lugdb. 2. p. 14.
Erysimum latifolium majus glabrum. Morif. bist. 2. *p.* 218. *f.* 3. *t.* 3. *f.* 3.
Iris lævis apulus erucæ folio. Col. ecpbr. 1. *p.* 264. *t.* 265.
Buiten 's Hage in 't Bosch op den weg naar Scheveningen. (Cel. SCHWENCKE.) Veel by en in 't Zee - dorp ter Heide. (Cel. van ROIJEN.)

E R Y S I M U M.

- officinale.* 558. *ERYSIMUM* siliquis spicæ adpressis, foliis runcinatis. *Sp.* 922. *n.* 1. *Gelr.* 392. *Fris.* 283.
Erysimum vulgare. Baub. pin. 100. *Comm. boll.* 35. *Morif. bist.* 2. *p.* 218. *f.* 3. *t.* 3. *f.* 1.
Oed. dan. t. 560.
Steen - Raket. Belg.
Veel op ruwe steenachtige plaatsen, en by de wegen.
Pharm. ERYSIMI herb.
- Barbarea.* 559. *ERYSIMUM* foliis lyratis: extimo subrotundo. *Sp.* 922. *n.* 2. *Gelr.* 395. *Ingr.* 106.
Eruca lutea latifolia sive Barbarea. Baub. pin. 98.
Barbarea. Dod. pempt. 712.

Win-

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 179

Winter-Kers. Belg.
Aan de Reeken by Harderwyk.

560. *ERYSIMUM foliis cordatis. Sp. 922. n. 3. Gelr. Allaria.*

393. *Fris. 284.*
Alliaria. Baub. pin. 110. Fuchsf. bist. 104. Cam.
epit. 589. Comm. boll. 5.
Look zonder Look. Belg.

*Overvloedig omtrent Tiel; aan de Wallen te Zutphen;
 en de Wal achter 's Heeren-Doelen te Arnhem;
 aan de Hoven by Harderwyk; buiten 's Hage op den
 weg naar Scheyeningen; aan ruige wallen by
 Beverwyk, Bredénrode, Bloemendaal; in de
 Alkmaarder-hout; aan de Wegen by Utrecht,
 Franeker, Zwol; aan de Oostzyde van de Heere-
 weg dicht by Haren buiten Groningen, en elders.*
Pharm. ALLIARIÆ herb.

561. *ERYSIMUM foliis lanceolatis integerrimis, sili-* *cheiranthoides.*
quis patulis. Sp. 923. n. 5. Gelr. 394.

Myagrum siliqua longa. Baub. pin. 109. Comm.
boll. 78.

Camelina, Myagrum alterum thlaspi effigie. Lob.
ic. 225.

Groote Wilde Kers. Belg.
In de Moes-boven en Bouw-landen.

C H E I R A N T H U S.

562. *CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis glabris, Cheiri.*
ramis angulatis, caule fruticoso. Sp. 924. n. 2.

Gelr. 382.
Leucojum luteum vulgare. Baub. pin. 202. Comm.
boll. 65.

Leucojum luteum. Dod. pempt. 160.
Muur-bloemen, Steen-Violieren. Belg.

β. *Leucojum, pleno flore, minus. Baub. pin. 202.*
Aan oude muuren op veele plaatsen. β. Op 't Cboor
van de vervallen Broederen-Kerk te Harderwyk.
Pharm. CHEIRI flor.

A R A B I S.

563. *ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis shallana.*
Sp. 929. n. 3. Gelr. 391.

M 2

Bur-

180 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

- Bursæ pastoris similis siliquosa major, seu majoribus foliis. *Baub. pin. 108. Comm. boll. 19.*
 β. Bursæ pastoris similis siliquosa minor, seu minoribus foliis. *Baub. pin. 108. Comm. boll. 19.*
Pilosella siliquosa minor. Tbal. berc. 84. t. 7. f. D.

Overvloedig in zandige Moes - boven; en op zommige plaatsen in de Duinen.

T U R R I T I S.

- glabra.* 564. TURRITIS foliis radicalibus dentatis hispidis; caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Sp. 930. n. 1. Fris. 285. Gelr. 396.*
Brassica sylvestris, foliis circa radicem cichoraceis. Baub. pin. 112.
Brassica sylvestris, foliis circa radicem cichoraceis asperis, caulibus autem adhærentibus planis seu glabris. Morif. bist. 2. p. 210. f. 3. t. 2. f. 22.
In de Salker - Waard; in een donker Boschje omtrent Bontekoe in Friesland; en hier en daar op oude vervalle muuren in de schaduw.

- hirsuta.* 565. TURRITIS foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. *Sp. 930 n. 2. Gelr 397.*
Erysimo similis hirsuta, non laciniata, alba. Baub. pin. 101. prodr. 42. t. 42.
Brassica sylvestris hispida non ramosa, C. B. Comm. boll. 17.
Turren - kruid. Belg.
Op oude Muuren te Harderwyk, Utrecht, Wyk by Duurstede.

B R A S S I C A.

- campestris.* 566. BRASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus. *Sp. 931. n. 2. Gelr. 388. Fris. 286.*
Brassica campestris perfoliata, flore albo. Baub. pin. 112.
Brassica campestris perfoliata, flore luteo. Comm. boll. 17. Loef. pruss. 29.
Oed. dan. t. 550.
Wilde Kool met Bladeren van Deurwas. Belg.
By Amsterdam, Haarlem, Alkmaar; in Friesland
in

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 181

in de Wouden; in Overysfel by Salk aan de wegen en dyken; ook van zelf in de Moers- boven en Bouw- landen.

Corolla buic semper lutea, non alba.

567. BRASSICA radice caulescente fusiformi. Sp. 931. *Napus.*

n. 3.

Napus sylvestris. Baub. pin. 95. Comm. boll. 79.

Napus seu *Bunias sylvestris* flore luteo. Lob. ic.

200. Cam. epit. 220.

Steek- Raapen. Belg.

Graveelzaad. Quibusdam.

By de Akkens en wegen in de Betuwe, en Noord-Holland.

Pharm. *NAPI* sem. Oleum, quod Raap- Olynostribus audit.

568. BRASSICA radice caulescente orbiculari depressa *Rapa.*
carnosa. Sp. 931. n. 4. Gelr. 387.

Rapa sylvestris. Raf. bist. 800.

Wilde Raapen of Knollen. Belg.

Ruben. Transylvanis

Aan de wegen by Heemstede en elders.

Pharm. *RAPÆ* rad.

569. BRASSICA foliis runcinatis, caule hispido, filii- *Erucastrum*
quis lævibus. Sp. 932. n. 7. Gelr. 402.

Eruca sylvestris major lutea, caule aspero. Baub.

pin. 98. Comm. boll. 35.

Eruca sylvestris. Dod. pempt. 708.

Wilde Raket. Belg.

Op Steenachtige plaatsen, en aan de Muuren te Hattem, 's Hage, Utrecht, Wyk by Duurstede, Zwol, Campen, en elders.

S I N A P I S.

570. SINAPIS siliquis multangulis toroso, turgidis *arvensis.*
lævibus rostro ancipiti longioribus. Sp. 933.

n. 1. Gelr. 390. Fris. 288.

Rapistrum flore luteo. Baub. pin. 95. Comm. boll. 97.

Rapistrum. Dod. pempt. 675.

Herik. Belg.

Krodde. Frisii.

Overvloedig in de Bouw- landen en by de wegen.

182 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

- alba.* 571. *SINAPIS* filiquis hispidis: rostro obliquo longissimo ensiformi. *Sp.* 933. *n.* 2.
Sinapi album, filiqua hirsuta, semine albo. *Baub. bist.* 2. *p.* 856.
Sinapi hortense semine albo. *Baub. pin.* 99. *Comm. boll.* 105.
Sinapi fativum alterum. *Dod. pempt.* 707.
Witte Mostaart. Belg.
In de Akkers op veele plaatsen, voornaamlyk in Noord-Holland.
Pharm. SINAPI ALBI sem.
- nigra.* 572. *SINAPIS* filiquis glabris racemo appressis. *Sp.* 933. *n.* 3. *Gelr.* 389.
Sinapi rapi folio. *Baub. pin.* 99. *Comm. boll.* 105.
Sinapi fativum prius. *Dod. pempt.* 706.
Mostaart. Belg.
Als vooren.
Pharm. SINAPI NIGRI sem.

R A P H A N U S.

- Raphanistrum.* 573. *RAPHANUS* filiquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Sp.* 935. *n.* 2. *Fris.* 289. *Linn. amæn. acad. vol. VI. p.* 448. *t.* 451.
Raphanistrum segetum, flore luteo vel pallido. *Keik. Rusticis.*
In de Bouw-landen op zeer veele plaatsen.

B U N I A S.

- Cakile.* 574. *BUNIAS* filiculis ovatis lævibus ancipitibus. *Sp.* 936. *n.* 4. *Gelr.* 384. *Fris.* 290.
Eruca maritima latifolia italica, filiqua hastæ cuspidi simili. *Baub. pin.* 99. *Comm. boll.* 35.
Cakile serapionis. *Lob. ic.* 223.
Zee-Raket. Belg.
Aan 't Strand by Scheveningen; langs 't Zee- en Maasstrand agter 's Gravezande; in de Zee-Duinen by Wyk op Zee; aan het bängen der Duinen by Zandvoort; en elders aan de Zeekant van Holland; ook aan 't Strand buiten Stavoren, en aan de voet van 't Roode Klif.

C L A S S I S XVI.

M O N A D E L P H I A

D E C A N D R I A.

G E R A N I U M.

575. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus *cicutarium* pentandris, foliis pinnatis incisfis obtusis, caule ramoso. *Sp.* 951. n. 26. *Gelr.* 407. *Fris.* 291.

Geranium, cicutæ folio, minus & supinum. *Baub.* pin. 319. *Comm. boll.* 44.

Geranium septimum five gruinum. *Dad. pempt.* 64. *Oijevaars-bek*, *Kraan-bals.* Belg.

β. Geranium, cicutæ folio, minus & supinum, flore albo. *Baub.* pin. 319. *Comm. boll.* 44.

Overvloedig in de Duinen van Holland; en in de Bouw-landen, en by de wegen op veele plaatsen. β. In de Haarlemmer-Hout.

576. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus *moschatum* pentandris, foliis pinnatis incisfis, cotyledonibus pinnatifidis. *Sp.* 951. n. 27.

Geranium cicutæ folio, moschatum. *Baub.* pin. 319.

Geranium supinum. *Dad. pempt.* 63.

β. Geranium, cicutæ folio, inodorum. *Baub.* pin. 319. *Roerb. lugdb.* 1. p. 266.

In de Duinen by 's Hage, en aan de wallen der Bouw-landen agter den Kranenborg buiten Zwol.

577. GERANIUM pedunculis solitariis oppositifoliis, *phaeum*

184 MONADELPHIA DECANDRIA.

calycibus subaristatis, caule erecto, petalis undulatis. *Sp.* 953. *n.* 37.

Geranium montanum fuscum. Baub. pin. 318.

Geranium phæum seu fuscum, petalis rectis seu planis. Morif. bist. 2. p. 515. *f.* 3. *t.* 16. *f.* 18.

In 't Bosch van Zuilen by Utrecht, onder opgaande boomen over de poort van het Kasteel tusschen het Geranium Robertianum, Erythrum Alkaria, en andere gemeene kruiden. (Nob. D. FABRICIUS SIX.)

Singulare est, plantam alpinam hic spontaneam esse, quamvis notum sit plantas alpinas extra alpes jolo humido delectari.

robertia- 578. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pilo-
nuni. fis decemangulatis. *Sp.* 955. *n.* 45. *Gelr.* 406. *Fris.* 292.

Geranium robertianum primum. Baub. pin. 319. *Comm. boll.* 44.

Geranium robertianum. Dod. pempt. 62.

Robberts - kruid, Roode Oijevaars - bek. Belg.

Op oude Muuren, Boomen, Steenachtige gronden, in Bosschen, Heggen, Wildernissen; in 't Haagse-Bosch en in de Haarlemmer-Hout.

Pharm. GERANII ROBERTIANI herb.

Corolla plerumque rubro-purpurea, interdum alba.

molla. 579. GERANIUM pedunculis bifloris, foliisque floralibus alternis, petalis bifidis, calycibus muticis, caule erectiusculo. *Sp.* 955. *n.* 48. *Fris.* 293.

Geranium columbinum villosum, petalis bifidis purpureis. Vaill. par. 79. *t.* 15. *f.* 3.

Langs de Wegen by 's Hage, en veele andere plaatsen; in de Zaai-landen en aan de ruige Wallen buiten Franeker, en elders; menigvuldig aan de dykjes langs de Heereweg buiten Groningen.

affatum. 580. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinque-partito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villosis. *Sp.* 956. *n.* 49.

Geranium batrachiodes, Collum gruis germanorum. Baub. pin. 319.

Geranium columbinum majus, foliis imis longis adusque pediculum divis. Morif. bist. 2. p. 511. *f.* 5.

MONADELPHIA DECANDRIA. 185

f. 5. t. 3. f. 3. Vail. par. t. 15. f. 2. optima.
Zeer veel tegens de Kaal-dyk van de Meerburger-
Watering buiten Leiden. (Cel. D. van ROYEN.)
In de Wei-landen by 't Huis te Marquette, en
de Hofstede Vegtstroom niet verre van Maarssen.
(Nob. D. FABRICIUS SIX.)

581. GERANIUM pedunculis bifloris folio longiori-^{columb-}
 bus, foliis quinquepartito-multifidis, arillis^{num.}
 glabris, calycibus aristatis. *Sp. 956. n. 51. Fris.*
294.

Geranium columbinum, foliis dissectis; pediculis
florum longissimis. Vail. par. 79. t. 15. f. 4.
Op ruwe plaatsen by Haarlem, Franeker, en elders.

582. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis subin-^{rotundifo-}
 tegris longitudine calycis, caule prostrato, fo-^{lium.}
 liis reniformibus incis. *Sp. 957. n. 53. Gehr.*
405. Fris. 295.

Geranium folio malvæ rotundo. Baub. pin. 318.
Comm. boll. 44.

Pes columbinus. Dod. pempt. 61.
Duive-Poot. Belg.
By de wegen op zandige plaatsen.

P O L Y A N D R I A.

A L T H Œ A.

583. ALTHŒA foliis simplicibus tomentosis. *Sp. 966. officinalis.*
n. 1. Gehr. 410.

Althæa dioscoridis & plinii. Baub. pin. 315. Comm.
boll. 8.

Althæa, Ibisus. Dod. pempt. 655.
Oed. dan. t. 530.

Heems-wortel. Belg.

- β. Althæa folio rotundiori, aut minus acuminato.
Boerb. lugdb. 1. p. 269.

In Gelderland by Doornspyk, Oen, Westervoor-
de, Lathum, &c. aan de dyken van Maas en
Waal; in Zuid-Holland by 's Gravezande langs
den binnendyk; in Noord-Holland by Alkmaar

186 MONADELPHIA POLYANDRIA.

in de Huiger-Waart, tusschen Koedyk en St. Pancras; aan de Alkmaarder-vaart; aan den dyk by Schermerhorn; aan den Zaan over Knolendam; op verscheide plaatsen by Enkhuysen; overvloedig in Waterland langs het Y kant; ook in Overysfel by Zwol, Campen, en elders.
Pharm. ALTHÆE rad. herb. flor. sem. far.

M A L V A.

- rotundifolia.* 584. MALVA caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. Sp. 969. n. 11. Gelr. 409. Frgr. 110. Frisf. 296.
Malva sylvestris, folio subrotundo. Baub. pin. 314. Comm. boll. 71.
Malva sylvestris pumila. Fuchf. hist. 508. Dod. pempt. 653.
Kleine Maluwe of Kaasjes-kruid. Belg.
Aan de Wegen en Dyken.
- sylvestris.* 585. MALVA caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. Sp. 969. n. 13. Gelr. 408. Frisf. 297.
Malva sylvestris, folio sinuato. Baub. pin. 314. Comm. boll. 71.
Malva sylvestris procerior. Dod. pempt. 653.
Maluwe, Kaasjes-kruid. Belg.
Op ruwe ongebouwde en steenachtige plaatsen.
Pharm. MALVÆ rad. herb. flor. sem.

C L A S S I S XVII.

D I A D E L P H I A.

H E X A N D R I A.

F U M A R I A.

586. FUMARIA caule simplici, bracteis longitudine *bulbosa*.
 florum. *Sp.* 983. n. 3. *Gelr.* 411.

Fumaria bulbosa radice non cava minor. *Baub.*
pin. 144. *Comm. boll.* 39.

Radix cava minor *Dod. pempt.* 327.

Boontjes - Hôlwortel. Belg.

Vogeltjes. Vulgo.

In de Boschadien by Deutecom en Enghuisen in 't
Graafschap Zutphen; by Zeddam in 't Graafschap
's Heerenberg; in 't Haagse-Bosch; en in de
Haarlemmer- en Alkmaarder-Hout.

Pharm. ARISTOLOCHIE CAVÆ rad.

587. FUMARIA pericarpilis monospermis racemosis, *officinalis*.
 caule diffuso. *Sp.* 984. n. 7. *Gelr.* 412. *Fris.*
 298.

Fumaria officinarum & dioscoridis. *Baub. pin.* 143.
Comm. boll. 39.

Fumaria. *Dod. pempt.* 59.

Duiwe-Kervel, Aard-Rook, Gryscorn. Belg.

Koe-gras. Mosa - Trajectinis.

β. Fumaria officinarum, foliis cæsiis, flore dilute
 rubello. *Boerb. lugdb.* 1. p. 308.

In de Zaai-landen en Moersbeven.

Pharm.

188 DIADELPHIA HEXANDRIA.

Pharm. FUMARIÆ herb. sem.

- spicata.* 588. FUMARIA pericarpis monospermis spicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *Sp.* 985. n. 8. Fumaria minor tenuifolia. *Baub. pin.* 143. Fumaria minor tenuifolia præcox, semine lini. *Morif. bist.* 2. p. 262. f. 3. t. 12. f. 13. *In de Duinen by Catwyk en Wassenaar. (Hortulanus MEERBURG.)*
- claviculata* 589. FUMARIA filiquis linearibus, foliis cirrhiferis. *Sp.* 884. n. 10. *Gelr.* 213. *Frif.* 299. Fumaria claviculis donata. *Baub. pin.* 143. *Comm. boll.* 39. *Morif. bist.* 2. p. 266. f. 3. t. 13. f. 3. *Op schaduwachtige zandige plaatsen in Hulshorst en te Lovenich by Harderwyk; op Princen-Loo; by Haarlem, Utrecht; op den Berg by Rhenen; omtrent Oenkerk, Oudkerk, Heerenveen, Middelam, Bergum, in Friesland; ook buiten Groningen.*

O C T A N D R I A.

P O L Y G A L A.

- vulgaris.* 590. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caulis herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Sp.* 986. n. 2. *Gelr.* 414. *Frif.* 300. Polygala vulgaris. *Baub. pin.* 215. *Comm. boll.* 90. *Vailk. par. t.* 32. f. 2. Flos ambervalis. *Dod. pempt.* 273. *Oed. dan. t.* 516. *Kruis-bloem. Belg.* *Op Hei-velden by Hulfen buiten Nymegen; op de Stads-weide by Harderwyk; overvloedig in de Duin-valeyen van Holland; op dorre velden by Heerenveen, Orange-woud, Dragten, Ureterp, en Sygerswolde in Friesland; ook by Zwok, en elders.* *Variat corolla carulea, violacea, purpurascens, carnea & alba. Variat et staminum numero ab octo ad*

DIADELPHIA OCTANDRIA. 189

decem. Planta apud nos plerumque procumbens.

D E C A N D R I A.

S P A R T I U M.

591. SPARTIUM foliis ternatis solitariisque, ramis *scoparium.*
inermibus angulatis. Sp. 996. n. 8. *Gelr.* 415.

Fris. 301.

Genista angulosa & scoparia. *Baub. pin.* 305. *Comm.*
boll. 43.

Genista. *Dod. pempt.* 761.

Oed. dan. t. 313.

Brem, Brem-Kappers. Belg.

Veel omtrent Uilenpas, Keppel, 't Huis t' Velde,
Harderwyk, Wageningen, 's Heeren - Loo,
Haarlem, *in de Duinen by* Noordwyk, Wester-
hout, Zorgvliet, Egmond op den Hoef en
Bergen; *aan de Wegen by* Utrecht, Driebergen,
Rhenen; *in de Wouden in* Friesland; *te* Onnen,
by Harender - mooten, *en op de* Mickelhorst
buiten Groningen; *op de Heide by* Goor, *en*
elders.

Pharm. GENISTÆ herb. flor. sem.

Semina a nostratibus condiuntur, & loco Capparidum
acetariis inserviunt.

G E N I S T A.

592. GENISTA foliis lanceolatis glabris, ramis stri- *tinctoria.*
tis teretibus erectis. Sp. 998. n. 8. *Gelr.* 416.

Genista tinctoria germanica. *Baub. pin.* 395.

Genista tinctoria. *Dod. pempt.* 763.

Gemeene Akker - Brem. Belg.

In de Landen by den Ouden Yssel omtrent Keppel
en Uilenpas; *in de Duinen by* Westerhout; *op*
de Heide in Friesland, Groningen, *en te* Heem-
ze in Overysfel.

593. GENISTA spinis simplicibus, ramis floriferis iner- *anglica.*
mibus, foliis lanceolatis, Sp. 999. n. 11. *Fris.*
302.

Ge-

196 DIADELPHIA DECANDRIA.

Genista minor asphaltioides. Baub. pin. 395. prodr.
157. *Comm. boll. 43.*

Genistella. Dod. pempt. 760.

Kleine Stekende Brem. Belg.

Heuckel - doorn. Zutphanienfibus.

Steekel - Heide. Groningans.

Katten - doorn. Vulgo.

Veel op Hei - velden omtrent Uilenpas, Harderwyk, Naarden, Utrecht, Zwol; in veele Woudplaat- sen in Friesland; op 't Heideveld by Haren in 't witte Veen, en by Harender - Moolen buiten Gro- ningen.

COMMELINUS confundit synonyma bujus & sequen- tis speciei.

germanica. 594. GENISTA spinis compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. Sp. 999. n. 12.

Genista spinosa minor germanica. Baub. pin. 395.

Comm. boll. 43.

Genistella spinosa. Riv. tetr. t. 67.

Gaspel - doorn. Belg.

Op Muiderberg.

U L E X.

europæus. 595. ULEX foliis villosis acutis, spinis sparsis. Sp.
1045. *n. 1.*

Genista spinosa major, longioribus aculeis. Baub.
pin. 394.

Genista spinosa. Dod. pempt. 759.

Op Zuideras in 't Graafschap Zutphen; op de Heide by Mentenberg en Valkenhuysen, buiten Arn- hem; en in den Aardenhout by Haarlem.

O N O N I S.

arvensis. 596. ONONIS floribus racemosis geminatis, foliis ter- natis: superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosis. Sp. 1006. n. 2. Gehr. 418. Frisf. 303.

spinosa. α. Anonis spinosa, flore purpureo. Baub. pin. 389.

Comm. boll. 11.

Anonis. Dod. pempt. 743.

Stal - kruid, Prang - wortel. Belg.

Woert - baak. Rusticis.

β. Anonis spinosa, flore albo. Baub. pin. 389. Boerb.
lugdb. 2. p. 33.

γ. Ano-

DIADELPHIA DECANDRIA. 191

- γ. *Anonis spinis carens purpurea*. Baub. pin. 389. mltis.
Comm. boll. 11.

Anonis mitior. 1. Clus. bist. 99.

Stal - kruid zonder doornen. Belg.

α & γ. Aan de kanten der zandige Bouw-landen op
veele plaatsen; ook aan den Yssel - dyk in Gelder-
land en Overysfel; aan de Maas - en Zee - Dyken
achter s' Gravezande en by Monster; aan de
Zyp - dyk in Noord - Holland; aan de Lek - dyk
by Wyk te Duurstede. β. Omtrent Doesburg,
s' Gravezande, Monster.

Pharm. ONONIDIS rad.

Planta inermes γ. astate spinosa evadunt.

A N T H Y L L I S.

597. *ANTHYLLIS herbacea*, foliis pinnatis inæqua- *Vulneraria*
libus, capitulo duplicato. Sp. 1012. n. 2.

Anthyllis leguminosa belgarum. Lob. ic. 2. p. 87.

Loto affinis vulneraria pratensis. Baub. pin. 332.

Lagopodium flore luteo. Tabern. ic. 925.

Wond - kruid. Belg.

In de Duinen buiten 's Hage, over Velsen, en
tusschen Egmond op den Hoef en Bergen.

L A T H Y R U S.

598. *LATHYRUS pedunculis unifloris*, cirrhis aphyll- *Aphaca*
lis, stipulis sagittato - cordatis. Sp. 1029. n. 1.

Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. Baub. pin.
345.

Aphaca. Lob. ic. 2. p. 70.

Op de nieuwe plantagie langs de Maas by Rotter-
dam. (D. RAINVILLE.)

599. *LATHYRUS pedunculis multifloris*, cirrhis di- *tuberosus*.
phyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis. Sp.
1033. n. 15. Gelr. 421.

Lathyrus arvensis repens tuberosus. Baub. pin.

344. Comm. boll. 64.

Terræ glandes. Dod. pempt. 550.

Aard - Aakers. Belg.

Overvloedig in de Zaai- en Koorn-landen in Gel-
derland, 't Sticht van Utrecht en Overysfel;
in de Hogen om Wyk by Duurstede; veldhier en
daar

192 **DIADELPHIA DECANDRIA**

daar op de Akkers by 's Gravenhage, dog zeldzaam.

pratensis. 600. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis di-
phyllis simplicissimis: foliolis lanceolatis. *Sp.*
1033. n. 16. *Gelr.* 422. *Fris.* 305.

Lathyrus sylvestris luteus, foliis viciæ: *Baub. pin.*
344. *Comm. boll.* 65.

Lathyrus luteus sylvestris dumetorum. *Baub. bist.*
2. p. 304.

Oed. dan. t. 527.

Geele Wikken. Belg.

Linzen. Groninganis.

Op schaduwachtige plaatsen, en aan de kanten der
Zaai- en Koorn-landen by Uilenpas, 's Heeren-
Loo, 's Gravenhage, Utrecht; in den Aarden-
hout op den weg naar Overveen; in de Wouden
en op de Kley in Friesland; in 't Goreght om
Groningen; en elders.

sylvestris. 601. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis di-
phyllis: foliolis ensiformibus, internodiis mem-
branaceis. *Sp.* 1033. n. 17.

Lathyrus sylvestris major. *Baub. pin.* 344.

Lathyrus sylvestris. *Clus. bist.* 2. p. 129. *Dod.*
pempt. 523.

Oed. dan. t. 525.

Op de Duinen by 's Gravenhage. (*Cel. SCHWENCKE.*)

latifolius. 602. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis di-
phyllis: foliolis lanceolatis, internodiis mem-
branaceis. *Sp.* 1033. n. 18. *Gelr.* 629.

Lathyrus latifolius. *Baub. pin.* 344.

Lathyrus major latifolius, flore purpureo specio-
sior. *Baub. bist.* 2. p. 303.

Tros-Lathyrus, *Bouquet-Lathyrus.* Vulgo.

Langs de Heggen by Uilenpas, en overvloedig op
den Haak by 's Gravezande.

V I C I A.

Cracca. 603. **VICIA** pedunculis multifloris, floribus imbrica-
tis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis
integris. *Sp.* 1035. n. 5. *Gelr.* 423. *Fris.* 306.

Vi-

DIADELPHIA DECANDRIA. 193

Vicia multiflora. *Baub. pin.* 345. *Comm. boll.* 114.

Vicia perennis multiflora spicata cærulea sepia.

Morif. bist. 2. p. 61. f. 2. t. 11. f. 1.

Cracca. Riv. tetr. 49. *Rupp. jen.* 212.

Wilde Wikken of Vitzzen, Nacht-Wikken. Belg.

In de Koorn-landen, en aan ruige Wallen op veele plaatsen.

604. *Vicia* leguminibus sessilibus subbinatis erectis, *sativa*
foliolis recurvis, stipulis notatis. *Sp.* 1037. n. 10.

Gelr. 424. *Fris.* 307.

Vicia sativa vulgaris, semine nigro. Baub. pin. 344.

Comm. boll. 14.

Vicia vulgaris sativa. Baub. bist. 2. p. 310.

Oed. dan. t. 522.

Wikken. Belg.

β. *Vicia vulgaris, acutiori folio, semine parvo nigro. Baub. pin.* 345. *Boerb. lugdb.* 2. p. 43.

γ. *Vicia semine rotundo nigro. Baub. pin.* 344.

Cracca primum genus. Dod. pempt. 542.

In de Koorn- en Bouw-landen.

605. *Vicia* leguminibus sessilibus solitariis erectis *lathyroides*.

glabris, foliolis senis: inferioribus obcordatis.

Sp. 1037. n. 11.

Vicia minima, radice granulosa breynii. Comm.

boll. 115. *amst.* 364.

Vicia minima. Riv. tetr. 169.

Vicia lathyroides, purpureo - cæruleis floribus.

Herm. par. 242. t. 242.

Oed. dan. t. 58.

*Op de Duinen by Catwyk, en buiten Haarlem;
en op dorre plaatsen by Naarden.*

*Nonnullæ bujus speciei plantæ radice granulata
gudent.*

606. *Vicia* leguminibus pedicellatis subquaternis *sepium*.

erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus

decreascentibus. *Sp.* 1038. n. 15. *Gelr.* 425.

Fris. 308.

Vicia sepium, folio rotundiore acuto. Baub. pin.

345. *Comm. boll.* 114.

Vicia. Dod. pempt. 531.

*Vitzzen, Kleine wilde Wikken, Rinkel - Wikken.
Belg.*

194 DIADELPHIA DECANDRIA.

By de Wegen, en in de Akkers.

E R V U M.

- tetraspermum.* 607. ERVUM pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. *Sp.* 1039. *n.* 2.
Vicia segetum, singularibus siliquis glabris. *Baub.* *pin.* 345.
Vicia minor segetum, cum siliquis paucis glabris. *Morif. bist.* 2. *p.* 64. *f.* 2. *t.* 4. *f.* 16.
Oed. dan. t. 95.
Aan de kant van een Sloot op Zandhorst; en in de Zaai-landen tusschen Utrecht en Maarssen. (Nob. D. FABRICIUS SIX.)
- hirsutum.* 608. ERVUM pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. *Sp.* 1039. *n.* 3. *Gelr.* 436. *Fris.* 310.
Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *Baub.* *pin.* 345.
Cracca minor. *Tabern. ic.* 507.
Kleine Crock. Belg.
In de Koorn- en Bouw-landen.

O R N I T H O P U S.

- perpusillum.* 609. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus incurvatis. *Sp.* 1049. *n.* 1. *Gelr.* 438. *Fris.* 211.
Ornithopodium majus. *Baub. pin.* 350. *Comm. boll.* 84. *Morif. bist.* 2. *p.* 124. *f.* 2. *t.* 10. *f.* 13.
Vogel-voet, Vogel-pootjes. Belg.
- β. *Ornithopodium* minus. *Baub. pin.* 350. *Comm. boll.* 84.
Ornithopodium perpusillum. *Dalech. bist.* 487.
- γ. *Ornithopodium* radice tuberculis nodosa. *Baub. pin.* 350. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 50.
In de Bouw- en Zaai-landen, op dorre zandige plaatsen, by Hillegom, Franeker, Groningen, &c. by Harderwyk, op de Heerlykheid Roozendaal by Arnhem; aan de Arnhemse-berg by Wageningen; langs de Wegen in 't Duin by 's Hage en Alkmaar; in de Wouden in Friesland; ook by de Wegen omtrent Zwol.

TRI-

TRIFOLIUM.

610. *TRIFOLIUM* leguminibus racemosis nudis di-*M. officina-*
spermis rugosis acutis, caule erecto. *Sp.* 1078. *lis.*
n. 4. *Gelr.* 434. *Fris.* 312.

Trifolium odoratum f. *Melilotus*. *Dod. pempt.* 567.

Melilotus officinarum germaniæ. *Baub. pin.* 331.

Comm. boll. 73.

Welriekende Klaveren, *Melote*, *Mallote*. Belg.

- β. *Melilotus officinarum germaniæ*, flore albo. *Baub.*
pin. 331. *Comm. boll.* 73.

Witte Mallote. Belg.

In Gelderland by Tiel, Zutphen, Doesburg, Twello, &c.; aan de Maas-dyk by 's Gravezande; aan de Muider-dyk buiten Amsterdam; in Friesland buiten Leeuwaarden, en tusschen Pinjum en Witmarsum, ook op eenige ruige plaatsen in de Wouden; en overvloedig langs den Yssel-Dyk buiten Campen.

Pharm. *MELILOTI flor.*

611. *TRIFOLIUM* capitulis umbellaribus, legumini-*repens.*
bus tetraspermis, caule repente. *Sp.* 1080. *n.* 12.
Gelr. 431. *Fris.* 313.

Trifolium pratense album. *Baub. pin.* 327. *Comm.*
boll. 111.

Trifolium pratense. *Till. ic.* 103.

Witte Veld-Klaver. Belg.

- β. *Trifolium quadrifolium hortense album*. *Baub. pin.*
327. *Boerb. lugdb.* 2. p. 31.

Overvloedig in de Wei-landen, en aan Wallen en Wegen.

612. *TRIFOLIUM* spicis globosis subvillosis, cinctis *pratense.*
stipulis oppositis membranaceis, corollis mono-
petalis. *Sp.* 1082. *n.* 19. *Gelr.* 433. *Fris.* 314.

Trifolium pratense purpureum. *Baub. pin.* 327.

Comm. boll. 111.

Trifolium pratense. *Cam. epit.* 582. *Dod. pempt.*
565.

Rode Klaver, *Beemd-Klaver*. Belg.

Varkens-Klaver. Rusticis.

- β. *Trifolium purpureum majus*, foliis longioribus &
angustioribus, floribus saturatioribus. *Boerb.*
lugdb. 2. p. 31.

196 **DIADELPHIA DECANDRIA.**

By de voorgaande.

- arvense.* 613. **TRIFOLIUM** spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis villosis æqualibus. *Sp.* 1083. *n.* 25. *Gelr.* 432. *Frif.* 315.

Trifolium arvense humile spicatum sive Lagopus.
Baub. pin. 328. *Comm. boll.* 112.

Lagopus. *Dod. pempt.* 577.

Haaze-pootjes. Belg.

*Te Maurik op den Bikkelenberg in de Betuwe;
langs de Hierder-weg, en in de zandige Bouw-land-
den buiten Harderwyk, Zutphen, Haarlem,
Alkmaar; in de Duinen en in 't Haagse-Bosch;
in Friesland in de Wouden omtrent Bergum,
Zuiderhuysum, Heereveen, Dragten, en elders;
ook omtrent Zwol.*

- resupina-
tum.* 614. **TRIFOLIUM** spicis subovatis, corollis supina-
tis, calycibus inflatis dorso gibbis, caulibus pro-
stratis. *Sp.* 1086. *n.* 35. *Gelr.* 429.

Trifolium pratense folliculatum. *Baub. pin.* 329.

*Trifolium folliculatum f. vesicarium minus purpu-
reum.* *Faub. bist.* 2. p. 379.

Aan den Ouden-Yssel by Uilenpas.

- fragiferum* 615. **TRIFOLIUM** capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *Sp.* 1085. *n.* 37. *Gelr.* 428. *Frif.* 316.

Trifolium fragiferum friscum. *Baub. pin.* 329.

Clus. cur. app. 38. t. 39. *Comm. boll.* 112

Trifolium fragiferum. *Vaill. par.* 195. t. 22. f. 2.

Klaver met Beziën. Belg.

Aard-Beziën Klaver. Vulgo.

*By de voorgaande, en in de Wei-landen by Zand-
horst, en op veele plaatsen buiten Haarlem; over-
vloedig langs de Maasstrand op 't Nieuwe land;
en in Friesland, zoo in de Wouden als op de
Kley.*

- agrarium.* 616. **TRIFOLIUM** spicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Sp.* 1087. *n.* 39. *Gelr.* 430.

Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli vel

agrarium. *Baub. pin.* 328. *Comm. boll.* 111.

Trifolium agrarium. *Dod. pempt.* 576.

Oed.

DIADELPHIA DECANDRIA. 197

Oed. dan. t. 558.

Steen-Klaveren. Belg.

Op ruwe steenachtige en zandige gronden buiten Tiel, Harderwyk, Zwol, Campen; langs de Duinkant buiten Haarlem en 's Hage; ook in 't Haagse - Bosch; en op de Heereweg by Haren buiten Groningen.

L O T U S.

617. LOTUS leguminibus solitariis membranaceo-filiquosus. quadrangulis, caulibus procumbentibus, foliis subtus pubescentibus. Sp. 1086. n. 2.

Lotus pratensis filiquosus luteus. Baub. pin. 332.

Boerb. lugdb. 2. p. 37.

Langs de Slooten by 's Gravenhage. (Cel. SCHWENCKE.)

618. LOTUS capitulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. Sp. 1092. n. 15. Gehr. 427. Frij. 317.

Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra.

Faub. pin. 332. Comm. boll. 68.

Trifolium corniculatum. 1. Dod. pempt. 573.

Kleine-geboorende Klaveren. Belg.

Juffers-Schoenen. Vulga.

β. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo splendente. Baub. pin. 332.

Veel op drooge dorre plaatsen by Tiel, Harderwyk, Hattem, Utrecht, Zwol, &c.; in de Duinen van Holland; in sommige Wei-landen, en aan de Wegen in Friesland. β. Buiten Balk en elders in de Wouden.

T R I G O N E E L A.

619. FRIGONELLA leguminibus pedunculatis congestis declinatis subfalcatis, pedunculo longo, subspinoso, caule erecto. Sp. 1094. n. 4.

Melilotus corniculis reflexis major. Baub. pin. 331. Comm. boll. 73.

Trifolium corniculatum 2. Dod. pempt. 573.

Geboornde Klaveren. Belg.

In vochtige Wei-landen, en aan de vochtige kanten van de weg tusschen Haarlem en Overveen.

N. 3.

ME.

198 **DIADELPHIA DECANDRIA.**

M E D I C A G O.

- falcata.* 620. **MEDICAGO** pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Sp.* 1096. *n.* 6. *Gelr.* 437. *Fris.* 318.
Medica flavo flore. *Clus. bist.* 2. *p.* 243.
Trifolium sylvestre luteum, filiqua cornuta, vel **Medica** frutesceus. *Baub. pin.* 330.
Oed. dan. t. 233.
 Hier en daar op de *Krögten* by 's Hage; tusschen de *Akkers* aan den weg in *Assendorp* in *Overysel*; en op sommige *Velden* en aan de wegen omtrent bet *Heereveen*, en elders in *Friesland*.
- lupulina.* 621. **MEDICAGO** spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 1097. *n.* 7. *Fris.* 319.
Trifolium pratense luteum, capitulo brevior. *Baub. pin.* 328.
Trifolium pratense luteum. *Fuchf. bist.* 819.
Geele Veld-Klaver met kleine hoofdjes. Belg.
 Op de *Krögten* by 's Hage; in de graspaden op *Zandhorst*; in de *Zaat-landen* langs de wegen tusschen *Utrecht* en *Maarssen*; veel op *Koornvelden*, ook in *Wei-en Moes-landen* op veel plaatsen in *Friesland*.
- polymorpha* 622. **MEDICAGO** leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Sp.* 1097. *n.* 9. *Fris.* 320.
 a. **Medica** cochleata dicarpos, capsula spinosa rotunda minore. *Morif. bist.* 2. *p.* 153. *f.* 2. *t.* 15. *f.* 11.
Slakken-kruid met *Doortjes*. Belg.
 In *Friesland* by de voorgeaande, dog minder in getal. (*MEESE.*)

C L A S S I S XVIII.

POLYADELPHIA.

P O L Y A N D R I A.

H Y P E R I C U M.

623. *HYPERICUM floribus trigynis, caule quadrato quadrangulo herbaceo. Sp. 1104. n. 17. Gelr. 439. Frif. lare.*

321.

Hypericum Afcyrum dictum, caule quadrangulo.

Baub. bist. 3. p. 382.

Afcyron. Dod. pempt. 78.

Harts-Hooy. Belg.

Op vochtige plaatsen langs de Beeken in Gelderland en Overysfel; aan de Duinkanten in Holland; in 't Haagse-Bosch; in de Wouden in Friesland; aan de Kerklaan te Haren en elders buiten Groningen.

624. *HYPERICUM floribus trigynis, caule ancipiti, perforatum foliis obtusis pellucido-punctatis. Sp. 1105. n.*

18. Gelr. 440. Frif. 322.

Hypericum vulgare. Baub. pin. 279. Comm. boll.

59.

Hypericum, Perforata, Fuga dæmonum. Tabern. ic. 864.

St. Jans-kruid. Belg.

Jaagt den duivel. Rusticis quibusdam.

Aan de kanten der Akkers, en aan de Wegen op vele plaatsen; ook in de Valen der Duinen.

N 4

Pharm.

200 POLYADELPHIA POLYANDRIA.

Pharm. HYPERICI herb. flor. sem.

Varietatem foliis variegatis vidi circa Uilenpassiam.

humifusum. 625. HYPERICUM floribus trigynis axillaribus solitariis, caulibus ancepitibus prostratis filiformibus, foliis glabris. *Sp.* 1105. *n.* 19. *Gelr.* 630. Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum. *Baub. pin.* 279.



Hypericum supinum III. minimum. *Clus. bist.* 2. *p.* 181.

Oed. dan. t. 141.

Klein kruipend St. Jans - kruid. Belg.

By de Sloot achter de Kampen aan 't Veld te Heemze in Overysfel.

hirsutum. 626. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ferrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis subpubescentibus. *Sp.* 1105. *n.* 21.

Hypericum Androsæmum dictum. *Baub. bist.* 3. *p.* 382.

Androsæmum hirsutum. *Baub. pin.* 280. *Comm. boll.* 10.

Androsæmum Ascyron dictum, caule rotundo hirsuto. *Morif. bist.* 2. *p.* 271. *f.* 5. *t.* 6. *f.* 11.

Ruig - Harts - Hooy. Belg.

Op vochtige gronden te Hulsen by Nymegen; in 't Lentveld aan de Duin-beken, en op andere plaatsen buiten Haarlem; ook buiten Alkmaar; in 't Sticht van Utrecht achter de Bilt; op de Borgh te Hemmen buiten Groningen.

Planta est odorata.

COMMELINUS confundit synonyma bujus & Hyperici quadranguli, nam Ascyron Dod. ad utramque plantam refert. Deinde Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo J. B non est Hypericum hirsutum, sed quadrangulare Linn. Denique Ascyron sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum. *Baub. pin.* 280. non est Hypericum quadrangulare, sed montanum Linnæi, qui illud spec. pl. edit. Imæ, pro varietate Hyperici hirsuti habuit. Vel forsan una eademque planta a Commelino bis citata est, quod eo magis credo, quia locus crescendi utriusque convenit.

lomentosum 627. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ferrato-

POLYADELPHIA POLYANDRIA. 201

to-glandulosus, foliis semiamplexicaulibus flexu-
osis tomentosis, caulibus prostratis. *Sp.* 1106.
n. 22. *Fris.* 323.

β. *Hypericum lupinum tomentosum majus & hispani-*
cum. Baub pin. 279.

Hypericum lupinum tomentosum hispanicum. Clus.
bist. 2. *p.* 181.

In de eerste opvaart ten Oosten bet Verlaat by de
Bontebok in Friesland. (MEESE.)

C L A S S I S XIX.

S Y N G E N E S I A.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

T R A G O P O G O N.

pratense. 628. **TRAGOPOGON** calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis. *Sp.* 1109. n. 1. *Geir.* 452. *Fris.* 324.

Tragopogon luteum majus. *Baub. pin.* 274. *Comm. boll.* 111.

Tragopogon. *Dod. pempt.* 256.

Boks-baard, Salsafi, Jofephs-bloemen. Belg.

Morgenftar. Quibusdam.

In de Heerlykheid Loenen en Hemmen in de Betuwe; hier en daar om Tiel; in de Meben by Harderwyk; overal in de Duinen; overvloedig aan den Ryn by Leiden; aan den Lek-dyk by Wyk te Duurstede; aan 't voetpad tusschen Hardenbroek en Cothen, en omtrent Beverwaard in 't Sticht van Utrecht; aan den Yssel-dyk by Campen; tusschen 't Koorn op het Gude-Bilt in Friesland; en op andere plaatsen.

Hujus flores omnium primo evigilant, unde ratio nominis belgici Morgenftar.

porrifolium 629. **TRAGOPOGON** calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis. *Sp.* 1110. n. 3. *Fris.* 325.

Tragopogon purpureo - cæruleum, porri folio, quod

SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS 203

quod Artefi vulgo. *Baub. pin.* 274. *Morif. bist.*
3. p. 8. f. 7. t. 9. f. 5.
Aan de kanten der Koorn-landen tusschen Beetgum
en Marsum in Friesland.

P I C R I S.

630. *PICRIS* perianthiis laxis, foliis integris, pedun- *Hieraciot-*
culis squamatis in calycem. *Sp.* 1115. n. 2. *des.*
Gelr. 448.

Cichorium pratense luteum hirsutiae asperum. Baub.
pin. 126. *Comm. boll.* 26.

Hieracium asperum, majore flore in agrorum limi-
tibus. Baub. bist. 2. p. 1029. *Morif. bist.* 3. p.
69. f. 7. t. 4. f. 45.

Aan de kanten der Zaai-landen en by de Wegen
omtrent Harderwyk, Hattem, Muiderberg,
Zwol, en elders; ook in de Duinen by 's Hage.

S O N C H U S.

631. *SONCHUS* pedunculis calycibusque hispidis sub-*palustris.*
umbellatis, foliis runcinatis basi aristatis. *Sp.*
1116. n. 2.

Sonchus asper arborefcens. Baub. pin. 124.

Sonchus laevior austriacus 5. altissimus Clus. bist.
2. p. 147.

In de Riet-landen by Haarlem; in de Elsbagen te
Maftenbroek in Overysfel; en elders op onge-
bouwde plaatsen.

632. *SONCHUS* pedunculis calycibusque hispidis sub-*arvensis.*
umbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. *Sp.*
1116. n. 3. *Gelr.* 454. *Frif.* 326.

Sonchus repens, multis Hieracium majus. Baub.
bist. 2. p. 1017.

Hieracium majus, folio sonchi, vel Hieracium
sonchites. Baub. pin. 126. *Comm. boll.* 57.

β. *Hieracium majus, folio sonchi angustiore. Baub.*
pin. 126. *Comm. boll.* 58.

Hieracium alterum. Dod. pempt. 639.

In kleijige Koorn-velden en Riet-landen op veele
plaatsen; genoeg in de Duinen.

633. *SONCHUS* pedunculis tomentosis, calycibus *solaraceus.*
glabris. *Sp.* 1116. n. 5. *Gelr.* 453. *Frif.* 327.

a. *Son-*

204 SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS:

- α. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*. *Baub. pin.* 124.
Comm. boll. 107.
Sonchus lævis. *Dod. pempt.* 643.
Haaze - Latouw, *Ganzen - Distel*, *Sogge - Distel*,
Dauw - Distel, *Haazen - Distel*. Belg.
- β. *Sonchus lævis minor*, *pauciorbus laciniis*. *Baub.*
pin. 124.
Sonchus lævis latifolius. *Tabern. ic.* 190.
- γ. *Sonchus asper laciniatus*. *Baub. pin.* 124. *Comm.*
boll. 107.
Sonchus asper. *Dod. pempt.* 643.
- δ. *Sonchus asper non laciniatus*. *Tourn. inst.* 474.
Comm. boll. 107.
Sonchus aspera. *Fuchf. bist.* 674.
- ε. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*, *flore niveo*.
Baub. pin. 124. *Boerb. lugdb.* 1. p. 85.
Op ruswe plaatsfen, en in de Moes - landen en Hoven.
Pharm. SONCHI ASPERI & LÆVIS berb.

L A C T U C A.

- Scarioles.* 634. *LACTUCA* foliis verticalibus carina aculeatis.
Sp. 1119. n. 4.
Lactuca sylvestris costa spinosa. *Baub. pin.* 123.
Comm. boll. 62.
Lactuca sylvestris laciniata. *Morif. bist.* 3. p. 58.
f. 7. t. 2. f. 17.
Wilde Salade, Wilde Latouw. Belg.
In de Zaai - landen op Muiderberg.

P R E N A N T H E S.

- muralis.* 635. *PRENANTHES* flosculis quinis, foliis runcina-
tis. *Sp.* 1121. n. 4. *Gehr.* 441.
Sonchus lævis laciniatus muralis, *parvis floribus*.
Baub. pin. 124.
Sonchus lævis vulgatiore. *Clus. bist.* 2. p. 146.
Oed. dan. t. 509.
Veel op de muuren te Schoonhoven en Zwol.

L E O N T O D O N.

- Taraxa.* 636. *LEONTODON* calyce squamis inferne reflexis,
an. foliis runcinatis denticulatis lævibus. *Sp.* 1122,
n. 1. *Gehr.* 450. *Fris.* 328.

Dens.

SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS. 203

Dens leonis latiore folio. *Baub. pin.* 126. *Comm. boll.* 31.

Dens leonis. *Dod. pempt.* 636.

Oed. dan. t. 574.

*Paarde-bloem, Hondsbloem, Paapenkruid, Kan-
kerbloem, Mol-Salade, Pis in 't bed. Belg.*

Paapen-Sibelen. Mola Trajectinis.

β. Dens leonis angustiore folio. *Baub. pin.* 126.
Boerb. lugdb. t. p. 88.

Veel in de Wei-landen en by de Wegen.

Pharm. TARAKACI rad. berb.

Variat etiam foliis magis minusque runcinatis.

637. LEONTODON caule ramoso, pedunculis squa- *autumale.*
mofis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis
glabris. *Sp.* 1123. *n.* 4. *Gelr.* 416. *Fris.* 329.

Hieracium, chondrillæ folio glabro, radice fuc-
cisa majus. *Baub. pin.* 127. *Comm. boll.* 58.

Hieracium quartum. *Dod. pempt.* 639.

β. Hieracium chondrillæ folio glabro, radice succisa
minus. *Baub. pin.* 128. *Comm. boll.* 58.

Hieracium quintum. *Dod. pempt.* 639.

*In de Koorn- en Weilanden op vele plaatsen; ook in
't Haagse-Bosch.*

638. LEONTODON calyce toto erecto, foliis denta- *hispidum.*
tis integerrimis hispidis: setis furcatis. *Sp.* 1124.
n. 8.

Hieracium, caule aphylo, hirsutum. *Baub. bist.*
n. p. 1038.

Hieracium dentis leonis folio, caulibus aphyllis
glabris. *Dill. Eph. nat. cur. Cent. VI. app. p.*
62. t. 9. f. 18.

Picris nudo caule unifloro, foliis asperis dentatis.
Hall. bist. 25.

*In de Weiden en andere met gras begroeide plaatsen
in de Provinciën Holland en Utrecht; en buiten
Franeker; zeer gemeen in de Weiden aan de Duin-
kant buiten Leiden, zoo dat 'er bet Duingras
dikwils maar al te veel mede bezet is, als men bet
tot graspaden wil gebruiken.*

HIERACIUM.

639. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis subtus pilosella,
10-

206 SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS.

tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *Sp.* 1125. *n.* 4. *Gelr.* 444. *Jngr.* 125. *Fris.* 330.
Pilosella major repens hirsuta. Baub. pin. 262.
Comm. boll. 87.

Pilosella major. Cam. epit. 709.

Muizen - Oor, Nagel - kruid. Belg.

Overvloedig op booge zandige plaatsen in Gelderland, Utrecht en Overysfel; in de Duinen by 's Hage, Haarlem, en elders; in de Wouden in Friesland; in 't Goreght by Groningen aan de dykjes; en elders.

Auricula. 640. *HIERACIUM* foliis integerrimis lanceolatis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. *Sp.* 1126. *n.* 6.

Pilosella major erecta altera. Baub. 262.

In de Duinen tusschen Hartecamp en de Zee. (Linn. b. Cliff. 388.)

murorum. 641. *HIERACIUM* caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minori. *Sp.* 1128. *n.* 17.
Hieracium murorum, folio pilosissimo. Baub. pin. 129. *Comm. boll.* 58.

Pulmonaria gallica mas. Tabern. bist. 504.

Franseb Longe - kruid. Belg.

Aan de Oude muuren der Stad Utrecht, en op moer plaatsen; by de Mickelhorst aan de westkant buiten Groningen.

paludosum. 642. *HIERACIUM* caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hispidis. *Sp.* 1129. *n.* 18. *Jngr.* 123. *Fris.* 331.

Hieracium montanum latifolium glabrum minus. Baub. pin. 129. *Morif. bist.* 3. *p.* 69. *f.* 7. *t.* 5. *f.* 47.

Klein Berg - Haviks - kruid. Belg.

Aan de agterkant ten Noord-westen op de Bergummer - heide in Friesland.

umbellatum. 643. *HIERACIUM* foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. *Sp.* 1131. *n.* 28. *Gelr.* 443. *Jngr.* 124. *Fris.* 332.

Hieracium fruticosum angustifolium majus. Baub. pin. 129. *Comm. boll.* 58. *Morif. bist.* 3. *p.* 69. *f.* 7. *t.* 5. *f.* 66.

Gemeen groot Haviks - kruid. Belg.

Peel

SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS. 207

*Veel aan de dykjes en kanten der Wegen op den Es-
senburg buiten Harderwyk; en omtrent Zwol;
op de Duinen buiten 's Hage en Haarlem; in de
Wouden in Friesland; aan de Heereweg en Oost-
weg by Haren buiten Groningen, en op andere
plaatsen.*

C R E P I S.

644. CREPIS foliis lanceolato-runcinatis sessilibus *testorum*.
lævibus: inferioribus dentatis. *Sp.* 1135. *n.* 13.
Gelr. 445.

α. Hieracium chondrillæ folio hirsutum. *Baub.* *pin.*
127.

Hieracium II. *Tabern. bist.* 491. *ben.*

Hieracium foliis & facie chondrillæ. *Lob. ic.* 239.

β. Cichorium pratense luteum lævius. *Baub.* *pin.* 126.
Comm. boll. 26.

Dens leonis tertia species. *Dod. pempt.* 636.

Oed. dan. t. 501.

Wilde Cicorey Belg.

α. *In de Herkeloer-Waard in Overysfel. β. Veel
op vochtige plaatsen omtren Amsterdam en Utrecht;
ook op de Duinen tusschen de Heide.*

H Y O S E R I S.

645. HYOSERIS caule diviso nudo, pedunculis in- *minima*.
crassatis. *Sp.* 1138. *n.* 5. *Gelr.* 449.

Hyoseris angustifolia. *Tabern. ic.* 180. *Boerb.*
lugdb. 1. *p.* 93.

Hieracium minus, folio subrotundo. *Baub.* *pin.*
127. *Comm. boll.* 58.

Hieracium minimum. *Clus. bist.* 2. *p.* 142.

Oed. dan. t. 201.

*Veel in de Koorn-landen by Uilenpas, in Tonzel
by Harderwyk, op Muiderberg, en op de Duinen
agter Zorgvliet by 's Hage.*

H Y P O C H Æ R I S.

646. HYPOCHÆRIS glabra, calycibus oblongis im- *glabra*.
bricatis, caule ramoso nudo, foliis dentato-fi-
nuatis. *Sp.* 1140. *n.* 3.

Hy-

208 SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS.

Hypochæris chondrillæ folio, parvo flore. Vaill. act. 1721. p. 214.

Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro. Eaub pin. 127.

Oed. dan. t. 124.

In de zandige Zaaï-landen by Zandhorst, Teilingen, 't Huis te Marquette, en elders in Holland, dog nergens in Kley-landen. (Nob. D. FABRICIUS SIX.)

Solet esse glaberrima, interdum tamen villos raros in pagina superiore foliorum exhibet.

radicata.

647. *HYPOCHÆRIS* foliis runcinatis obtusis scabris, caule ramoso nudo lævi, pedunculis squamosis. *Sp. 1140. n. 4. Gelr. 447. Frif. 333.*

Hieracium, dentis leonis folio obtuso, majus. Baub. pin. 127. Comm. boll. 58. Morif. bist. 3. p. 66 f. 7. t. 4. f. 27.

Hieracium longius radiculatum. Lob. bist. 120.

Oed. dan. t. 150.

Op de Duinen agter Zorgvliet; in de zandige velden, en by de Wegen buiten Harderwyk, Haarlem, Utrecht, Zwol; in Friesland omtrent Balk, Wykel, Gorradyk, Dragten, en elders.

L A P S A N A.

communis. 648. *LAPSANA* calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Sp. 1141. n. 1. Gelr. 455. Frif. 334.*

Lampfana. Dod. pempt. 675.

Soncho affinis, Lampfana domestica. Baub. pin. 124. Comm. boll. 107.

Oed. dan. t. 500.

By de Wegen, en in de Bouw-landen.

C I C H O R I U M.

Intybus. 649. *CICHORIUM* floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Sp. 1142. n. 1. Gelr. 456.*

Cichorium sylvestre five officinarum. Baub. pin. 126. Comm. boll. 25.

Intybus sylvestris. Cam. epit. 285.

Suikerey of Cicorey. Belg.

β. *Cichorium sylvestre, flore cæruleo, caule purpu-*

SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS. 209

- pureo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 91.
 γ. *Cichorium sylvestre*, flore albo. *Baub. pin.* 126.
Boerb. lugdb. 1. p. 91.
 δ. *Cichorium sylvestre*, flore roseo. *Baub. pin.* 126.
Boerb. lugdb. 1. p. 91.

In de braakleggende Koorn-velden op veele plaatsen;
 op de Zaaï-landen in de Duinen; overvloedig aan
 den Yssel-en Lek-dyk, en door de gantsche Be-
 tuwe en Tielerwaard; ook aan den ingang van de
 Sydel by Harderwyk; op de Vesting by de Geester-
 poort te Alkmaar, en elders. γ. Overvloedig op
 Zuideras en by 't Dorp Brummenbuiten Zutphen.
 Pharm. CICHOREI SYLVESTRIS rad. herb. sem.

A R C T I U M.

650. *ARCTIUM* foliis cordatis inermibus petiolatis. *Lappa*.
Sp. 1143. n. 1. *Gelr.* 457. *Fris.* 335.
Lappa major; *Arctium dioecoris*. *Baub. pin.* 198.
Comm. boll. 63. *Moris. bist.* 3. p. 146. f. 7. t.
 32. f. 1.

Kliffen, Klassen, Klitten. Belg.

Startoffen. Enchufanis.

Kladde-wortel. Quibusdam.

- β. *Lappa major montana*, capitulis tomentosis. *Baub.*
pin. 198. *Comm. boll.* 63.
Berg-Klitten. Belg.

Overvloedig by de dyken en wegen, en op ruwe
 plaatsen. β. Op de Vesten der Stad Amsterdam,
 tusschen de Muider en Utrechtsche Poorten; en in de
 Botstraat te Enckhuysen.

Pharm. BARDANÆ rad. sem.

S E R R A T U L A.

651. *SERRATULA* foliis dentatis spinosis. *Sp.* 1149. *arvensis*.
 n. 16. *Gelr.* 462. *Fris.* 336.

Carduus vinearum repens, fonchi folio. *Baub. pin.*
 377. *prodr.* 156.

Carduus in avena proveniens. *Baub. pin.* 377.
Comm. boll. 21.

Ceonanthos theophrasti. *Col. ecpr.* 45. t. 45.

Haver-Distel. Belg.

- β. *Carduus in avena* proveniens, flore albo. *Baub.*
pin. 377.

310 SYNGENESIA POLYG. AQUALIS.

In de Bouw-londen op verscheide plaatsen.

C A R D U U S.

lanceolatus 652. **CARDUUS** foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. *Sp.* 1149. n. 2. *Gelr.* 459.

Carduus lanceolatus latifolius. Baub. pin. 385. *Comm. boll.* 21.

Carduus lanceolatus f. sylvestris dodonæi. Baub. hist. 3. p. 58.

Carduus lanceolatus Tabern. ic. 699.

β. *Carduus lanceolatus latifolius, flore albo. Tourn. inst.* 440.

Langs de Wegen en Paden buiten Haarlem, en op andere plaatsen. β. Buiten Alkmaar by Egmond op den Hoef.

COMMELINUS non recte synonymum *f. Baub. ab hac planta separavit.*

nutans. 653. **CARDUUS** foliis semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis: squamis calycinis superne patentibus. *Sp.* 1150. n. 3. *Gelr.* 460.

Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris. Baub. pin. 385.

Carduus nutans. Baub. hist. 3. p. 56.

Carduus alatus major, flore rubro moschato, capite nutante. Morif. hist. 3. p. 152. f. 7. t. 31. f. 6.

Cirsium majus singulari capitulo magno. C. B. Comm. boll. 27.

Veel aan de Wegen en Dyken in 't Graaffschap Zutphen, en by Arnhem; by Twello op de Veluwe; aan de Duinkant by 's Hage en Haarlem; aan de Lek-dyk; en elders.

Varietatem flore roseo legi circa pagum Elst inter Neomagum & Arnhemiam.

acanthoides 654. **CARDUUS** foliis decurrentibus sinuatis, margine spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis. *Sp.* 1150. n. 4.

Carduus polyacanthos. Schreb. spicilleg. 915.

Polyacantha theophrasti. Tabern. ic. 701. fig. bona. *Aan de Wegen, veel buiten Doesburg.*

Af.

SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS: 211

- Affinis sequenti Carduo crispo, & hinc forsan pro eodem habitus Synonyma γ. Bautini ab ill. Linnæo ad hunc et sequentem Carduum relata dubia sunt.*

655. CARDUUS foliis decurrentibus sinuatis: margine *crispus*.

spinosis, floribus aggregatis terminalibus: squamis inermibus subaristatis patulis. *Sp.* 1150. n.

5. *Gelr.* 463. *Fris.* 937.

Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris. *Baub.* pin. 385. *Comm. boll.* 21. *Loef. pruss.* 34. t. 5.

β. Carduus spinosissimus angustifolius, flore albo.

Perb. lugdb. 1. p. 136.

γ. Idem flore carneo.

In de Moes - boven, by de Wegen, en op oude Muuren. γ. Aan de Eronsbergen buiten Zutphen.

656. CARDUUS foliis decurrentibus dentatis: margi- *palustris*.

ne spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Sp.* 1151. n. 6. *Gelr.* 631.

Fris. 338.

Carduus palustris. *Baub.* pin. 377. *prodr.* 156.

Carduus spinosissimus erectus angustifolius palustris. *Morif. bist.* 3. p. 153. f. 7. t. 32. f. 13.

Kaale Jonker, Boeren - Rottingen. Rusticis.

In slegte Wei-landen in 't Graafschap Zutphen, Friesland, Overysfel; in de Duin-valleyen van Raaphorst, en by 't Huis te Marquette; ook langs de Slooten op veel plaatsen.

657. CARDUUS foliis amplexicaulibus hastato-pinna- *marianus*.

tifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Sp.* 1153. n. 14.

Gelr. 461.

Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Baub.* pin. 381. *Comm. boll.* 21.

Carduus marie Dalech. *bist.* 1475.

Silybum nervis foliorum albis. *Hall. bist.* 181.

Marien - Distel, Onze Vrouwe - Distel; Melk - Distel. Belg.

In de Moes - boven en by de Wegen.

Pharm. CARDUI MARIÆ sem.

658. CARDUUS foliis amplexicaulibus lanceolatis *heterophyllus*.

integris laciniatisque, caule subunifloro, calyce inermi. *Sp.* 1154. n. 20. *Ingr.* 128. *Fris.* 339.

O 2

Cir

212 SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS.

Cirsium maximum, *asphodeli radice*. *Baub. pin.* 377.

Ged. dan. t. 160.

Overvloedig in de laage *Veenachtige Wei-landen* en andere *Velden tusschen Tjetjerk en Bergum*, en elders in de *Wouden in Friesland*; in *Heivel-den*, op de *Mickelhorst* en elders buiten *Groningen*; ook aan de *Kleverlaan by Haarlem*.

acaulis. 659. *CARDUUS acaulis*, calyce glabro. *Sp.* 1156. n. 26.

Carlina acaulos, minore purpureo flore. *Baub. pin.* 380. *Comm. boll.* 23.

Chamaeleon exiguus. *Trag. bist.* 852. *Baub. bist.* 3. p. 62.

Ever-wortel. Belg.

Op ruwe steenachtige plaatsen.

C N I C U S.

oleraceus. 660. *CNICUS* foliis pinnatifidis carinatis nudis; bracteis concavis integris subcoloratis.

Sp. 1156. n. 1.

Carduus pratensis latifolius. *Baub. pin.* 376. *Comm. boll.* 20.

Carduus pratensis. *Lob. ic.* 2. p. 11.

Beemdt- of Veld-Distel. Belg.

In vochtige *Wei-landen* en *Velden* buiten *Utrecht*.

O N O P O R D U M.

Acanthium. 661. *ONOPORDUM* calycibus squarrosis: squamis patentibus, foliis ovato-oblongis sinuatis. *Sp.* 1158. n. 1. *Gelr.* 458.

Spina alba tomentosa latifolia sylvestris. *Baub. pin.* 382. *Comm. boll.* 108. *Loef. pruss.* 261. t. 82.

Acanthium. *Dod. pempt.* 721.

Witte Weg-Distel. Belg.

Op ruwe plaatsen by *Nymegen*, *Harderwyk*, *Rhe-nen*; en aan het opgaan van de *Duinen* by *Over-veen* buiten *Haarlem*.

Myricum. 662. *ONOPORDUM* calycibus squarrosis: squamis inferioribus uncinatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Sp.* 1158. n. 2.

Spi-

SYNGENESIA POLYG. ÆQUALIS. 213

Spina tomentosa altera spinosior. *Baub. pin.* 382.
 Carduus tomentosus acanthi folio angustiore.
Tourn. inst. 441. *Boerb. lugdb.* 1. p. 137.
 Carduus, quibusdam dictus Acanthium villyricum.
Baub. hist. 3. p. 55.
 † Volgens BOERHAAVE.

C A R L I N A

663. CARLINA caule multiflora corymbosa, flori- *vulgata*.
 bus terminalibus, calycibus radio albo. *Sp.* 1161.
n. 4. *Gelr.* 158. *Frif.* 340.
 Carlina sylvestris vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 155.
 Cnicus sylvestris spinosior. *Baub. pin.* 378. *Comm.*
boll. 27.
 Drie - Distel, *Wilde Veld - Saffraan.* Belg.
 In de Duinen by 's Hagē, Westerhout, Raaphorst,
 Heemstede, &c ook in slegte landen by Uilenpas,
 Zwol, in Friesland; en elders.

B I D E N S

664. BIDENS foliis trifidis; calycibus subfoliosis, tripartitis.
 seminibus erectis. *Sp.* 1165. *n.* 1. *Gelr.* 467.
Frif. 341.
 Cannabina aquatica, folio tripartito diviso. *Baub.*
pin. 321. *Comm. boll.* 20.
 Hepatorijum aquaticum. *Dod. pempt.* 595.
 Water - Boelkens - kruid. Belg.
 Aan de kanten der Slooten en Graffen; in Moeras-
 sen, en andere vogtige plaatsen.
 665. BIDENS foliis lanceolatis amplexicaulibus, flo- *cernua*.
 ribus cernuis, seminibus erectis. *Sp.* 1165. *n.* 5.
Gelr. 632. *Frif.* 342.
 Cannabina aquatica, folio non diviso. *Baub. pin.*
 321. *Comm. boll.* 20.
 Eupatorium cannabinum chrysanthemum. *Tabern.*
her. 117.
 In en aan de Slooten om de Stads - Weide by Harder-
 wyk; in 't Haagse - Bosch; by Zandhorst, Mar-
 quette; tusschen Haarlem en Overveen; by Ber-
 gen buiten Alkmaar; en op andere plaatsen by de
 woorige, dog veel minder.

314. SYNGENESIA POLYG. EQUALIS

EUPATORIUM.

- cannabinum.* 666. EUPATORIUM foliis digitatis. Sp. 1173. n. 12.
Gelr. 463. *Jngr.* 130. *Fris.* 343.
 Eupatorium cannabinum. *Baub.* pin. 320. *Comm.*
boll. 36.
 Hepatorium vulgare. *Dod. pempt.* 28.
Boelkens - kruid, Koninginnē - kruid. Belg.
Aan de kanten der slooten op veele plaatsen.
Pharm. EUPATORIUM CANNABINI herb.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM.

- vulgare.* 667. TANACETUM foliis bipinnatis incis. serratis.
 Sp. 1184. n. 7. *Gelr.* 466. *Fris.* 344.
 Tanacetum vulgare luteum. *Baub.* pin. 132. *Comm.*
boll. 109.
 Athanasia sive Tanacetum. *Daletb. hist.* 955.
Rynodier, Boers - Wormkruid. Belg.
Veel langs de Wegen.
Pharm. TANACETI herb. flor. sem.

ARTEMISIA.

- campestris.* 668. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. Sp. 1185. n. 4.
 Artemisia tenuifolia. *Dod. pempt.* 33.
 Artemisia tenuifolia seu leptophylla; aliis abrotanum sylvestre. *Baub.* hist. 3. p. 194. *Comm.*
boll. 13.
 Abrotanum campestre, cauliculis rubentibus.
Baub. pin. 136.
Wild - Averuit of Averana. Belg.
 β. Abrotanum campestre, cauliculis albicantibus.
Baub. pin. 136. *Pehr. lugdb.* 1. p. 427.
Langs de zandige Wegen by Arnhem, Wageningen, Rhenen, &c. in 't bängen der Duijnen by Overveen, en naar Velsen.

- maritima.* 669. ARTEMISIA foliis multipartitis tomentosis, rac.

cemis cernuis, flosculis femineis ternis. Sp.

1186. n. 7. Fris. 345.

Absinthium seriphium belgicum. Baub. pin. 139.

Haub. bist. 3. p. 178. Comm. boll. 3.

Zee-Alsem. Belg.

Overvloedig langs de Zee- en Maas-strand achter

's Gravezande; op 't Koe gras by de Helder;

aan de Zee-Dyken van Noord-Holland en Fries-

land; en langs 't Zee-strand te Delfzyl.

670. ARTEMISIA foliis compositis multifidis, flori- *Absinthium*
bus subglobosis pendulis: receptaculo villoso.

Sp. 1188. n. 14. Gelr. 472.

Absinthium ponticum seu romanum officinarum

seu dioscoridis. Baub. pin. 138. Comm. boll. 3.

Absinthium. Cam. epit. 452.

Alsem. Belg.

β. Absinthium insipidum, absinthio vulgari simile.

Baub. pin. 139. Boerb. lugdb. 1. p. 126.

Absinthium inodorum & insipidum. Dod. pempt. 26.

Alsem zonder reuk en smaak. Belg.

Overvloedig in Gelderland by Genderingen; Ullen-

pas, 't Velde, Zuideras, Oen, Wellsum, &c. In

Holland buiten Haarlem, Naarden, en langs de

Zee-dyken achter 's Gravezande; in 't Sticht van

Utrecht omtrent Doorn, Drybergen, Leersum;

in de Provincie Groningen aan de Oostkant van

Helper; en elders op dorre plaatsen.

Pharm. ABSINTHII herb. summ. sem.

671. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis incisus sub- *vulgaris*
tus tomentosis, racemis simplicibus recurva-

tis, florum radio quinquefloro. Sp. 1188. n. 16.

Gelr. 471. Fris. 346.

Artemisia vulgaris major. Baub. pin. 137. Comm.

boll. 13.

Artemisia latifolia. Dod. pempt. 33.

Byvoet. Belg.

Krabbe - Kloodjes. Harderovicenis.

β. Artemisia vulgaris major, caule ex viridi albican-

te. Baub. pin. 137. Boerb. lugdb. 1. p. 127.

Overvloedig buiten Tiel, Zutphen, Harderwyk,

Naarden, Haarlem, Alkmaar, Utrecht by

Zeist, &c. In Friesland omtrent Joure, Langweer,

en elders in de Wouden ook in de andere Provincien.

Pharm.

216 SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA

Pharm. ARTEMISIA herb.

Fumo bauritur a pueris ut Nicotiana.

- caerulea* 672. ARTEMISIA foliis caulinis lanceolatis integris: radicalibus multifidis, flosculis femineis ternis. Sp. 1189. n. 18.
 Absinthium maritimum. lavendulae folio. Baub. pin. 139. Moris. bist. 3. p. 7. f. 6. t. 1. f. 5.
Langs het Zee- en Maas-strand in Delfland (Cels. SCHWENCKE.)

G N A P H A L I U M.

- luteo-album* 673. GNAPHALIUM herbaceum, foliis semiamplexicaulis ensiformibus repandis obtusis utrinque pubescentibus floribus, conglomeratis. Sp. 1196. n. 23. Gelr. 634. Fris. 349.
 Gnaphalium majus, lato oblongo folio. Baub. pin. 263. Moris. bist. 3. p. 88. f. 7. t. 11. f. 20.
 Gnaphalium ad stoechadem citrinam accedens. Baub. bist. 3. p. 160.
 Elichrysium sylvestre latifolium, capitulis conglomeratis. Baub. pin. 264. Comm. boll. 33.
Stink-bloem, Zevenjaars-bloem. Belg.
Buiten Leiden tusschen Katwyk en Noordwyk; aan 't Zand-pad tusschen Cothen en Hardenbroek in 't Sticht van Utrecht; op ongebouwde Kleiland te Oldonniel in Overysfel; aan de wegen en dykjes by Nye Mirdum in Friesland.
- album* 674. GNAPHALIUM sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus divisis. Sp. 1199. n. 35. Gelr. 468. Fris. 132. Fris. 347.
- mas.* f. Gnaphalium montanum, flore rotundiore. Baub. pin. 263. Comm. boll. 45.
 Pilosella minor. Dod. pempt. 68. fig. exterior.
- semina.* γ. Gnaphalium montanum, longiore & folio & flore. Baub. pin. 263.
 Pilosella minor. Dod. pempt. 68. fig. interior.
Katte-voet. Belg.
Rooze-kransjes. Zutphaniensibus.
Zevenjaars-bloem. Vulgo.
Veel op de Heide in Gelderland en Overysfel; in de laagten van de Zee-Duinen agter Zargvliet; op de

de Duinachtige heuvelen by Bredenrode buiten
Haarlem; aan de Bilt buiten Utrecht; in een
Bosch by Bergum, en op andere plaatsen in de
Wouden in Friesland; in 't Heide veld by Ha-
render-moolen buiten Groningen.

Variat corollæ colore subpurpureo, suave rubente,
candido, & variegato.

*Transjyalani oleum floribus infusum vulneribus recen-
tibus inungunt.*

675. GNAPHALIUM caule herbaceo simplicissimo *sylvaticum.*
erecto, floribus sparsis. *Sp. 1200. n. 39. Gelr.*

633. *Frif. 351.*

Gnaphalium majus, angusto oblongo folio, alte-
ram. *Baub. pin. 263.*

Gnaphalium rectum. *Baub. hist. 3. p. 160.*

Oed. dan. t. 254.

By Uilenpas in de Klaver-landen; in de Boffchen
by Marquette; te Emmen in Overysfel; omtrent
Zumeer en Bergum, als elders in de Wouden
in Friesland; op Heide-velden; en aan zommige
wegen en wallen.

676. GNAPHALIUM caule herbaceo ramosissimo dif- *uliginosum.*
fuso, floribus confertis terminalibus. *Sp. 1200.*

n. 41. Gelr. 470. Frif. 350.

Gnaphalium medium. *C. B. Comm. boll. 45.*

Gnaphalium annuum serotinum, capitulis nigri-
cantibus in humidis gaudens. *Morif. hist. 3. p. 92.*

Gnaphalio vulgari similis. *Baub. hist. 3. p. 159.*

Klein Reur- of Roer-kruid. Belg.

Op vochtige plaatsen by Zelhem, Uilenpas, Har-
derwyk, en elders in Gelderland; by de Bilt
buiten Utrecht; op de Kley en in de Wouden in
Friesland; ook omtrent Zwo!

III. LINNEUS in *Flor. belg.* Gnaphalium medium
*C. B. Comm. boll. 45. habet pro Filagine arven-
fi; sed autopsia hanc esse plantam docet.*

C O N Y Z A.

677. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule herba- *squarrosa.*
ceo corymboso, calycibus squarrosis. *Sp. 1205.*

n. 1.

Coryza major vulgaris. Baub. pin. 265.

O 5

Don-

518 SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA.

Donder-kruid. Belg.
Veel buiten 's Hage.

ERIGERON.

- canadens.* 678. ERIGERON caule floribus paniculatis, hirtis, foliis lanceolatis ciliatis. Sp. 1214. n. 5. Gelr. 475.
 Conyzella. Dill. giff. 160. gen. 142.
 Conyza annua acris alba elatior, linearæ foliis. Moris. bist. 3. p. 115. f. 7. t. 20. f. 29. Becc. fico. 84. f. 46.
Langs de wegen by Arnhem, Harderwyk, Duurstede; in de Duinen van Raaphorst, en tusschen Velsen en Beverwyk; op de Muuren te Haarlem, &c.
Quotannis vulgatus.

- aer.* 679. ERIGERON pedunculis alternis unifloris. Sp. 1214. n. 9. Gelr. 474.
 Conyzacaulæa aeris. Baub. pin. 265. Comm. boll. 28.
 Amellus montanus æquilocorum. Col. scphr. 2. p. 25. t. 26.
Rlaauw-bytend Donder-kruid. Belg.
In de Koorn-velden, ook wel op oude Muuren omtrent Haarlem en Utrecht; in de Duinen tusschen 's Hage en het Huis ten Deil by de Hofstede Eikenhorst; by Overveen, en elders.

TUSSILAGO.

- Farfara.* 880. TUSSILAGO scapo unifloro imbricato, foliis subcordatis angulatis denticulatis. Sp. 1214. n. 5. Gelr. 475. Fris. 353.
 Tussilago vulgaris. Baub. pin. 197. Comm. boll. 113.
 Tussilago. Baub. bist. 3. p. 163. Moris. bist. 3. p. 130. f. 7. t. 12. f. 1.
Oed. dan. t. 595.
Hoefblad, Paarden-Klaauw. Belg.
Op vele plaatsen, alwaar klei-grond is, in de Bouwlanden en aan de Dyken.
 Pharm. TUSSILAGINIS rad herb.

- hybrida.* 681. TUSSILAGO thyrsis oblongo, flosculis femineis nudis

SYNCHENESTA POLYG. SUPERFLUA 219

nudis plurimis. Sp. 1214. n. 8. Gehr. 478. Fris. 354.

Petasites major, floribus pediculis longis infidentibus, Dill. elsb. 309. t. 32. f. 297.

Pestilentie-wortel, Dakke-bladen. Belg.

Podde-bladen. Vulgo.

Te Arnhem op de Glacis; te Westervoort op de Schans; by Harderwyk in de Westheeg aan de Hoven, en omtrent Biele; aan de Maart tusschen Rotterdam en Overschie; en by Delft; buiten Utrecht tusschen Breukelen en de Nieuwersluis; in Friesland by Herbajum, Dronkryp, overvloedig aan 't Bolwerk te Leeuwarden; aan de dykjes in de witteheeg te Haren by Groningen.

682. Tussilago thyris ovato, flosculis femineis nudis paucis. Sp. 1215. n. 9. Gehr. 477.

Petasites major & vulgaris. Baub. pin. 197. Comm. bok. 87.

Petasites. Dod. pempt. 597.

Belg. uit praecedens.

Aan de Dyken en Wegen om Tiel, en in 't Stift Sennewynen in de Tielerwaard; in de landen nader Herden buiten Harderwyk; by 't Dorp Voorst op de Veluwe; aan den Dyk by Rotterdam en Gouda; te Elshout over Krimpen aan de Leeg; buiten Haarlem aan de Hanzepaterslaan.

Pharm. PETASITINIS rad.

Locus crescendi inter Breukelen & Nieuwersluis a Commelino assignatus pertinet ad praecedentem plantam.

S E N E C I O.

683. SENECIO corollis nudis, foliis pinnato-filiatis vulgaris. amplexicaulibus, squibaa sparsis. Sp. 1216. n. 7. Gehr. 483. Fris. 355.

Senecio minor vulgaris. Baub. pin. 191. Comm. boll. 105.

Erigerum minus. Dod. pempt. 641.

Oed. dan. f. 513.

Klein Grind-kruid, Kruis-kruid, Kruis-wortel.

Belg.

Schaaps-teenjes. Moes. Trajectijns.

Zeer gemeen in de Moes-boven, en Zaai-landen, en

320 SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA.

en by de Wegen.
Pharm. *SENECIONIS* herb.

- viscosus.* 684. *SENECIO* corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Sp.* 1217. *n.* 12. *Fris.* 356.
Senecio incanus pinguis. *Baub. pin.* 131. *Comm. boll.* 105.
Senecio hirsutus viscidus graveolens. *Dill. elth.* 347. *t.* 258. *f.* 336.
Erigerum primum. *Dod. pempt.* 640.
Stinkend Kruis-kruid. Belg.
Veel aan de St. Antonis-Dyk buiten Amsterdam, en aan de Zwart-Waters-dyk.

- hyssiculus.* 685. *SENECIO* corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymbose erecto. *Sp.* 1217. *n.* 13.
Senecio minor, latiore folio, sive montanus. *Baub. pin.* 131. *Dill. elth.* 258. *t.* 258. *f.* 337.
Jacobæa, senecionis folio incano, perennis. *Raj. bist.* 285. *Hall. jen.* 177. *t.* 3.
In Holland niet zeldzaam: word gevonden in de Bosschen van de Hofsteden Zandhorst en Marquette, en in de Zaa-landen by 't Derp Heemskerk in Noord-Holland, en by 't Huis te Teilingen. (*Nob. D. FABRICIUS SIX.*)
Antecessores de hac planta mentionem non fecerunt forsitan quod eam confuderunt cum senecione viscosa.

- Jacobæa.* 686. *SENECIO* corollis radiantibus, foliis pinnatolyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Sp.* 1219. *n.* 25. *Gelk.* 482. *Fris.* 357.
Jacobæa vulgaris laciniata. *Baub. pin.* 131. *Comm. boll.* 60.
Jacobæa. *Dod. pempt.* 642.
St. Jacobs-kruid. Belg.
Grondbeel. Groningans.
Senecio jacobææ folio. *Morif. blef.* 309. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 117.
Overvloedig in de Wei-landen. β. Op. dorre zandgronden.
Varietas β. ex natura soli provenit, nequaquam igitur pro distincta specie, multo minus alio genere

SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA. 221

habenda cum Matthiolo & aliis. Conf. Baub. bist.
3. p. 1037.

Varietatem foliis variegatis legi circa Uilenpaffiam.

687. *SENECIO* corollis radiantibus, foliis ensiformi-*paludosus*-
 bus acute ferratis subtus subvillosis, caule stricto.

Sp. 1220. n. 29. Gelr. 635.

Jacobæa foliis longis integris & mucronatis. *Morif.*
bist. 3. p. 110. f. 7. t. 19. f. 22.

Conyza palustris ferratifolia. Baub. pin. 266.

Oed. dan. t. 385.

*Hier en daar in de Kolken buiten Tiel; aan den Ryn
 by Maurik in de Betuwe; in de Droogmakeryen
 by Rotterdam, en elders; aan de binnen Kolken
 te Herkeloo in Overysfel.*

688. *SENECIO* corollis radiantibus, floribus corym-*saracenicus*-
 bosis, foliis lanceolatis ferratis glabriusculis.

Sp. 1221. n. 32. Gelr. 481.

Solidago saracenicæ. Dod. pempt. 141. Fuchsf. bist.
728. Baub. bist. 2 p. 1062.

Virga aurea angustifolia ferrata. Baub. pin. 268.

Comm. boll. 115.

Heidens Wond - kruid. Belg.

Fanekley. Quibusdam.

*Veel aan de Waal - Dyk by Nymegen en Tiel; aan
 de Maas - Dyken; en aan den Yssel - Dyk by
 Gouda, Deventer, Zwol, Campen, &c.*

Pharm. SOLIDAGINIS SARACENICÆ herb.

A S T E R.

689. *ASTER* foliis lanceolatis integerrimis carnosissimis *Tripolium*-
 glabris, ramis inæquatis, floribus corymbosis.

Sp. 1226. n. 9. Gelr. 484. Frisf. 358.

Tripolium majus cæruleum. Baub. pin. 267. Comm.
boll. 112.

Tripolium. Dod. pempt. 379.

Zee - Aster of Zee - Sterre - kruid. Belg.

f. Tripolium majus, flore albo. Comm. boll. 112.

*Veel aan de Noord - en Zuider - Zee - kant; langs de
 Maas agter 's Gravezand; aan den Amstel om-
 trent Amsterdam, en aan de Haarlemmer - Vaart;
 in overstroomde landen by Franeker, Bergum,
 Groningen, Delfzyl, &c.*

In

222 SYNGENESIA POLYC. SUPERFLUA.

In Comm. boll. edit. 1709. Trifolium majus cæruleum legendum Tripolium majus cæruleum.

S O L I D A G O.

Virgaurea. 690. SOLIDAGO caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Sp.* 1235. n. 9. *Gelr.* 480.

Virga aurea angustifolia minus serrata. *Baub. pin.* 268.

Virga aurea. *Dod. pempt.* 142.

Virga aurea vulgaris latifolia. *Baub. bist.* 2. p. 1062.

Gulde-Roede. Belg.

Veel in de Boffchadien aan de Nunspeeter-beek buiten Elburg; tuffchen Amerongen en Elft in 't Sticht van Utrecht, en agter den Kranenborg by Zwol.

Pharm. VIRGÆ AURÆE herb.

C I N E R A R I A.

palustris. 691. CINERARIA floribus corymbosis, foliis lato-lanceolatis dentato-sinuatis, caule villoso. *Sp.* 1243. n. 6.

Othonna palustris. *Gelr.* 638. *Fris.* 371.

Conyza aquatica laciniata. *Baub. pin.* 266. *Comm. boll.* 28.

Conyza mediæ species altera. *Dod. pempt.* 52. *Oed. dan. t.* 573.

In de Moerassen om Tiel, en by Uilenpas en Boedelhof in 't Graaffchap Zutphen; ook omtrent Amsterdam en Utrecht; aan 't Gain tuffchen Ouderkerk en de Voetangel; overvloedig buiten 's Hage in een Poel op Staalduin; buiten de Helder in de boek van 't doog; in de Schermer in Noord-Holland; by Donfega, Eefterga, Vollega, &c. in Friesland.

I N U L A.

Oculus. Cristii. 692. INULA foliis amplexicaulibus oblongis integris hirsutis, caule piloso corymbofo. *Sp.* 1237. n. 5.

Gelr. 485. *Fris.* 359.

Conyza pannonica lanuginosa. *Baub. pin.* 265. *Comm.*

SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA. 223

Comm. bell. 28. Moris. bist. 3. p. 113. f. 7. t. 19.

Overvloedig buiten Haarlem naar Overveen; in de Duinen ooster Zorgvliet, en tusschen beide Katwyken; en aan sommige Wegen en Heidevelden omtrent 't Heereveen in Friesland.

693. *INULA* foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, *dysenterica* caule villoso paniculato, squamis catycinis for-
taceis. *Sp. 1237. n. 7. Gelr. 636. Fris. 360.*

Conyza media asteris flore luteo, vel tertia discoridis. *Baub. pin. 265.*

Conyza media matthioli, flore magno luteo, humidis locis proveniens. *Baub. bist. 2. p. 1050.*

Conyza l. Tabern. bist. 1243.

Oed. dan. t. 410.

Gemeen Donder-kruid. Belg.

Heel-blaadtjes. Rusticis.

Aan de Syfels by Harderwyk; aan de kanten der Sloeten by Wyk by Duurstede, Amerongen, Franeker, langs de Wegen tusschen de laage landen in Dieze in Overysiel.

694. *INULA* foliis amplexicaulibus undulatis, caule *Pulicaria* prostrato, floribus subglobosis radio brevissimo.

Sp. 1238. n. 9. Gelr. 473.

Conyza minor, flore globoso. *Baub. pin. 266.*

Conyza minima. Dod. pempt. 52.

In Overysiel te Westerholce in de laagte by Heinshuis.

A R N I C A.

695. *ARNICA* foliis ovatis integris: caulinis geminis *montana* oppositis. *Sp. 1245. n. 1. Gelr. 479. Fris. 361.*

Arnica lapforum panacea. Eph. Nat. Cur. Dec. 1.

Ann. 9. p. 22. t. 3.

Doronicum, plantaginis folio, alterum. *Baub. pin. 263.*

Oed. dan. t. 63.

Woloverley, Groot Luciaan-kruid, Val-kruid, Woudkruid Belg.

Veel, op de Stads-weide by Harderwyk; in ééne weide by Uilenpas; en op Zuideras, op de Heide by Selhem, en elders in 't Graafschap Zutphen; op de Heidevelden, omtrent Bergum, Oudega, Au-

324. SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA.

Augustinisga en Heerenveen in Friesland; en
by de Harender-moolen buiten Groningen.

Pharm. ARNICE rad. herb. flor.

Herbam in Cerevisia coctam Rustici pro vulnerario
interne adhibent.

B E L L I S.

parvulis. 696. BELLIS scapo nudo. Sp. 1248. n. 1. Gelr. 494.

Fris. 362.

Bellis sylvestris minor. Baub. pin. 261. Boerb.
lugdb. 1. p. 108.

Bellis sylvestris. Dod. pempt. 265.

Oed. dan. t. 503.

Maagdelieven, May-zoetjes, Margarieten. Belg.
Kransjes. Harlemensibus.

Fenne-bloemen. Frits.

Overvloedig in de Weiden.

Pharm. BELLIDIS herb. flor.

Variat petalis ex candido & rubro mistis; ex candido
rubris; disco rubris, radio albis. Vidi etiam plantas
spontaneas flore pleno.

In Commelini Catalogo omissa.

C H R Y S A N T H E M U M.

Leucanthemum. 697. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus
oblongis: superne serratis; inferne dentatis.

Sp. 1251. n. 4. Gelr. 486. Fris. 363.

Bellis sylvestris, caule folioso, major. Baub. pin.
261. Comm. boll. 15.

Bellis major. Cam. epit. 635. Dod. pempt. 265.

Groote Maagdelieven, of Ganze-bloemen. Belg.

Wammis-knoopen of Wambuis-knoopen. Arnhem-
ensibus.

In en aan de Zaai-landen op veele plaatsen.

Segetum. 698. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus:
superne laciniatis; inferne dentato-serratis.

Sp. 1154. n. 15. Gelr. 487. Fris. 364.

Chrysanthemum segetum. Clus. bist. 1. p. 334.

Bellis hutea, foliis profunde incisis, major. Baub.
pin. 262. Comm. boll. 15.

Vokelaar- of Gtele Ganze-bloemen. Belg.

In zandige Bruu-landen op veele plaatsen.

Va.

SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA. 225

*Variat interdum foliis minoribus, floribusque ex albo
& luteo variegatis. Boerb. lugdb. 1. p. 106. n.
10 & 11.*

M A T R I C A R I A.

699. MATRICARIA foliis compositis planis: foliolis *Parthenium*
ovatis incisif, pedunculis ramolis. *Sp.* 1255. n.
1. *Gelr.* 488.
Matricaria vulgaris seu fativa. Baub. pin. 133.
Matricaria sylvestris flore toto luteo. C. B. Comm.
boll. 72.
Matricaria. Dod. pempt. 35.
Mater, Moeder - kruid. Belg.
Komt van zelfs voort in de Hoven, ook aan oude
Muuren, en op ruwe steenachtige plaatsen.
Pharm. MATRICARIÆ herb. flor.

700. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis pa- *Chamomilla*
tentibus, squamis calycinis margine æqualibus.
Sp. 1256. n. 3. *Gelr.* 489.
Chamæmelum vulgare, Leucanthemum dioscori-
dis. Baub. pin. 135.
Chamæmelum vulgare. Dod. pempt. 257.
Camille. Belg.
Overvloedig in de Zaai - landen op veele plaatsen.
Pharm. CHAMÆMELI VULGARIS herb. flor.

701. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis de- *suaveolens.*
flexis, squamis calycinis margine æqualibus. *Sp.*
1256. n. 5. *Fris.* 366.
Matricaria leucanthemos annua suaveolens, cha-
mæmeli folio, ovariis albicantibus. Vaill. act.
1720. p. 370.
Welruikende Camille. Belg.
Op veele plaatsen in de Bouw - landen.
Non confundenda cum Anthemide nobili.

A N T H E M I S.

702. ANTHEMIS receptaculis conicis: paleis lance- *arvensis.*
olatis, seminibus coronato-marginatis. *Sp.* 1261.
n. 8. *Gelr.* 637.
Chamæmelum inodorum. Baub. pin. 135. *Rupp.*
jen. 173.

P

Wil.

226 SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA.

Wilde Camille. Belg.

Op veel plaatsen langs de Wegen en Akkers.

- Cotula.* 703. *ANTHEMIS* receptaculis conicis: paleis setaceis, feminibus nudis. Sp. 1261. n. 10. Gelr. 491. Fris. 367.

Chamæmelum foetidum. Baub. pin. 135. Comm. boll. 24.

Cotula foetida. Dod. pempt. 258.

Padde-bloem, Stinkende Camille, Koedille. Belg.

Langs de wegen omtrent Amsterdam, Utrecht; in de Wouden en op de Kley in Friesland; aan de Muyder-en Yseldyk, en elders.

- valentina.* 704. *ANTHEMIS* caule ramofo, foliis pubescentibus tripinnatis setaceis, calycibus villosis pedunculatis. Sp. 1262. n. 14. Gelr. 490.

Bupthalmum cotulæ folio. Baub. pin. 134. Comm. boll. 18.

Bupthalmum alterum penæ. Dalech. hist. 863.

Te Campen aan de Muuren.

- tinctoria.* 705. *ANTHEMIS* foliis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymbofo. Sp. 1263. n. 17. Fris. 138.

Bupthalmum tanacetii minoris foliis. Baub. pin. 134. Comm. boll. 18.

Chrysanthemum foliis tanacetii. Loef. pruss. 47. t. 9.

Koe-Ooge. Belg.

Op oude Muuren te Utrecht en in andere plaatsen.

A C H I L L E A.

- Parmica.* 706. *ACHILLEA* foliis lanceolatis acuminatis argute serratis. Sp. 1266. n. 13. Gelr. 493. Fris. 368.

Dracunculus pratensis, serrato folio. Baub. pin. 98. Comm. boll. 32.

Draco sylvestris sive Parmica. Dod. pempt. 710.

Wilde Dragon, Wilde Bertram. Belg.

Langs de gruppels der Bouw-landen te Zandwyk by Tiel; langs de wegen by Uilenpas en elders in 't Graafschap Zutphen; in de Meben by Harderwyk, Nykerk, &c. in den Aardenbouts-Laan buiten Haarlem; aan de Kade buiten de Leuterpoort

SYNGENESIA POLYG. SUPERFLUA. 227

poort te Wyk by Duurstede; omtrent Haskerdyken, Heerenveen, Wollega, en elders in de Wouden in Friesland.

Pharm. PTARMICÆ VULGARIS berb.

707. *ACHILLEA* folijs bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus superne sulcatis, *Millefolium*
Sp. 1267. n. 18. *Gerl.* 492. *Frugr.* 139. *Fris.* 369.
Millefolium vulgare album. *Baub.* pin. 140. *Comm.*
boll. 76.

Millefolium five *Achillæa*. *Dod. pempt.* 100.

Haaze-Gerwe, Geruwe, Duizend-blad. Belg.

- β. *Millefolium purpureum majus.* *Baub.* pin. 140.
Boerb. lugdb. 1. p. 112.

- γ. *Millefolium purpureum minus.* *Baub.* pin. 140.
Comm. boll. 76. *Boerb. lugdb.* 1. p. 112.

Langs de Wegen, aan de kanten der Akkers, en in de Weiden op veele plaatsen.

Pharm. MILLEFOLII berb.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

C O R E O P S I S.

708. *COREOPSIS* folijs lanceolatis serratis oppositis *Bidens.*
amplexicaulibus. *Sp.* 1281. n. 4.

Chrysanthemum aquaticum bidens, folio non diviso, flore aureis petalis undique radiato. *Morif. bist.* 3. p. 17. f. 6. t. 5. f. 25.

In de Slooten van 't Haagse-Bosch, en elders.

C E N T A U R E A.

709. *CENTAUREA* calycibus ciliatis: squamula ovata; *nigra.*
ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angulatis, floribus flosculosis. *Sp.* 1288. n. 11.

Jacea nigra laciniata. *Baub.* pin. 271. *Boerb. lugdb.*

1. p. 142. (non *Commelini. Vide Centauream Jaceam.*)

Jacea austriaca VI. *Clus. bist.* 2. p. 7.

† Volgens BOERHAAVE.

258 SYNGENESIA POLYG. FRUSTRANEA.

- Cyanus.* 710. *CENTAUREA* calycibus ferratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Sp.* 1289. n. 14. *Gelr.* 495. *Fris.* 370.
Cyanus segetum. *Baub. pin.* 273. *Comm. boll.* 30.
Cyanus vulgaris. *Lob. ic.* 546.
Koorn-bloemen, Rogge-bloemen. Belg.
Veel tusschen 't Koorn.
Pharm. CYANI flor.
Variat interdum corollæ colore albo, purpureo, incarnato, violaceo, rubro, &c.
- Scabiosa.* 711. *CENTAUREA* calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis. *Sp.* 1291. n. 22. *Jngr.* 140.
Scabiosa major, squamatis capitulis. *Baub. pin.* 269.
Centaureum collinum gesneri, flore purpureo.
Baub. bist. 3. p. 32.
Habitat in pratis aridioribus Belgii. (Linn. b. Cliff. 422.
- Jacea.* 712. *CENTAUREA* calycibus scariosis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis: ramis angulatis. *Sp.* 1293. n. 29. *Gelr.* 492.
Jacea nigra pratensis latifolia. *Baub. pin.* 271.
Jacea nigra laciniata. *C. B. Comm. boll.* 60.
Oed. dan. t. 519.
Knoop-kruid. Belg.
Veel in de Bouw-en Wei-landen buiten Harderwyk, 's Hage, Haarlem, Zwol; aan de Lek-Dyk; aan de dykjes te Haren by Groningen; ook op de Heide.
Commelinus perperam Jaceam nigram laciniatam C. B. quæ est Centaurea nigra, pro hac planta posuit. Ceterum synonyma vix distinguenda.
- Calcitrapa.* 713. *CENTAUREA* calycibus subduplicato-spinosis sessilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloso. *Sp.* 1297. n. 44. *Gelr.* 496.
Carduus stellatus, foliis papaveris erratci. Baub. pin. 387. *Comm. boll.* 21.
Carduus stellatus. Dod. pempt. 733.
Carduus muricatus vulgo Calcitrapa dictus. Clus. bist. 2. p. 7.
Sterre-Distel. Belg.
Op verscheide plaatsen aan de Dyken, tusschen Muiden

SYNGENESIA POLYG. FRUSTRANEA. 229

den en Naarden; ook aan den Yssel-dyk in Gel-
derland en Overysfel by Campen, &c.

POLYGAMIA NECESSARIA.

FILAGO.

714. FILAGO floribus acaulibus sessilibus, foliis flo. acaulis.
ralibus majoribus. *Sp.* 1311. n. 1.

Filago maritima, capite folioso. *Tourn. inst.* 454.
Boerb. lugdb. 1. p. 119.

Gnaphalium roseum sylvestre. *Baub. pin.* 263.
prodr. 122.

Gnaphalium umbellatum minimum. *Baub. bist.* 3.
p. 162.

† Volgens BOERHAAVE.

715. FILAGO panicula dichotoma, floribus rotunda-*germanica.*
tis axillaribus hirsutis, foliis acutis. *Sp.* 1311.
n. 2. *Gelr.* 469.

Filago seu Impia. *Dod. pempt.* 66.

Gnaphalium vulgare majus. *Baub. pin.* 263. *Comm.*
holl. 45.

Reur- of Roer-kruid. Belg.

In de Zaai-landen en Moes-boven; veel op zandige
plaatsen by 's Heeren-Loo buiten Harderwyk;
en langs de Wegen buiten Groningen.

716. FILAGO caule subdichotomo erecto, floribus *montana.*
conicis terminalibus axillaribusque. *Sp.* 1311. n.

4. *Fris.* 352.

Gnaphalium minus repens. *Baub. pin.* 263.

Gnaphalium minimum. *Lob. ic.* 481. *Baub. bist.* 3.
p. 159. *Pet. herb. t.* 18. f. 11.

Klein kruipend Roer-kruid. Belg.

Op zandige Wegen en op Zaai-landen by Oude-
Schoot, Rottum, Katlyk, en elders in de
Woud-kant in Friesland.

717. FILAGO caule dichotomo erecto, floribus *sub-gallica.*
latis axillaribus, foliis filiformibus. *Sp.* 1312.

n. 5.

30 SYNGENESIA POLYG. NECESSARIA.

- Filago vulgaris tenuissimo folio erecta. Tourn. inst. 454. Boerb. lugdb. 1. p. 119.*
Gnaphalium vulgare tenuifolium. Baub. bist. 3. p. 159.
Gnaphalium vulgare medium. Moris. bist. 3. f. 7. t. 11. f. 14. Pet. herb. t. 18. f. 12.
 † Volgens BOERHAAVE.

- arvensis.* 718. *FILAGO* caule paniculato, floribus conicis lateralibus. *Sp. 1312. n. 6.*
Filago altera. Dod. pempt. 67. absque icone. Boerb. lugdb. 1. p. 119.
Gnaphelium majus angusto oblongo folio. Baub. pin. 263.
By Uilenpas, Keppel en elders in 't Graaffschap Zutphen.

M O N O G A M I A.

J A S I O N E.

- montana.* 719. *JASTIONE. Sp. 1317. n. 1. Gehr. 498. Fris. 372.*
Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. Baub. pin. 92. Comm. bolk. 98.
Scabiosa minor. Dod. pempt. 122.
Oed. dan. t. 319.
Schaaps - Scabiosa. Betg.
Veel langs de Wegen by Uilenpas, Harderwyk, Wageningen, Amerongen, &c. in de Duinen by Haarlem en Alkmaar; in de Zaatlanden by Velsen; in de Wouden in Friesland; in de Noord-lasender effen, en elders aan de dykjes in 't Gorecht buiten Groningen; en op andere plaatsen op dorre zandige gronden,

L O B E L I A.

- Dortmanna* 720. *LOBELIA* foliis linearibus bilocularibus integerrimis, caule subnudo. *Sp. 1318. n. 3.*
Dortmanna palustris, floribus sparsis pendulis. Rudb. bot. ups. 1740. p. 97. t. 2. opt.

Gla-

SYNGENESIA MONOGAMIA. 231

- Gladiolus aquaticus* f. *Gladiolus palustris*. *Dod. bist.* 950.
Leucojum palustre, flore subcæruleo. *Baub. pin.* 202.
Oed. dan. t. 39.
In de Slooten by 't Dorp Westerveld en Narch in Drenthe. (*Linn. b. Cliff.* 426.) *By Zwol.* (*Bruman. zuoll.* 11.)

V I O L A.

721. *VIOLA* acaulis, foliis cordatis, stolonibus rep-^{odorata.}
 tantibus. *Sp.* 1324. *n.* 8. *Gelr.* 500. *Fris.* 373.
Viola martia purpurea, flore simplici odore. *Baub.*
pin. 199. *Comm. boll.* 115.
Viola martia purpurea. *Dod. pempt.* 156. *t.* 1. 2.
Oed. dan. t. 309.
Tammen Blaauwe Violen. Belg.
Styfmoertjes. quibusdam.
 f. *Viola martia alba.* *Baub. pin.* 199.
Overvloedig in de Boschadien in de Tielerwaard;
te Welfum, Oen, en daar omtrent in Gelderland;
ook by Zutphen en Amersfoort; in eenige Duin-
Valeyen buiten Haarlem; op verscheide plaatsen in
Friesland; te Holten in Overysfel; veelaan de
Stads-wal te Groningen, ook te Haren en Onnen;
en elders. β Op 't Nieuwe-werk by Rotterdam,
en aan de Wegen omtrent Wyk by Duurstede.
Pharm. VIOLARIÆ herb. flor. sem.
 722. *VIOLA* caule adaltiore adscendente, foliis^{canine.}
 oblongo-cordatis. *Sp.* 1324. *n.* 9. *Gelr.* 499.
Fris. 374.
Viola martia inodora sylvestris. *Baub. pin.* 199.
Comm. boll. 115.
Viola cærulea martia inodora sylvatica, in cacu-
mine semen ferens. *Baub. bist.* 3. *p.* 543.
Wilde Violen. Belg.
In de Mehen by Harderwyk; in de Boschen by Put-
ten, Clarenbeek, Uilenpas, en elders in Gel-
derland en Overysfel; overvloedig in de Duin-
valeyen; en laage natte grieven by Harkama-
opeinde; en op verscheide plaatsen onder geboomte
by Donkerbroek, Haule en Oosterwoude in
Friesland.

532 SYNGENESIA MONOGAMIA.

- tricolor.* 723. *VIOLA* caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisfis, stipulis pinnatifidis. *Sp.* 1326. n. 15. *Gelr.* 501. *Fris.* 375.
Viola bicolor arvensis. *Baub.* pin. 200. *Comm.* boll. 115.
Wilde Penſeen of *Violtjes.* Belg.
 β. *Viola* tricolor. *Dod. pempt.* 158. *Renealm. spec.* 144. t. 140.
Viola tricolor hortensis repens. *Baub.* pin. 199. *Comm.* boll. 115.
 γ. Eadem flore albo & luteo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 244.
 δ. Eadem flore pallide cæruleo; purpureo & luteo. *Boerb.*
Veel aan de binnenweg tuſſchen Harderwyk en Hierden; in de Duin-valeyen op dorre zandige gronden; omtrent Balk; Wykel. Heerenveen, en elders in de Wouden in Friesland.

I M P A T I E N S.

- Nolitange- re.* 724. *IMPATIENS* pedunculis multifloris ſolitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Sp.* 1329. n. 7. *Gelr.* 502.
Impatiens herba. *Dod. pempt* 659.
Balsamina lutea ſive *Noli me tangere.* *Baub.* pin. 306. *Comm.* boll. 15.
Oed. dan. t. 588.
Kruidje roer my niet. *Spring-kruid.* Belg.
In Gelderland bier en daar aan de kanten der Slooten om Tiel; in 't Boſch van Uilenpas, en by den Engelenborg, te Ermello op de Paſtory aan de kant van een ſloot; buiten Haarlem in het Schaa-pen-boſch, en op 't Bent-veld; te Paterwolde in 't Landſchap Drenthe.

C L A S S I S XX.

G Y N A N D R I A.

D I A N D R I A.

O R C H I S.

725. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio lanceo-*bifolia*.
lato integerrimo: cornu longissimo, petalis pa-
tentibus. *Sp.* 1331. n. 8. *Ingr.* 143. *Fris.* 376.

Orchis radicibus oblongis, labello lineari. *Hall.*
bist. 1285. t. 35.

Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Baub.*
pin. 83. *Comm. boll.* 82. *Vaill. par.* 151. t. 30.
f. 7. *Segu. ver.* t. 15. *f.* 10.

Orchis serapias primus. *Dod. pempt.* 237.

Balletjes - kruid, Standel - kruid, Vosse - kulletjes.
Belg.

Oed. dan. t. 235.

*In de Zee - Dain - Valeyen agter Hillegom; op Staal-
duin by 's Gravenhage; en op Hei-velden in de
Wouden in Friesland.*

726. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio bicorni *pyramida-*
trifido æquali integerrimo: cornu longo, petalis
sublanceolatis. *Sp.* 1332. n. 12.

Orchis radicibus subrotundis, spica densa calcare
longissimo, labello bicorni æqualiter tripartito.
Hall. bist. 1286. t. 35.

Orchis flore glomerato. *Riv. hex. t.* 14.

Orchis purpurea spica congesta pyramidalis. *Segu.*

ver. t. 15. f. 11.

Cynosorchis militaris montana, spica rubente-conglomerata *Baub. pin. 813. prod. 28.*

By 's Gravenhage, en in de Velden langs de Duinen. (Linn. b. Cliff. 429.)

Morio. 727. *ORCHIS* bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato; cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. *Sp. 1333. n. 16. Gelr. 504. Fris. 377.*

Orchis radicibus subrotundis, galeæ petalis linearis, labello trifido crenato, medio segmento emarginato. *Hall. bist. 1282. t. 33.*

Orchis morio femina. Baub. pin. 82. Comm. boll. 82. Vaill. par. t. 31. f. 13. 14. Segu. ver. t. 15. f. 7.

Orchis angustifolia. Riv. hex. t. 19.

Oed. dan. t. 253.

Kulletjes-kruid. Belg.

Volg my na. Groninganis.

By Harderwyk en Doornspyk in vochtige landen; by Alkmaar op den weg naar Egmond, in de Velden; in 't Sticht van Utrecht, en in Friesland op verscheiden plaatsen; by Haren in 't witteween; ook in de veenlanden langs 't Horensche diep, en by de Harender-malen in 't Heide-veld buiten Groningen.

Pharm. SATYRII FEMINE rad.

Variat corollarum colore purpureo carneo, albo &c.

Boerb. lugdb. 2. p. 152.

mascula. 728. *ORCHIS* bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato; cornu obtuso, petalis dorsalis reflexis. *Sp. 1333. n. 17.*

Orchis radicibus subrotundis, petalis lateralibus reflexis, labello trifido, segmento medio longiori bifido. *Hall. bist. 1283. t. 33.*

Orchis morio mas, foliis maculatis. Baub. pin. 81. Comm. boll. 82. Vaill. par. t. 31. f. 11.

12. Palmata major. Riv. hex. t. 10.

Oed. dan. t. 457.

By de voorgaande; ook in de pannen der Duinen op Staalduin by 's Gravenhage. Haarlem, en in Brees-Aap.

Pharm.

Pharm. SATYRII MARIS rad.

729. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinque-
fido punctis scabro: cornu obtuso, petalis con-
fluentibus. Sp. 1333. n. 19.

Orchis radicibus subrotundis, spica conica, la-
bello quadrifido brachiolis & pectore perangu-
stis. Hall. bist. 1277. t. 28.

Orchis galea & alis fere cinereis. Baub. bist. 2.
p. 755.

Orchis latifolia, hiantе cucullo, major. Moris.
bist. 3. p. 490. Vaill. par. 148. t. 31. f. 21.

Orchis mascula. Riv. hex. t. 15. 16.

Cynoforchis latifolia, hiantе cucullo major. Baub.
pin. 80. Comm. boll. 82. (sub. Orchide.)

Honds-kulletjes. Belg.

♂. Orchis latifolia, hiantе cucullo, altera. Tourn.
inst. 432. Boerb. lugdb. 2. p. 152. Vaill. par. t.
31. f. 22. 23. 24.

Op grasachtige plaatsen, in Koeymans-Bosch.

730. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cor-
latifolia. nu conico: labio trilobo lateribus reflexo,
bracteis flore longioribus. Sp. 1334. n. 21. Gelr.
503.

Orchis radicibus palmatis, caule fistuloso, bracteis
maximis, labello trifido serrato, medio segmento
obtusо. Hall. bist. 1279. t. 32.

Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcari-
bus. Baub. pin. 85. Comm. boll. 83. Vaill. par.
t. 31. f. 1. 2. 3. 4. 5.

Oed. dan. t. 266.

Handekens-kruid. Belg.

♀. Orchis palmata palustris latifolia. Baub. pin. 86.
Comm. boll. 83.

Palmata palustris latifolia. Riv. hex. t. 19.

Satyrion basilicum foliosum. Eod. pempt. 241.

Water-Handekens-kruid. Belg.

γ. Orchis palmata pratensis maculata. Baub. pin. 85.

In de Duin-valeyen. 4. in de Meben en Hooi-
landen by Harderwyk, Nykerk, &c. Tusschen den
Overtoom en Amstelveen buiten Amsterdam; in
de moerassen by Groningen. γ. Overvloedig in de
Meben by Harderwyk; op de Het-velden en in
laage Wei-landen omtrent Bergum, Oosterveer,
Eest.

Estrum, en elders in de Wouden in Friesland;
ook overvloedig in de Provintie Groningen en
Omlanden.

Variet. etiam corollis carneis. & albis.

maculata.

731. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus brevioribus: labio plano, petalis dorsalibus erectis. *Sp. 1335. n. 24. Galx. 639. Fris. 378.*

Orchis radicibus palmatis, caule solido, labello trifido serrato, medio segmento acuminato.

Hall. bist. 1278. t. 32.

Orchis palmata montana maculata. *Baub. pin. 86.*

Vailk. par. t. 31. f. 9. 10.

Orchis palmata pratensis maculata. *C. B. Comm. boll. 83.*

Palmata maculata. *Riv. hex. t. 8. 11.*

Koekkoeks - Bloemen. Zutphaniensibus.

In de Velden by Zutphen; in de Meben by Harderwyk; buiten Haarlem by 't Kraayenest aan de koediefsvaart; in de Wouden in Friesland, en Groningen.

Distinguitur a precedenti caule non fistuloso, bracteis flore non longioribus, et reliquis notis ab Ill. Hallero traditis.

conspicua.

732. ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longiore: labio trifido, petalis duobus patentissimis. *Sp. 1335. n. 26.*

Orchis radicibus palmatis, calcare longissimo, labello trifido obtuso unicolore. *Hall. bist. 1287. t. 29.*

Orchis palmata minor, calcaribus oblongis. *Baub. pin. 85. Vailk. par. 153. t. 30. f. 8. 8.*

Orchis angustifolia non maculata. *Riv. hex. t. 11.*

Oed. dan. t. 224.

In de Duin-valeyen; ury overvloedig by Raaphorst.

S A T Y R I U M.

viride.

733. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis, nectarii labio lineari trifido: intermedia lacinia obsoleta. *Sp. 1337. n. 2.*

Orchis radicibus palmatis, galea connivente, label-

- bello trifulco, calcare brevissimo. *Hall. bist.*
1269. t. 26.
Orchis palmata, flore viridi. *Baub. pin.* 26. *prodr.*
30.
Orchis palmata flore galericulato dilute viridi.
Loef. pruss. 182. t. 56.
Oed. dan. t. 77.
In de Valeyen op Staal - duin by 's Gravenhage.
(*Cel. SCHWENCKE.*)

O P H R Y S.

734. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ova-
tis, nectarii labio bifido. *Sp.* 1340. n. 5. *Gelr.*
506.
Ophris bifolia. *Baub. pin.* 87. *Comm. boll.* 82.
Epipactis foliis binis ovatis, labello bifido. *Hall.*
bist. 1291. t. 37.
Bifolium. *Riv. hex.* t. 7.
Pseudo-orchis bifolium. *Dod. pempt.* 242.
Twee-blad. Belg.
Oed. dan. t. 137.
In een Wei-land by Zuideras, en op de Hofftede
Blik buiten Zutphen; op de Stads - weide by
Harderwyk; in de Boschjes te Overveen; in de
pannen der Duinen achter Zorgvliet, en op veele
andere plaatsen aan de Duinkant van Holland;
op 't Woud tusschen Bergen en Egmond op den
Hoef buiten Alkmaar; in de Landen by Leerzum
in 't Sticht van Utrecht; in een Bosch by Frane-
ker; en elders.
735. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, foliis corda-
tis. *Sp.* 1340. n. 6.
Ophris minima. *Baub. pin.* 87. *prodr.* 31. *Comm.*
boll. 82.
Epipactis foliis binis cordatis, labello bifido,
postice bidentato. *Hall. bist.* 1292. t. 22. f. 4.
Bifolium minimum. *Baub. bist.* 3. p. 534.
In de Duin-valeyen achter Overveen, by Haarlem,
op opene luchtige plaatsen.
736. OPHRYS bulbo subrotundo, scapo nudo, foliis
lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dor-
salibus linearibus. *Sp.* 1341. n. 7.

Her-

Herninium bulbo infra radicato, nectarii labio bifido. *Linn. act. upf.* 1740. p. 31.

Orchis lilifolia minor sabuletorum zelandiae & bataviae. *Baub. bist.* 2. p. 770. figurae duae priores. *Comm. boll.* 83.

Chamaeorchis lilifolia. *Baub. pin.* 84.

Bifolium bulbosum *Dod. pempt.* 242.

Ebrat. act. angl. 1764. n. 53. p. 81. t. 4.

In Brees - Aap.

Monorchis. 737. *OPHRYs* bulbo globoso, scapo nudo, nectarii labio trifido cruciato. *Sp.* 1342. n. 11.

Orchis bulbo unico subrotundo, labello cruciformi. *Hall. bist.* 1262. t. 22. f. 3.

Orchis odorata moschata f. *Monorchis*. *Baub. pin.* 84.

Monorchis. *Micb. gen.* 30. t. 26. *Rupp. jen.* 421. t. 2.

Oed. dan. t. 102.

In de Duinen by Velsen. (Nob. D. FABRICIUS SIX.)

S E R A P I A S.

latifolia. 738. *SERAPIAS* bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Syst. edit.* 13. p. 678. n. 1.

Serapias Helleborine. *Sp.* 1344. n. 1. *Gelr.* 505.

Helleborine latifolia montana. *Baub. pin.* 186. *Comm. boll.* 57.

Epipactis sive *Helleborine*. *Cam. epit.* 889.

Epipactis foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis, labello lanceolato. *Hall. bist.* 1297. t. 40.

Damafonium flore mixto. *Riv. hes.* t. 4.

Oed. dan. t. 267.

Berg - Nieskruid. Belg.

β. *Helleborine* flore carneo. *Baub. pin.* 187. *Comm. boll.* 57.

γ. *Helleborine* altera, atra - rubente flore. *Baub. pin.* 186.

Op de zyde van 't Kraayenest, op de boogte by de Koediefs - vaart; veel op Uilenpas en Baank in 't Graafschap Zutphen; ook omtrent Zwol. β.

Op den weg van 't Kraayenest naar Heemstede op drooge zandige gronden. γ. Op Uilenpas.

GYNANDRIA DIANDRIA.

239

739. SERAPIAS bulbis fibrosis, foliis ensiformibus *longifolia*.
sessilibus, floribus pendulis. *Syst. edit.* 13. p.

679. (*Sp.* 1345. n. 3.)

Helleborine angustifolia palustris sive pratensis.

Baub. pin. 87. *Comm. boll.* 57.

Helleborine. *Riv. hex.* t. 3.

Epipactis foliis ensiformibus caulinis, floribus
pendulis, labello obtuso per oras plicato. *Hall.*
bist. 1296. t. 39.

Damasonium flore herbaceo, intus nonnihil can-
dicante. *Baub. bist.* 3. p. 317.

Oed. dan. t. 267.

*In de vochtige Duin-valeyen buiten Haarlem; by
den Hoef, Bergen, &c. buiten Alkmaar; en
agter Zorgvliet langs den weg naar Schevenin-
gen.*

740. SERAPIAS bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, *rubra*.
floribus erectis: nectarii labio acuto. *Syst. edit.*
13. p. 679.

Helleborine montana angustifolia purpurascens.

Baub. pin. 187. *Boerb. lugdb.* 2 p. 153.

Elleborines genus. 5. *Clus. pan.* 275.

Epipactis caule paucifloro, labello lanceolato
lineato, lineis undulatis. *Hall. bist.* 1299. t. 42.

Damasonium flore roseo. *Riv. hex.* t. 6.

Oed. dan. t. 345.

† Volgens BOERHAAVE.

H E X A N D R I A.

A R I S T O L O C H I A.

741. ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule erecto, *Clematidis*.
floribus axillaribus confertis. *Sp.* 1364. n. 20.

Aristolochia Clematidis recta. *Baub. pin.* 307.
Comm. boll. 12.

Aristolochia Clematidis vulgaris. *Clus. bist.* 2. p.
71.

Dunne Hol-Wortel, Sarratyns-kruid. Belg.

*Overvloedig op de Kamp van het Haaze-woud by de
Bronbergen by Zutphen; in de Duinen niet verre
van*

240 GYNANDRIA HEXANDRIA.

van Wyk op Zee op zommige plaatsen overvloedig;
langs een weg by de Beverwyk, die van de Her-
berg Romen naar de duinen loopt; overvloedig op
de Kruidberg by Brederode; ook om Utrecht.
Pharm. ARISTOLOCHIE VULGARIS rad.

P O L Y A N D R I A.

A R U M.

maculatum. 742. ARUM acaule, foliis hastatis integerrimis, spa-
dice clavato. Sp. 1370. n. 12. Gélr. 508.
Arum vulgare maculatum & non maculatum. Baub.
pin. 195. Comm. boll. 13.
Arum. Fuchf. bist. 69. Lob. ic. 597.
Oed. dan. t. 597.
Kalfsvoet, Aarons-baart. Belg.
By de Vos agter de Kanons-dyk buiten Zutphen;
in 't Bosch van den Uilenpas en by Ubbergen; op
Zandwyk by Tiel; te Dodeweerd by 't Huis den
Appelenburg; te Ochten in de Neder-Betuwe;
ook omtrent Leiden; in vochtige Else Boschjes by
't Huis te Brederode; in Neer-Langbroek in de
Provintie Utrecht; in 't Bosch op de Mickelhorst
by Groningen; en elders.
Pharm. ARI rad.

C A L L A.

palustris. 743. Calla foliis cordatis, spatha plana, spadice undi-
que hermaphrodito. Sp. 1373. n. 2. Gélr. 507.
Ingr. 147.
Dracunculus pulustris sive radice arundinacea
plinii. Baub. pin. 195. Comm. boll. 32. Merif.
bist. 3. p. 545. f. 13. t. 5. f. 23.
Dracunculus aquatilis. Dod. pempt. 330.
Oed. dan. t. 423.
Water-Slange-kruid. Belg.
In de Slooten en skaande Wateren by Oldbroek op de
Veluwe; tusschen Rotterdam en Gouda, langs
den Hoogen-dyk; en achter Westbroek by U-
trecht.

ZOS.

GYNANDRIA POLYANDRIA. 241

Z O S T E R A.

744. *ZOSTERA pericarpis sessilibus*. Sp. 1374. n. 1. *marina*.
it. W. goth. t. 4. f. 1. Gélr. 222. Fris. 379.

Fucus angustifolius ligulas referens. Baub. pin. 364.
Comm. boll. 38.

Fucus marinus secundus. Dod. pempt. 479.

Zee-Wiert of Wier, Zee-Nestelen. Belg.

Oed.-dan. t. 15.

Overvloedig omtrent 't Eiland Wieringen in de
Zuider-Zee.

745. *ZOSTERA pericarpis pedicellatis oliviformibus*. *oceanica*.

Mant. 123. Syst. 605. edit. 13. p. 691.

Alga angustifolia vitriariorum. Baub. pin. 364.

Alga marina. Lob. ic. 251.

By de voorige.

Confunditur facile cum *Zostera marina*, sed fructibus
pedunculatis, et radicibus in pilam complicatis
differt.

Z O S T E R A

invenit andiam...

...

...

...

...

...

...

...

...

Q

CLAS.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

ZANNICHELLIA.

- palustris.* 746. ZANNICHELLIA. *Sp.* 1375. n. 1. *Fris.* 380.
 Zannichellia palustris major, foliis gramineis
 acutis. *Mich. gen.* 71. t. 34. f. 1. 2.
 Algoides vulgaris. *Vaill. act.* 1719. p. 15. t. 1.
 f. 1.
 Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifi-
 dis. *Baub. pin.* 193. *prodr.* 101.
Oed. dan. t. 67.
 Overvloedig in Vaarten en Slooten op verscheide
 plaatsen.

CHARA.

- vulgaris.* 747. CHARA caulibus lævibus, frondibus interne
 dentatis. *Sp.* 1624. n. 2. *Fris.* 504.
 Chara vulgaris foetida. *Vaill. act.* 1719. p. 23.
 t. 3. f. 1.
 Equisetum foetidum sub aqua repens. *Baub. pin.*
 16. *prodr.* 25. *theatr.* 251. *Baub. bist.* 3. p. 731.
Comm. boll. 33.
Oed. dan. t. 150.
 Stinkende Paarde-staart. Belg.
 In de Kolken aan den Yssel, en in veele Slooten.
 748. CHA-

MONŒCIA MONANDRIA. 243

748. *CHARA* caulibus aculeis capillaribus confertis. *hispida*.
Sp. 1624. n. 3. *Fris.* 505.
Chara major, caulibus spinosis. *Vaill. ust.* 1719.
p. 18. t. 3. f. 3.
Equisetum live *Hippuris* muscosus sub aqua re-
pens, in hibernia *Pluk. alm.* 135. t. 193. f. 6.
Hippuris muscosa, setis per maturitatem stellatis.
Dill. Epb. Nat. Cur. Cent. VI. app. 58. t. 13.
f. 1.
Oed. dan. t. 154.
In de Slooten by Enckhuysen, Franeker, en elders.

D I A N D R I A.

L E M N A.

749. *LEMNA* foliis petiolatis lanceolatis. *Sp.* 1376. *trifurca*.
n. 1. *Gelr.* 590. *Fris.* 382.
Hydrophace caule filiformi, foliis ellipticis lan-
ceolatis viviparis. *Hall. bist.* 1901.
Lenticularia ramosa monorhiza, foliis oblongis
pediculis longioribus donatis. *Mich. gen.* 16. t.
11. f. 5.
Lenticula aquatica trifurca. *Baub. pin.* 362. *Baub.*
bist. 3 p. 786. *Comm. boll.* 65.
Hederula aquatica. *Lob. ic.* 2. p. 36.
Klein Water-Veil. Belg.
In stilstaande zoete Wateren tusschen Haarlem en
Overveen, by Harderwyk, Zwol, Franeker,
en elders.
750. *LEMNA* foliis sessilibus utrinque planiusculis, *minor*.
radicibus solitariis. *Sp.* 1376. n. 2. *Gelr.* 592.
Fris. 383.
Hydrophace monorrhiza, foliis planis ovatis.
Hall. bist. 1900.
Lenticularia minor monorhiza, foliis subrotundis
utrinque viridibus. *Mich. gen.* 16. t. 11. f. 3.
Lenticula palustris vulgaris. *Baub. pin.* 362 *Comm.*
boll. 61. *Vaill. par.* 114. t. 20. f. 3.
Lens palustris. *Dod. pempt.* 587. *Cam. epit.* 852.
Raj. angl. 3. p. 29. t. 4. f. 1.
Kroos,

Kroos, Eenden-kroos, Eenden-groen, Water-Linzen. Belg.

Overvloedig in Graften, Slooten, en andere staande zoete Wateren.

Pharm. LENTICULÆ herb.

gibba.

751. LEMNA foliis sessilibus subtus hemisphæricis radicibus solitariis. *Sp.* 1377. n. 3. *Fris.* 384.

Hydrophace monorrhiza, foliis pulvinatis, inferi convexissimis. Hall. bist. 1898.

Lenticula palustris major: inferne magis convexa, fructu polyspermo. Mich. gen. 15. t. 11. f. 1.

In verscheide Slooten in Friesland.

polyrhiza.

752. LEMNA foliis sessilibus, radicibus confertis. *Sp.* 1377. n. 4. *Gelr.* 591. *Fris.* 385.

Hydrophace polyrrhiza, foliis ovatis planis. Hall. bist. 1899.

Lenticularia major polyrhiza inferne atropurpurea. Mich. gen. 16. t. 11. f. 1.

Lenticula palustris major. Comm. boll. 65. *Dill. app.* 51. *Raj. angl.* 3. p. 129. t. 4. f. 2. *Vail. par.* t. 20. f. 2.

In de Vaart van Amsterdam op Gouda, niet ver van de Goudse sluis; in de Grift tusschen Nymegen en Arnhem; en in Friesland by de voorgaande, maar minder.

T R I A N D R I A.

T Y P H A.

sessifolia.

753. TYPHA foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. *Sp.* 1377. n. 1. *Gelr.* 514. *Fris.* 386.

Typha palustris major. Baub. pin. 20. *Comm. bol.* 113. *Morif. bist.* 3. p. 246. f. 8. t. 13. f. r.

Lisch-Dodden of Donzen, Bulpeserikken, Duivelskoppen, Raboorden. Belg.

Zaveseriken. Zutphanienfibus.

Gro

MONOECIA TRIANDRIA. 235

Groots Haanebolten, ook wel Doete-bolten. Groninganis.

Op veel plaatsen in de Graften, Rivieren, en Rietpoelen.

754. *TYPHA* foliis semicylindricis, spica mascula *angustifolia* femineaeque remotis. *Sp.* 1377. n. 1.

Typha palustris, clava gracili. *Baub.* pin. 20. *Comm. boll.* 113.

Typha palustris media. *Morif. bist.* 3. p. 246. f. 8. t. 13. f. 2.

β. *Typha palustris minor*. *Baub.* pin. 20. *Comm. boll.* 113.

Kleine Haanebolten. Groninganis.

In het Spaarne by Haarlem; ook in den Yssel op veel plaatsen; buiten Groningen in de Slooten by Haren, Meckelhorst, Onnen, en elders.

S P A R G A N I U M.

755. *SPARGANIUM* foliis erectis triquetris. *Sp.* 1378. *erectum*, n. 1. *Gelr.* 513. *Fris.* 387.

Sparganium ramosum. *Baub.* pin. 15. *theatr.* 228. *Comm. boll.* 107. *Morif. bist.* 3. p. 247. f. 8. t. 13. f. 1.

Platanaria f. *Butomon*. *Dod. pempt.* 601.

Riet-gras, Driekantig Liesch. Belg.

Duikers. Groninganis.

β. *Sparganium non ramosum*. *Baub.* pin. 15. *theatr.* 231. *Tabern. ic.* 247. *Comm. boll.* 107. *Morif. bist.* 3. p. 248. f. 8. t. 13. f. 2.

Oed. dan. t. 260.

In byna uitgedroogde Slooten, Moerassen, en aan de kanten der Graften, op verscheide plaatsen. β. Voornaamlyk tusschen Haarlem en Overveen, en by Cuilenburg.

C A R E X.

Spica unica simplici.

756. *CAREX* spica simplici dioica. *Sp.* 1379. n. 1. *dioica*. *Cyperoides parvum*, caulibus & foliis tenuissimis

triangularibus, spica longiore capsula oblongis.
Mich. gen. 56 t. 32. f. 1.

Gramen Cyperoides minimum, spica simplici
 crassa. *Morif. bist. 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. ult.*
 (mas.)

Oed. dan. t. 166.

*Te Hullen by Nymegen, en elders in vochtige Wei-
 landen, en in de Meben by Harderwyk.*

capitata. 757. *CAREX* spica simplici androgyna ovata: superne
 mascula, capsulis imbricato-patulis. *Sp. 1379.*
n. 2.

Gramen Cyperoides minimum, ranunculi capitulo
 simplici asperiore rotundo. *Morif. bist. 3. p.*
245. f. 8. t. 12. f. 36.

Oed. dan. t. 379.

By Groningen. (D. RAINVILLE.)

pulicaris. 758. *CAREX* spica simplici androgyna: superne mas-
 cula, capsulis divaricatis retroflexis. *Sp. 1380.*
n. 3.

Gramen Cyperoides minimum, seminibus deor-
 sum reflexis puliciformibus. *Morif. bist. 3. p.*
244. f. 8. t. 12. f. 21.

*Te Hullen by Nymegen in een vochtig land, en op
 veele plaat/en in Medderpoelen.*

Spicis androgynis.

buldenfs. 759. *CAREX* spicis ternis congestis sessilibus ovatis
 triquetris androgynis, involucro diphylo. *Sp.*
1380. n. 5.

*Carex alpina, capitulis albis: squamis triquetris
 et pulchre lucentibus. Segu. ver. 1. p. 125.*

Gramen junceum montanum, capite squamoso.
baub. pin 6. prodr. 13. t. 13.

*Op de Cingel van Rotterdam, dog zeldzaam. (D.
 RAINVILLE.)*

arenaria. 760. *CAREX* spica composita, spiculis androgynis:
 inferioribus remotioribus foliolo longiori in-
 structis, culmo triquetro. *Sp. 13. n. 6.*

*Carex maritima humilis, radice repente, caule
 triquetro, spica spadicea. Mich. gen. 67. t. 33.
 f. 4.*

Gra-

MONOECIA TRIANDRIA 292

Gramen Cyperoides minus repens, Spica divisa.

Loef. pruss. 116. t. 31.

Oed. dan. t. 425.

Helm-draad. Vulgo.

Overvloedig in de Duinen by Haarlem, Velsen, Scheveningen, en aan de kanten van zandige Akkers. (Nob. D. FABRICIUS SIN, & D. RAINVILLE.)

M. HALLERUS duas facit Caricis arenariae Linnaei species. Hist. stirp. Helv. n. 1362. et 1363. sed. neutra illarum cum nostra convenit. Conf. C. E. WEIGEL observ. bot. 22.

Reptatu molesta est & invisit rusticis.

Loco Saffaparilla usurpanda commendat. G. F. REUSS orat. inang. Tubing. 1771.

761. CAREX spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis. Sp. 1381. n. 8. Gehr. 641.

Gramen Cyperoides palustre majus, spica divisa. Baub. pin. 6. theatr. 88. Comm. boll. 52. Moris. hist. 2. p. 244. f. 8. t. 12. f. 29.

Klein Wild-Water-Galigaan. Belg. Variat tribus modis.

α. Spiculis omnibus androgynis.

β. Spiculis superioribus masculis.

γ. Spiculis superioribus & inferioribus femineis, mediis masculis.

In vochtige Weiden aan de Slooten op vele plaatsen. α. by Gouda. β. te Bodegraaven; γ. by Nymegen.

752. CAREX spica composita, superne mascula, inferne feminea; spiculis ovatis mollibus; capsulis marginatis. *marginata*.

Carex palustris elatior, radice repente, caule trilatelo, spica spadicea, capitulis crassioribus, capsulis marginatis. Mich. gen. 67. t. 33. f. 3.

Gramen nemorosum, spica rufescente molli. Baub. pin. 7.

Gemeen by Bodegraven aan de kanten der Slooten. (D. RAINVILLE.)

Variat spica interrupta, id est spiculis superioribus & inferioribus femineis, mediis masculis.

Capsula hinc plana, inde convexa, utrinque nervosa.

Et quasi striata. Pericarpium semine latius, unde marginatum apparet.

vilpina.

763. *CAREX* spica supradecomposita inferne laxiore: spiculis androgynis ovatis sessilibus glomeratis: superne masculis. *Sp.* 1382. n. 10. *Gelr.* 509. *Fris.* 388.

Gramen Cyperoides palustre majus spica compacta. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 87. *Comm. boll.* 52. *Morif. bist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 24.

Oed. dan. t. 308.

Wild Water-Galigaan-Gras. Belg.

By de voorgaande, en veel aan de kanten der Graf-ten om Rotterdam.

maritima.

764. *CAREX* spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. *Sp.* 1382. n. 11.

Carex nemorosa, fibrosa radice, angustifolia minima, caule exquisite triangulari, spica brevi interrupta. *Micb. gen.* 69. t. 32. f. 11.

Gramen nemorosum, spicis parvis asperis. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 100. *Morif. bist.* 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 27.

Oed. dan. t. 284.

Overvloedig te Hulsen by Nymegen; ook langs sommige Vaarten en Slooten om Rotterdam, en langs den Cingel aldaar, dog weinig. (D. RAINVILLE.)

holiacea.

765. *CAREX* spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis teretiusculis muticis divaricatis. *Sp.* 1382. n. 13.

By Gröningen. (D. RAINVILLE.)

Ill. HALLERUS Hist. 1365. *eandem esse vult cum Carice muricata, et tantum plantam juniorem.*

remota.

766. *CAREX* spiculis ovatis subsessilibus remotis androgynis, bracteis culmum æquantibus. *Sp.* 1383. n. 14.

Cyperoides angustifolium, spicis parvis sessilibus in foliorum alis. *Raj. bist.* 1295. *Morif. bist.* 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 17. *Pluk. alm.* 178. t. 34. f. 3. *Scheuch. gram.* 483.

Oed. dan. t. 370.

Gemeen aan de kanten der Vyvers op Rosendaal by Arn-

Arnhem; langs de Graften om Nymegen; onder
aan den boogendyk onder de dikke boomen buiten
Rotterdam; by het Huis ten Donk; en elders.

767. *CAREX* racemo composito, spiculis androgynis. *paniculata*.
Sp. 1383. *n.* 17.

Cyperus longus inodorus sylvaticus. Baub. pin. 14.
theatr. 221.

Gramen *Cyperoides palustre elatius*, spica longi-
ore laxa. *Raf. bist.* 1296. *Morif. bist.* 3. p. 244.
f. 8. *t.* 12. *f.* 23.

Gemeen langs diepe en door boomen overdekte graften
by Rotterdam, 's Hage, Voorburg, Bodegra-
ven, &c. (D. RAINVILLE.)

Variat panicula ampliori & tenuiori, imo et filifor-
mi.

Spicis sexu distinctis: femineis sessilibus.

768. *CAREX* spicis confertis subsessilibus subrotun-*flava*.
dis: mascula lineari, capsulis acutis recurvis.
Sp. 1384. *n.* 18.

Gramen palustre aculeatum germanicum *f.* minus.
Baub. pin. 7. *theatr.* 109 *Comm. boll.* 53. *Morif.*
bist. 3. p. 243. *f.* 8. *t.* 12. *f.* 19.

Water-Gras met Steekende Airen. Belg.

In laage waterachtige Velden by Amsterdamm, U-
trecht, Zwol, te Hulsen by Nymegen, en el-
ders.

769. *CAREX* spicis linearibus erectis: mascula brevi-*digitata*.
ore inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis
distantibus. *Sp.* 1384. *n.* 20.

Gramen caryophyllatum montanum, spica varia.
Baub. pin. 4. *prodr.* 9.

Gramen caryophyllatum polycarpon, fructu tri-
angulari. *Loef. pruss.* 112. *t.* 27.

In het Bosch by Putten en Elspeet op de Veluwe.

770. *CAREX* spicis femineis sessilibus subsolitariis *montana*.
ovatis masculæ approximatis, culmo nudo, ca-
psulis pubescentibus. *Sp.* 1385. *n.* 21.

Cyperoides montanum, foliis angustis parvis,
Q 5 spi-

spica spadicea divisa. *Scheuch. gram. 419.*

Cyperoides alpinum faxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetto, spica feminali nigricante plerumque unica. Mich. gen. 64. t. 32.

f. 3.

In de Duinen by Haarlem, en in de Heide by Hulslen buiten Nymegen. (D. RAINVILLE.)

Synonymum Scheuchzeri Ill. LINNÆUS dubitanter hic apposuit, Ill. HALLERUS omnino negat banc esse plantam; sed Ill. SCHREBERUS recte statuit eandem esse, cum in uno eodemque cespite folia capillaria, atque latiuscula inveniuntur.

globularis. 771. *CAREX* spica mascula oblonga, feminea sessili ovata folio florali breviori approximata. *Sp. 1385. n. 22.*

Cyperoides alpinum faxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetto, spica feminali nigricante plerumque unica, capsulis oblongis turbinatis trilateris subhirsutis in apicem tenuissimum nonnihil bifidum terminatis. Mich. gen. 64. t. 32. f. 3.

Op de Duinen by Egmond op den Hoef.

filiformis. 772. *CAREX* spica mascula oblonga, femineis sessilibus oblongis: inferiore foliolo proprio brevior. *Sp. 1385. n. 23. Fris. 389.*

Cyperoides sylvaticum tenuifolium, spicis parvis tenuibus spadiceo-viridibus. Scheuch. gram. 425. t. 10. f. 11.

By Gouda, Haarlem, Groningen, en in Friesland op veele plaatsen in de Weiden, en aan de kanten der zelve; als ook aan sommige Wegen.

pilulifera. 773. *CAREX* spicis terminalibus confertis subrotundis: mascula oblonga. *Sp. 1385. n. 24.*

Gramen Cyperoides tenuifolium, spicis adsummitatem caulis sessilibus globulorum æmulis. Pluk. alm. 178. t. 91. f. 8.

By Hulslen by Nymegen, en op de Duinen by Scheveningen. (D. RAINVILLE.)

Variat multum, longitudine culmi & foliorum.

faxatile. 774. *CAREX* spicis tribus ovatis sessilibus alternis: mascula oblonga. *Sp. 1385. n. 25.*

Ord.

MONOECIA TRIANDRIA. 251

Oed. dan. t. 159.

Op de Duinen by Haarlem en Scheveningen. (D. RAINVILLE.)

Spicis sexu distinctis: femineis pedunculatis.

775. CAREX spicis androgynis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis; fructiferis pendulis. Sp. 1386. n. 26.

Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllæis, spicis atris & tumentibus. Scheuch. gram. 481.

Oed. dan. t. 138.

Op de Duinen by Haarlem: (D. RAINVILLE.)

776. CAREX spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente. Sp. 1386. n. 27.

Cyperoides spica pendula brevior, squamis e spadiceo vel fusco rutilante viridibus Scheuch. gram. 442. t. 10. f. 15.

Gramen Cyperoides spica pendula minus. Baub. pin. 85.

Oed. dan. t. 158?

Tusschen de Duinen by Haarlem. (D. RAINVILLE.)

777. CAREX spicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capsulis obtusiusculis inflatis.

Sp. 1385. n. 39. Fris. 390.

Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis e rarioribus & tumidioribus vesicis compositis. Mich. gen. 61. t. 32 f. 11. Pluk. alm. 178. t. 91. f. 7.

Oed. dan. t. 261

In de Veenen en natte Hei-gronden, te Hulsen by Nymegen, Sneek, Groningen, en elders.

778. CAREX spicis pendulis, pedunculis geminatis. Pseudo-Cyperus. Sp. 1387. n. 32. Gelr. 511.

Pseudo-Cyperus. Dod. pempt. 339.

Gramen Cyperoides spica pendula brevior. Baub. pin. 6. Comm. boll. 51. Moris. bist. 340. p. 242.

f. 8. t. 12. f. 5.

Langs de Rivier bet Spaarne, den Yssel, en aan de

de kanten der Slooten op veel plaatsen.

- distans.* 779. CAREX spicis remotissimis subsessilibus, bractea vaginali, capsulis angulatis mucronatis. *Sp.* 1387. n. 33.
Gramen Cyperoides gracile alterum, glomeratis torulis spatio distantibus. *Morif. bist.* 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 18.
Aan de weg tusschen Rotterdam en Gouda, by de eerste Schuur. (D. RAINVILLE.)
- caespitosa.* 780. CAREX spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus; mascula terminali, culmo triquetro. *Sp.* 1388. n. 34.
Gramen Cyperoides caryophyllatum, folio longiore et angustiore, spicis sessilibus compactis erectis. *Morif. bist.* 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 14.
In de Turf-Veenen.

Spicis sexu distinctis: masculis pluribus.

- acuta.* 781. CAREX spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis. *Sp.* 1388. n. 35. *Gelr.* 510. 512.
- rufa.* a. Gramen Cyperoides latifolium, spica rufa sive caule triangulo. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 83. *Comm. boll.* 51. *Morif. bist.* 2. p. 242. f. 8. t. 12. f. 1. *Variat hæc rufus.*
a. Spicis fructiferis androgynis.
b. Spicis fructiferis sessilibus, inferiore tantum pedunculata.
c. Spica fructifera inferiore longius pedunculata & pendula
d. Spica mascula superiore clavata seu abrupta.
- nigra major* β. Cyperoides nigro-luteum vernum majus. *Tourn. inst.* 529.
Gramen Cyperoides majus angustifolium. *Park. theatr.* 1295. *Raj. bist.* 1293. *Boerb. lugdb.* 2. p. 165. n. 2.
Graminis nigro-lutei verni varietas major. *Baub. bist.* 2. p. 494.

Hæc

Hæc gaudet sæpe spicis fentineis superioribus binis.

γ. *Cyperoides nigro-luteum vernum minus. Tourn. nigraminor inst. 529.*

Gramen nigro-luteum vernum. Baub. bist. 2. p. 494. Comm. boll. 52. Boerb. lugdb. 2. p. 165. n. 3.

Gramen caryophyllatæ foliis minus, spica divulsa. Baub. pin. 3. theatr. 46. Boerb. n. 4.

Gramen spicatum foliis veronicæ caryophyllatæ. Lob. ic. 10.

Hæc porro variat

a. *Spicis femineis omnibus sessilibus.*

b. *Spicis femineis longioribus, inferiore pedunculata.*

c. *Spica feminea inferiore longissime pedunculata.*

Op vochtige plaatsen. α. in de Wei-landen aan het Spaarne buiten Haarlem, om Utrecht, Rotterdam, Bodegraven, Utrecht, Zwol, in de Me- men by Harderwyk, en elders. β. tusschen Rötterdā en Overschie. γ. in vochtige zand gronden.

Varietatis α. d. figura clavata in viva planta multo evidentior quam in sicca.

782. *CAREX spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis. Sp. 1388. n. 36. Gelr. 647. Fris. 391.*

Gramen Cyperoides angustifolium, spicis longis erectis. Baub. pin. 48. theatr. 14. Comm. boll. 51.

Gramen Cyperoides majus præcox, spicis turgidis teretibus flavescens. Moris. bist. 3. p. 242. f. 8. t. 12. f. 6.

Zegge, of Water-Riet-Gras. Belg.

Menigvuldig aan de kanten van sommige Vaarten en Slooten, en in laage moerassige Landen en Poelen.

III. *HALLERUS bist. pl. Helv. n. 1401. citans ad hanc Caricem Floram meam Ingricam, excludit synonyma a me addita: sed ex qua ratione non video, cum mea non alia sint, quam quæ Ipse Carici vesicariæ adscripsit, ut conferenti patebit.*

783. *CAREX spicis remotis: masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. Sp. 1389. n. 37.*

Gramen spicatum, foliis & spicis hirsutis molli- bus. Baub. pin. 4. theatr. 48.

Gra-

354 MONOECIA TRIANDRIA.

Gramen Cyperoides polystachion lanuginosum.

Morif. bist. 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 10. Pluk. alm. 178. t. 34 f. 6.

Oed. dan. t. 379.

Veel op dorre zandige plaatsen; te Rotterdam op het Bolwerk tusschen de steenen.

In humidis & herbosis crescit ad altitudinem 2. 3.

& 4. pedum.

TETRANDRIA.

LITTORELLA.

lacustris. 784. LITTORELLA. *Linn. mant. 295.*

Plantago uniflora. Sp. 167. n. 16. Fris. 70.

Plantago floribus feminis sessilibus ad exortum scapi uniflori maris. Fussl. act. gall. 1742. p. 131. t. 7.

Gramen junceum minus, capitulis longissimis filamentis donatis. Morif. bist. 3. p. 230. f. 8. t. 9. f. 3. opt.

Oed. dan. t. 170.

Op veele plaatsen in de Wouden in Friesland, in Veen- en Zand-grond.

BETULA.

alba. 785. BETULA foliis ovatis acuminatis serratis. *Sp. 1393. n. 1, Gehr. 519. Fris. 392.*

Betula. Baub. pin. 427. Dod. pempt. 830. Comm. holl. 16.

Herke-boom. Belg.

Op verscheide plaatsen, vooral in de Bosschen.

Plantatur etiam & crescit in arenosis & alio, ubi via alia degit planta.

Alnus. 786. BETULA pedunculis ramosis. *Sp. 1394. n. 5. Fris. 303.*

glutinosa. de Alnus. Dod. pempt. 830. Gehr. 518.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis. Baub. pin. 428.

[Elze-boom. Belg.]

β. Al-

MONOECIA TETRANDRIA. 255

- β. *Alnus folio incano.* Baub. pin. 428. *incana.*
 α. *Veel aan de Water-kanten.* β. *in de Salker-*
Waard.

B U X U S.

787. *Buxus.* Sp. 1394. n. 1. Gelr. 517. Dod. *perpet. sempervirens.*
 782.
Buxus arborescens. Baub. pin. 471.
Grove of Boom-Palm, Busboom of Bosboom. Belg.
Op de Duinkant buiten Haarlem by den Weligen
berg by Overveen.
 Pharm. *BUXINUM lign.*
An vera indigena sit, dubito.

U R T I C A.

788. *Urtica foliis oppositis ovalibus.* Sp. 1396. *urens.*
 n. 5. Gelr. 515. Frisf. 394.
Urtica urens minor. Baub. pin. 232. *Comm. boll.*
 116.
Kleine Brand-Netelen. Belg.
By de Wegen.
 Pharm. *URTICÆ MINORIS herb.*
789. *Urtica foliis oppositis cordatis, racemis ge. dioica.*
minis. Sp. 1396. n. 6. Gelr. 515. Frisf. 395.
Urtica urens maxima. Baub. pin. 232. *Comm. boll.*
 116.
Groote Netelen. Belg.
Op ruwe ongebouwde gronden langs de Wagen.
 Pharm. *URTICÆ rad. herb.*

P E N T A N D R I A.

X A N T H I U M.

790. *Xanthium caule inermi, foliis cordatis trif. strumarium*
nervatis. Sp. 1400. n. 1.
Xanthium. Fuchf. bist. 579. Dod. *perpet. 39.*
Lappa minor sive Xanthium dioicoidis. Baub.
 pin.

256 MONOECIA PENTANDRIA.

pin. 198. *Comm. boll.* 63.
Kleine Klitzen. Belg.
*Aan den Yssel-dyk by Campen; te Utrecht buiten
 de Tolsteeg-poort; en op andere plaatsen.*

A M A R A N T H U S.

Blitum. 791. *AMARANTHUS* glomerulis lateralibus: floribus
 trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. *Sp.*
1405. n. 11. Gelr. 522.
Blitum album minus. *Baub. pin.* 118. *Cam. epit.*
236. Comm. boll. 16.
Witte Mayer. Belg.
By de wegen op verscheide plaatsen.

P O L Y A N D R I A.

C E R A T O P H Y L L U M.

demersum. 792. *CERATOPHYLLUM* foliis dichotomo-bigeminis,
 fructibus trispinosis. *Sp.* 1409. *n. 1. Fris.* 396.
Hydroceratophyllum folio aspero quatuor corni-
bis armato. *Vaill. act.* 1719. *p. 21. t. 2. f. 1.*
Equisetum sub aqua repens; foliis bifurcis. *Loef.*
pruss. 67. *t. 12.*
Pinastella infirmioribus & hamosioribus caulibus,
foliis instar cornu cervi divisis. *Hall. jen.* 350.
Millefolium aquaticum cornutum *Raj. bist.* 1. *p.*
191. Baub. bist. 3. *p. 789. quoad descriptionem*
Comm. boll. 76.
Op veele plaatsen in de Slooten; overvloedig in de
Kolken by den Ouden-Yssel, en in de Graften
om Harderwyk.

M Y R I O P H Y L L U M.

spicatum. 793. *MYRIOPHYLLUM* floribus masculis interrupte
 spicatis. *Sp.* 1409. *n. 1. Gelr.* 525. *Fris.* 397.
Millefolium aquaticum pennatum spicatum. *Baub.*
pin. 141. *prodr.* 73. *f. 1. Comm. boll.* 76.
Water-Duizend-blad. Belg.

MONOECIA POLYANDRIA. 257

In de Vyvers en stilstaande Wateren op veele plaatsen.

794. MYRIOPHYLLUM floribus omnibus verticillatis ^{verticillatum.}
herinaphroditis. Sp. 1410. n. 2. Fris. 398.
Myriophyllum aquaticum minus. Clus. bist. 2. p.

252.
Millefolium aquaticum, flosculis ad foliorum nodos. Baub. pin. 151. Comm. boll. 75.

In stilstaande Slooten by Tiel, te Loenen aan de Vecht; in Friesland in de Wouden, alwaar Veenen zyn; gelyk ook by Veenendaal in 't Sticht van Urecht; en elders.

SAGITTARIA.

795. SAGITTARIA foliis sagittatis acutis. Sp. 1410. Sagittifolia n. 1. Gelr. 524. Fris. 399.

Sagitta aquatica minor latifolia. Baub. pin. 194.
Comm. boll. 100.

Sagitta minor. Dod. pempt. 588.
Oed. dan. t. 172.

- α. Sagitta aquatica minor angustifolia. Baub. pin. 194.
Comm. boll. 100.

β. Sagitta aquatica major. Baub. pin. 194. Comm. boll. 100.

Sagitta major. Dod. pempt. 588.

- γ. Sagitta aquatica major, folio angustiore. Boerb. lugdb. 1. p. 46.

Serpents-Tongen. Belg.

In staande Wateren en Slooten op veele plaatsen. α. By Oidenbroek in Gelderland, en by Overveen in Holland. β. By den Aardenhout. γ. In de Graften om Harderwyk; in de Slooten by Leerdam; en elders.

POTERIUM.

796. POTERIUM therme, caulibus subangulosis. Sp. ^{Sanguifera.}
1411. n. 1. Gelr. 523. ^{ba.}

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. Baub. pin. 100. Comm. boll. 88.

Pimpinella Sanguisorba. Dod. pempt. 105. Cam. epit. 777.

Pimpernel. Belg.

In de Duinen niet verre van Velsen; en in het
R Bent-

258 MONOECIA POLYANDRIA.

Bentveld by Haarlem; overvloedig in de Weiden
langs den Yssel by Zutphen.
Pharm. PIMPINELLÆ rad. herb.

Q U E R C U S.

- Robur.* 797. QUERCUS foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinibus acutioribus, angulis obtusis. *Sp.* 1414. n. 12. *Gelr.* 526. *Jngr.* 154. *Fris.* 490.
Quercus cum longo pediculo. *Baub.* pin. 420.
Comm. boll. 94.
Quercus. *Fuchf. bist.* 229. *Loef. pruss.* 31. t. 69.
Eike-boom. Belg.
β. Quercus latifolia mas, quæ brevi pedunculo. *Baub.* pin. 419. *Comm.* boll. 94.
Quercus platyphyllos mas. *Dalecb. bist.* 2.
Peel op de Veluwe; in Friesland in de Wouden; by Groningen in 't Goreght in verscheide bosschen. β. In het Haagse-bosch, Haarlemmerhout, en buiten Utrecht.
Pharm. QUERCUS cort. fol. glandes, galle.

F A G U S.

- Sylvatica.* 798. FAGUS foliis ovatis obsolete ferratis. *Sp.* 1416. n. 3. *Gelr.* 528. *Fris.* 401.
Fagus. *Baub.* pin. 419. *Dod. pempt.* 832. *Comm.* boll. 37.
Beuke-boom. Belg.
In veele Bosschen in 't wild.

C O R Y L U S.

- Avellana.* 799. CORYLUS stipulis ovatis obtusis. *Sp.* 1417. n. 1. *Gelr.* 530. *Fris.* 402.
Corylus sylvestris. *Baub.* pin. 418.
Avellana nux sylvestris. *Fuchf. bist.* 398.
Hafelaar, Haaze-nooten-boom. Belg.
St. Lamberts-nooten. Gelris.
In het Haagse-Bosch; in veele Bosschen in Gelderland en Overysfel; op verscheide Woud-plaatsen in Friesland; en in 't Goreght.
Pharm. AVELLANÆ nux.

MONOECIA MONADELPHIA. 259

M O N A D E L P H I A.

P I N U S.

800. PINUS foliis geminis: primordialibus solitariis. *Sylvestris.*

Sp. 1418. n. 1. Geir. 532.

Pinus sylvestris. Baub. pin. 491. Comm. boll. 86.

Pinus sylvestris vulgaris genevensis. Baub. bist. 1. p. 253.

Wilde Pyn-boom, Sparre-boom. Belg.

Op veele plaatsen in Gelderland; in 'bet Bosch van Uitenbogaard buiten Naarden; in 't Schaaopenbosch buiten Haarlem; te Lisse tusschen Haarlem en Leiden; te Drybergen, Maarsbergen, &c. in 't Sticht van Utrecht.

Pharm. PINI refina, Pix alba & nigra, Pix liquida, Terebintina communis.

In Praeio Viri Ill. H. a WESTERVELT Essenburg prope Harderovicum, A.D. 1753. lectus est ramus bujus arboris conis mire onustus, ita quidem ut centum circiter numerari potuerint, qui invicem insidentes globum capitis humani magnitudinem aequantem efficiebant.

S Y N G E N E S I A.

B. R Y O N I A.

801. BRYONIA foliis palmatis utrinque calloso-sca- *alba.*
bris. Sp. 1438. n. 1. Geir. 536.

Bryonia aspera sive alba, baccis rubris. Baub. pin. 297. Comm. boll. 17. Moris. bist. 2. p. 4. f. 1.

t. 1. f. 5.

Wilde Wyngaard. Belg.

Veel aan de Waal-dyk by Nymegen en Tiel; aan de dykjes langs de Wegen buiten Zutphen; aan de Hoven buiten Harderwyk; in de Duinen buiten

260 MONOECIA SYNGENESIA.

's Hage, Haarlem, Alkmaar; in de Heggen en
Bosschen in Friesland; en elders op schaduwach-
tige plaatsen.

Pharm. BRYONIÆ rad. far.

Baccis nigris, quæ apud nos, semper monoica.

CLAS.

C L A S S I S XXII.

D I O E C I A.

D I A N D R I A.

V A L L I S N E R I A.

802. VALLISNERIA. Sp. 1441. n. 1. *Spiralis.*
 Vallisneria palustris, algæ folio, italica, foliis
 in summitate denticulatis, flore purpurascēte.
Mich. gen. 12. t. 10. f. 1.
 Habitat in piscinis juxta fossas Belgii rarius. (Linn.
b. Cliff. 454.)

S A L I X.

803. SALIX foliis ferratis glabris, floribus pentan- *pentandra.*
 dris. Sp. 1442. n. 3. Gmel. *fib. 1. p. 153. t.*
34. f. 1.
 Salix folio laureo sive lato glabro odorato. *Raj.*
bist. 1420. angl. 3. p. 449.
Duin-wilg. Belg.
Aan de Duinkant buiten Haarlem.
804. SALIX foliis ferratis ovatis acutis glabris: ferra- *vitellina.*
 turis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis.
Sp. 1442. n. 5.
 Salix fativa lutea, folio crenato. *Baub. pin. 473.*
 Salix perficæ folio, non auriculato. *Comm. boll. 101.*
Geele Wilg.
By 't Huis te Berkenrode buiten Haarlem, en ook

DIOECIA DIANDRIA.

in veele Waarden aan de Rivieren.

Arbor stature parva. Folia longiora & angustiora, quam Salicis fragilis, serrata, pagina superiore splendentia viridia, inferiore pallidiora. Rami juniores sunt tenaces flexiles. (Comm.)

amygdalina 805. *SALIX* foliis ferratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis trapeziformibus. *Sp.* 1443. *n.* 6.

Salix folio amygdalino utrinque virente aurito. Baub. pin. 43.

Salix sylvestris latifolia. Tabern. ic. 1037.

Wervelen-bout. Vulgo.

In de Salker-Waart; in Vieracker en aan den Tol-dyk buiten Zutphen; ook buiten Wyk by Duurstede, en elders.

Eligno scalarum gradus conficiuntur; rami teneriores ad vitilia inserviunt.

fragilis. 806. *SALIX* foliis ferratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Sp.* 1443. *n.* 8.

Fl. lapp. 349. t. 8. f. B.

Salix fragilis. Baub. pin. 474. prodr. 159. Comm. boll. 101.

Salix, folio longo latoque splendente, fragilis.

Raj. angl. 3. p. 448. n. 8. cantab. 143.

Katten-bout. Vulgo.

By Bloemendaal, aan de Duinkant langs de Bleekeryen; by Tiel, Uilenpas, Ouden-Aller en elders in Gelderland aan de Slooten.

purpurea. 807. *SALIX* foliis ferratis glabris lanceolatis: inferioribus oppositis. *Sp.* 1444. *n.* 10.

Salix vulgaris nigricans, folio non serrato. Baub. pin. 473. Boerb. lugdb. 2. p. 210.

Salix rubra minime fragilis folio longo angusto. Baub. hist. 1. p. 215.

Salix vulgaris rubens. Baub. pin. 473. Boerb. lugdb. 2. p. 210. Comm. boll. 101.

Salix folio longo non auriculato, viminea rubra. Raj. cantab. 143. Comm. boll. 102.

Roode-Wilg. Belg.

Op veele plaatsen aan de Waterkanten. γ. In Zeeland, en in de Zyp.

Helv. 808. *SALIX* foliis ferratis glabris lanceolato-linearibus: superioribus oppositis-obliquis. *Sp.* 1444. *n.* 11. Sa-

Salix humilis, capitulo squamoso. *Baub. pin.* 474.

Salix tenuior, folio minore utrinque glabro, fragilis. *Baub. bist.* 1. p. 213. f. 2. *Comm. boll.* 101.

Salix humilior, foliis angustis subcæruleis ex adverso binis. *Raj. bist.* 1421. *cantab.* 144. *angl.* 3. p. 448.

Bittere Wilg. Vulgo.

By Berkenroode, en niet verre van Velsen in de Duinen, dog niet overvloedig.

309. *SALIX* foliis integris ovatis acutis supra subvil- *arenaria*
lofis, subtus tomentosis. *Sp.* 1447. n. 23. *Gelr.* 643.

Salix pumila, foliis utrinque candicantibus & lanuginosis. *Baub. pin.* 474. *Comm. boll.* 102. *Gmel. fib.* 1. p. 164. t. 36. f. 1.

Klein Zand-Wilg. Belg.

Kleine Wirf. Vulgo.

Overvloedig in de Duin-valeyen; en in de Meben by Harderwyk.

310 *SALIX* foliis integerrimis ovatis subtus pubescen- *fusca*
tibus. *Sp.* 1447. n. 26. *Fris.* 403. *Linn. lapp.* 364. t. 8. f. R.

Salix pumila, folio utrinque glabro. *Baub. bist.* 1. p. 217.

Salix pumila brevi angustoque folio incano. C. B. *Comm. boll.* 102.

In de Duinen; en in de Wouden in Friesland.

311. *SALIX* foliis integerrimis lanceolato-linearibus *rosmarina*
strictis sessilibus subtus tomentosis. *Sp.* 1448. n. *folia*.
27. *Gelr.* 542. *Fris.* 404.

Salix humilis angustifolia. *Baub. pin.* 474.

Salix humilis repens angustifolia. *Lob. ic.* 2. p. 137.

Veel in de Gagel-kampen by Harderwyk; en op de Heivelden in de Wouden in Friesland.

312. *SALIX* foliis ovatis rugosis subtus tomentosis *caprea*
undatis superne denticulatis. *Sp.* 1448. n. 28.
Gelr. 540. *Fris.* 405.

Salix latifolia rotunda. *Baub. pin.* 474. *Raj. angl.* 3. p. 449. *Comm. boll.* 101.

β. *Salix* foliis obscure crenatis utrinque villosis ovate-
oblon-

oblongis. *Linn. lapp.* 365. t. 8. f. S.

Salix latifolia inferne hirsuta. Baub. bist. 1. p. 215. 2.

Salix folio ex rotunditate acuminato. Baub. pin. 474. *Comm. boll.* 101.

Ronde Ruige Wilg. Belg.

Water - Wilg. Vulgo.

Aan 't eind van 't Kraayenest by Haarlem, in de Duinen by Westerhout; en in de Salker-waart.

glauca. 813. *SALIX* foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *Sp.* 1448. n. 29. *Gelr.* 538. *Fris.* 406.

Salix angustis & longissimis foliis crispis, subtus albicantibus. Baub. bist. 1. p. 212. *Comm. boll.* 101.

Salix folio longissimo. Raj. angl. 3. p. 450.

Rieswaart. Vulgo.

Overvloedig langs den Yssel, Rhyn en Leck; ook by de voorige, en in de Wouden in Friesland.

cinerea. 814. *SALIX* foliis subserratis oblongo-ovatis subtus subvillosis, stipulis dimidiato-cordatis. *Sp.* 1449. n. 30. *Fris.* 407.

Salix foliis integris glabris lanceolato-ovatis. Linn. lapp. 358.

Op veele plaatsen in Friesland, in de Wouden, aan wegen, in gruppels en bosschen. (MEESE)

alba. 815. *SALIX* foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. *Sp.* 1449. n. 31. *Gelr.* 537. *Fris.* 408.

Salix vulgaris alba arborefcens. Baub. pin. 473. *Comm. boll.* 101.

Salix maxima fragilis alba hirsuta. Baub. bist. 1. p. 212.

Wilge-boom. Belg.

Langs de Wegen aan de Water-kanten.

Pharm. SALICIS cort. fol.

T R I A N D R I A.

E M P E T R U M.

816. *EMPETRUM procumbens*. Sp. 1450. n. 2. *Gelr. nigrum*.
559. *Fris.* 409.

Erica baccifera procumbens nigra. *Baub. pin.* 486.

Comm. boll. 34.

Erica baccifera matthioli. *Baub. bist.* 1. p. 526.

Beziën draagende Heide. Belg.

Kraay-Heide. *Rusticis Velaviæ*.

Op de Heide by Ermello, Elspeet, op den Tryfelberg, en elders op de Veluwe; by Bergum, Syderhuysum, en elders in Friesland; ook in Zeeland.

T E T R A N D R I A.

V I S C U M.

817. *VISCUM foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus*. Sp. 1451. n. 1.

Viscum baccis albis. *Baub. pin.* 423. *Comm. boll.* 115.

Viscum. Cam. epit. 555. *Dod. pempt.* 740.

Marentakken. Belg.

Op verscheide soorten van Boomen; te Amsterdam op de Ulmus; in de Haarlemmer-hout op de Betula; by Dordrecht op de Prunus; en voorts op de Quercus, en meer soorten van Boomen. (volgens COMMELYN, dog door den Heer D. HOUTTUYN, my, en veele anderen niet gevonden.)

Pharm. VISCI QUERCINI lign.

H I P P O P H A E.

818. *HIPPOPHAE foliis lanceolatis*. Sp. 1452. n. 1. *Rhamnol-*

Rhamnus salicis folio angustiore, fructu flavescen-
te. *Baub. pin.* 755. *Comm. boll.* 98.

R 5

Rham-

Rhamni species. *Cam. epit.* 81.

Oed. dan. t. 265.

Duin-Doorn. Belg.

Scheit-beziën. Vulgo.

In de Duinen buiten 's Gravenhage, Haarlem, by Overveen, 'Zandvoort, Catwyk, Noordwyk, &c. buiten Alkmaar naar Egmond op den Hoef, en op meer plaatsen.

M Y R I C A.

Gale.

819. *MYRICA* foliis lanceolatis subserratis, caule suffruticoso. *Sp.* 1453. *n. 1. Gelr.* 543. *Fris.* 410. *Rhus myrtifolia belgica. Baub. pin.* 414. *Comm. boll.* 98.

Chamæleagnus. Dod. pempt. 780.

Ord. dan. t. 327.

Gagel. Belg.

Post. Zutphaniensibus & Twentinis.

Luis-kruid. Quibusdam.

Overvloedig beneden Nymegen aan de Waalkant, en in vochtige Hei-kampen by Zutphen, Harderwyk, Utrecht, Zwol, Enscheide; in de Veenen by Mydrecht; in de Wouden in Friesland; agter Haren aan den weg naar de Waterhuizen, en aan den weg naar Onnen en Noorlaren by Groningen; en elders.

Mas frequentissime, raro Femina occurrit.

Odor resinofus e longinquo percipitur.

Dolia, quibus carnes salitæ byeme servantur, bujus odore prius imbunntur.

Rustici ramulos lictis supponunt ad fugandos pulices & pediculos.

P E N T A N D R I A.

H U M U L U S.

Lupulus. 820. *HUMULUS. Sp.* 1457. *n. 1. Gelr.* 546. *Fris.* 411.

Lupulus mas. Baub. pin. 298. *Comm. boll.* 69.

Lupulus femina. Baub. pin. 298. *Cam. epit.* 954.

Hop. Belg.

Peel

DIOECIA PENTANDRIA.

107

Veel langs de Wegen op schaduwachtige plaatsen, by Harderwyk, Leerdam, Heemstede, -Utrecht, Wyk by Duurstede, te Glimmen en op de Mickelhorst by Groningen; in 't Haagse-Bosch; in de Wouden in Friesland; en elders.

Pharm. LUPULI herb. cons.

OCTANDRIA.

POPULUS.

821. *POPULUS* foliis subrotundis dentato-angulatis *alba*.
subtus tomentosis. Sp. 1463. n. 1. Gelr. 547.

Populus alba, majoribus foliis. Baub. pin. 429.

Comm. boll. 92.

Populus alba. Dod. pempt. 835.

Witte Populier, of Peppel-boom, Abeel-boom. Belg.
Bevest. Gelris.

β. *Populus alba*, minoribus foliis. Baub. pin. 429.

Boerb. lugdb. 2. p. 211.

Veel in de Duinen by Heemstede, ook buiten Tiel en Utrecht op ruwe plaatsen.

822. *POPULUS* foliis subrotundis dentato-angulatis *tremula*.
utrinque glabris. Sp. 1464. n. 2. Gelr. 548.

Frif. 412.

Populus tremula. Baub. pin. 429. Comm. boll. 92.

Populus libyca. Dod. pempt. 836.

Ratelaar, Espen-boom. Belg.

Veel by Tiel, Harderwyk, Wageningen, Zwol, in 't Haagse-Bosch, en elders.

823. *POPULUS* foliis deltoidibus acuminatis serratis *nigra*.
Sp. 1464. n. 3. Gelr. 549.

Populus nigra. Baub. pin. 429. Dod. pempt. 836.

Comm. boll. 92.

Populier-boom, Peppel-boom. Belg.

Op veele plaatsen langs de Wegen, en in de Duinen.

Pharm. POPULI NIGRAE gemma f. oculi.

EN-

E N N E A N D R I A.

M E R C U R I A L I S.

- annua.* 824. *MERCURIALIS* caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. *Sp.* 1465. *n.* 3. *Gelr.* 550. *Frisf.* 413.

MAS.

FEMINA.

- | | |
|--|---|
| <p><i>Mercurialis spicata</i> five <i>fe-</i>
mina. <i>Baub. pin.</i> 121.
<i>Comm. boll.</i> 74. <i>Morif.</i>
<i>bist.</i> 2. <i>p.</i> 612. <i>f.</i> 5. <i>t.</i>
34. <i>f.</i> 2.</p> | <p><i>Mercurialis testiculata</i> <i>fi-</i>
ve mas. <i>Baub. pin.</i> 121.
<i>Comm. boll.</i> 74. <i>Morif.</i>
<i>bist.</i> 2. <i>p.</i> 612. <i>f.</i> 5. <i>t.</i>
34. <i>f.</i> 1.</p> |
|--|---|

Bingel - kruid. Belg.

Op vochtige schaduwachtige plaatsen in de Moes - bo-
ven, veel by Harderwyk.

Pharm. *MERCURIALIS* herb.

H Y D R O C H A R I S.

- Morfus* 825. *HYDROCHARIS.* *Sp.* 1466. *n.* 1. *Gelr.* 551.
rana. *Frisf.* 414.

Nymphæa alba minima. *Baub. pin.* 193. *Comm.*
boll. 81.

Ranæ morfus. *Dod. pempt.* 583. *f.* 2.

Vorsche - beet. Belg.

Overvloedig in stilstaande Slooten en Graften.

M O N A D E L P H I A.

J U N I P E R U S.

- communus.* 826. *JUNIPERUS* foliis ternis patentibus mucrona-
tis, bacca longioribus. *Sp.* 1470. *n.* 1. *Gelr.* 552.
Juniperus vulgaris fruticosa. *Baub. pin.* 488. *Comm.*
boll. 67.
Juniperus. *Dod. pempt.* 852.

Ge-

Genever-boom. Belg.

Dammeren-bout, Vrakel-bessen. Rusticis.

Op de Veluwe op verscheide plaatsen, ook tusschen

Utrecht en Amersfoort, en omtrent Zwol.

Pharm. JUNIPERI lign. bacc. gummi.

*Juniperus saluberrima arbor est, sed si homo diu
versatur aut dormit sub ejus umbra, per banc
atmosphæram mutatur quasi a nimio vino. (BOERH.
morb. nerv. 232.)*

C L A S S I S XXIII.

P O L Y G A M I A.

M O N O E C I A.

H O L C U S.

• *collis.*

827. *HOLCUS* glumis bifloris nudiusculis: flosculo hermaphrodito mutico; masculo arista geniculata. *Sp.* 1485. n. 6. *Schreb. gram.* 149. t. 20. f. 2.

Gramen caninum longius radiculatum majus. *Baub. pin.* 1. *Comm. boll.* 46.

Gramen caninum longius radiculatum molle. *Raj. hist.* 1285. *Scheuch. gram.* 235. t. 4. f. 25.

β. Gramen caninum longius radiculatum minus. *Baub. pin.* 1. *Comm. boll.* 46.

In de zandige Bouw-landen buiten Haarlem omtrent Heemstede; aan het Haagse-Bosch by Zorgvliet; en elders.

Variat panicula colore viridi, olivaceo, flavescente, et amplitudine.

• *lanatus.*

828. *HOLCUS* glumis bifloris villosis: flosculo hermaphrodito mutico; masculo arista recurva. *Sp.* 1485. n. 5. *Gelr.* 40. *Fris.* 415.

Holcus panicula laxa nutante, glumis oblongis, foliis acuminato-setaceis. *Schreb. gram.* 145. t. 20. f. 1.

Gramen pratense paniculatum molle. *Baub. pin.* 2. *prodr.*

POLYGAMIA MONOECIA. 271

prodr. 3. theatr. 27. Comm. boll. 46. Moris.
bist. 3. p. 202. f. 8. t. 6. f. 34. Scheuch. gram.
234. t. 4. f. 24. A. B.

Gramen paniculatum molle, panicula dilute cæ-
rulea. Loef. pruss. 3. t. 25.

Gramen lanatum. Dalech. bist. 425.

Op booge zandige Velden buiten Harderwyk, Arn-
hem, Haarlem, Zwol, &c. in de Wouden in
Friesland.

Variat glumarum & antherarum colore albo, dilute
purpureo, purpureo et nigro. Variat etiam panicu-
lis strictis et veluti spicatis, paniculisque ampli-
oribus diffusis. Aristæ in viva planta fere omnes
rectæ. Petala interdum longissime excresecunt.

829. *Holcus* glumis trifloris muticis acuminatis: flo ^{odoratus.}
sculo hermaphrodito diandro. Sp. 1485. n. 7.

Herocloe. Gmel. fib. 1. p. 101.

Gramen paniculatum odoratum. Baub. pin. 7.
prodr. 7.

Gramen mariæ borussorum. Loef. pruss. III. t. 26.

Aan den weg tusschen Rotterdam en Overschie; ook
by Gouda en Bodegraven. (D. RAINVILLE.)

Flosculus intermedius minor constanter fere femineus
est, rarissime hermaphroditus diandrus apud nos
conspicitur.

V A L A N T I A.

830. *VALANTIA* floribus masculis quadrifidis, pe- ^{Cruciata.}
dunculis diphyllis. Sp. 1491. n. 6. Gelr. 73.
app. p. 244.

Cruciata hirsuta. Baub. pin. 335. f. 9. t. 21. f. 1.

Cruciata. Dod. pempt. 357.

Overvloedig in de Laanen van de Heerlykheid Loen-
nen en Hemmen in de Betuwe; by Zutphen,
Rysfelt, op 't Blik, en elders in 't Graafschap
Zutphen; in de Marsstraat by de Latmer, en by
Brummen op de Veluwe; aan den laage weg tus-
schen Wageningen en de Greb; aan den Dyk
tusschen Zoelmonden Beuzichem in 't Graafschap
Buuren; by Amerongen in 't Sticht van Utrecht.

P A R I E T A R I A.

831. *PARIETARIA* foliis lanceolato-ovatis, pedun- ^{officinalis.}
cu-

culis dichotomis, calycibus diphyllis. *Sp.* 1492. n. 1. *Gelr.* 554.

Parietaria officinarum et dioscoridis. *Baub. pin.* 121. *Comm. boll.* 85. *Morif. bist.* 2. p. 600. f. 5. t. 30. f. 1.

Helxinc. *Cam. epit.* 849.

Oed dan. t. 521.

Glas - kruid. Belg.

Aan oude muuren te Nymegen, Tiel, Zutphen, Harderwyk, Haarlem, Leerdam, Utrecht, Zwol; aan de Tolkamer te Arnhem; te Alkmaar in den Hout; te Honswyk aan den Dyk; en elders.

A T R I P L E X.

Portulacoides. 832. ATRIPLEX caule fruticoso, foliis obovatis. *Sp.* 1493. n. 2. *Fris.* 416.

Halimus f. Portulaca marina. *Baub. pin.* 120. *Comm. boll.* 56.

Portulaca marina. *Dod. pempt.* 771.

Zee - Porcelyn. Belg.

Langs het Zee - en Maas - strand achter 's Gravezande; op het Koegras by Texel; aan de Zee - Dyken en Duinen der Zeeuwse - Eilanden; tusschen Rop-tazyl en Dykshoek, en elders in Friesland; aan den Dollert by Delfzyl.

laciniata. 833. ATRIPLEX caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis subtus argenteis. *Sp.* 1494. n. 8. *Gelr.* 557. *Fris.* 417.

Atriplex maritima laciniata. *Baub. pin.* 120. *Comm. boll.* 14. *Morif. bist.* 2. p. 607. f. 5. t. 32. f. 17.

Atriplex marina *Dod. pempt.* 615.

Zee - Melde. Belg.

Aan het Zeestrand by Harderwyk; langs de Muider-dyk; langs 't Maasstrand achter 's Gravezande; aan de Zee-dyk tusschen de Helder en 't Nieuwehdiep; en in Friesland by de voorige.

hastata. 834. ATRIPLEX caule herbaceo, calycis valvulis femineis magnis deltoidibus sinuatis. *Sp.* 1494. n. 9. *Gelr.* 644.

Atriplex sylvestris annua, folio deltoide triangulari sinuato & mucronato; hastæ cuspidi simili. *Morif. bist.* 2. p. 607. f. 5. t. 32. f. 14.

Langs de Wegen en op Mestboopen omtrent Amsterdam

POLYGAMIA MONOECIA. 273

dam en Zwol.

Hanc plantam COMMELINUS *indicavit nomine*
Atriplicis sylvestris alteræ C. B. *Vid. Comm.*
Cat. pl. Horti Med. Amst. p. 45.

835. ATRIPLEX caule herbaceo patulo, foliis sub-patula
deltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco
dentatis. *Sp.* 1494. *n.* 10. *Gelr.* 556. *Fris.* 418.
Atriplex angusto oblongo folio. *Baub. pin.* 119.
Comm. boll. 14.
Atriplex sylvestris polygoni f. helxines foliis.
Lob. ic. 257.
Laage wilde Melde. Belg.
Smeelje. Ultrajectinus.
By de Wegen, in Moosboven, Zaai-landen, by
Mest-en Vulnis-boopen.

836. ATRIPLEX caule herbaceo erecto, foliis omni-
bus linearibus integerrimis. *Sp.* 1494. *n.* 11. *Utralls.*
Fris. 419.
Atriplex angustissimo & longissimo folio. *Tourn.*
inst. 505. *Herm. lugdb.* 79.
Atriplex maritima angustifolia. *Comm. boll.* 14.
Zeer overvloedig aan de Wierdyk naar 't Nieuwe-
diep, en aan die van Texel; in de Buitendykſche
landen aan het Y; langs 't Maasstrand achter
's Gravezande; aan 't Zeeſtrand tuſſchen Harlin-
gen en Dykshoek, &c. in Friesland; en by
Delfzyl.

A C E R.

837. ACER foliis quinquelobis inæqualiter ferratis, *Pſendo-Pla-*
floribus racemosis. *Sp.* 1495. *n.* 2. *Gelr.* 228. *tanus.*
Acer montanum candidum. *Baub. pin.* 430. *Comm.*
boll. 3.
Acer majus. *Dod. pempt.* 840. *Lob. biſt.* 614.
Dubam. arb. 1. t. 36. f. 1.
Eſch-doorn, Aborn-boom, Luiten-boom, Violen-bout
of boom, Schotſche-Linde-boom. Belg.
In Hierden by Greven-hof, in Hulshorſt, en
elders buiten Harderwyk; in de Haarlemmer-
hout; in 't Boſch van 't Huis te Nieuwenburg
buiten Alkmaar; zeer veel aan de Goeſer-Wete-
ring achter Zandenburg by Wyk te Duurſtede;
S en

274 POLYGAMIA MONOECIA.

en op meer andere plaatsen.
Forſm olim aliunde allata.

campeſtre. 838. *ACER* foliis lobatis obtuſis emarginatis. *Sp.* 1497.
n. 7. *Gelr.* 227.

Acer campeſtre & minus. *Bauh. pin.* 431. *Comm.*
boll. 4.

Acer minus. *Dod. pempt.* 840.

Kleine Eſch-doorn, Boog-bout. Belg.

Eſſen-doorn. *Ruſticis.*

Spaanſche-Aak. *Vulgo.*

In Eldrik, Wehl, en elders in 't Graafſchap Zutphen; op Eſſenburg by Harderwyk; in de Haarlemmer-hout; in 't Berger-boſch buiten Alkmaar; ook by Deventer, Zwol, en elders.

D I O E C I A.

F R A X I N U S.

excelsior. 839. *FRAXINUS* foliis serratis, floribus apetalis.
Sp. 1509. *n.* 1. *Gelr.* 558. *Friſ.* 420.

Fraxinus excelsior. *Bauh. pin.* 416. *Comm. boll.*
 38.

Fraxinus. *Dod. pempt.* 833.

Eſſchen-boom. Belg.

Op veele plaatsen aan de Wegen, en in de Boſſchen; ook op oude Muuren.

Pharm. FRAXINI cort. ſem.

CLAS.

C L A S S I S XXIV.

C R Y P T O G A M I A.

F I L I C E S.

E Q U I S E T U M.

840. *EQUISETUM* caule spicato, frondibus com-*lylaticum.*
positis. *Sp.* 1516. n. 1.

Equisetum sylvaticum. Tabern. bist. 562.

Equisetum sylvaticum, tenuissimis setis. Baub.
pin. 16. *ibetr.* 245. *Boerb. lugdb.* 2. p. 107.

† *Volgens* BOERHAAVE.

841. *EQUISETUM* scapo fructificante nudo; sterili *arvense.*
frondoso. *Sp.* 1516. n. 2. *Gelr.* 560. *Fris.* 421.

Equisetum arvense longioribus setis. Baub. pin.
16.

Equisetum pratense, longissimis setis. Baub. pin.
16. *ibetr.* 246. f. 8.

Hermoes, Paards-Staart. Belg.

Roobol, Unjer. Rusticis.

In laage Wei-landen; ook in de Duinen.

842. *EQUISETUM* caule angulato, frondibus sim-*palustre.*
plicibus. *Sp.* 1516. n. 3. *Gelr.* 561. *Fris.* 422.

Equisetum palustre, brevioribus setis. Baub. pin.
16. *ibetr.* 242. *Comm. boll.* 33.

Klein Water-Paards-Staart. Belg.

Hout-pypen- Groningans.

β. *Equisetum palustre minus polytachyon. Baub.*
pin.

276 CRYPTO GAMIA FILICES.

pin. 16. prodr. 24. Raj. angl. 3. p. 131. t. 5. f. 3.

In vochtige-zandige gronden, en aan de Duin-beekjes; veelvuldig in de Slooten van 't Goreght buiten Groningen β. Tusschen Oudehorne en Oude-Berkoop dicht aan het Tol-buis in een uitwatering aan de Rivier de Kuinder.

Fruticosa. 843. *EQUISETUM* caule striato, frondibus subsimplicibus. Sp. 1517. n. 3.

Equisetum palustre, longioribus setis. Baub. pin. 15. theatr. 242. Comm. boll. 35.

Groot Paarde-Staart, Hermoes. Belg.

Breekebeen. Ultrajectinis.

β. *Equisetum palustre, tenuissimis & longissimis setis.*

Baub. pin. 16. prodr. 24. Baub. bist. 3. p. 729.

Boerb. lugdb. 2. p. 107. n. 4.

In vochtige Wei-landen, en aan de kanten der Slooten.

Pharm. CAUDÆ EQUINÆ herb.

Heremala. 844. *EQUISETUM* caule nudo scabro basi subracemoso. Sp. 1517. n. 6. Gelr. 562.

Equisetum. Cam. epit. 770. f. A.

Equisetum foliis nudum non ramosum, seu junceum. Baub. pin. 16. theatr. 248. f. 10. Comm. boll. 33.

Equisetum foliis nudum ramosum. Baub. pin. 16.

Boerb. lugdb. 2. p. 107.

Groot Paarde-Staart. Belg.

Schaafstroo. Vulgo.

In de Boffchen by ter Wolde op de Veluwe, en aande Land-straat in 't Graafschap Zutphen; als ook in stilstaande Slooten en Graften by de Vecht omtrent den Berg; en op meer plaatsen.

Scriniariis ad lævigandum inservit, unde Schaafstroo appellatur.

O P H I O G L O S S U M.

vulgatum. 845. *OPHIOGLOSSUM* fronde ovata. Sp. 1518. n. 1. Gelr. 564.

Ophioglossum vulgatum. Baub. pin. 548. Comm. boll. 82.

Ophioglossum. Dod. pempt. 139.

Oed.

CRYPTOGAMIA. FILICES. 377

Oed. dan. t. 147.

Aders - tong, Speer - kruid, Christi Lanct. Belg.
In de Duin - valeyen by 's Hage, en 't Huis te Brede-
rode; en in vochtige landen by Zutphen en Zwol.

O S M U N D A.

846. OSMUNDA scapo caulino solitario, fronde pin- *Lunaria*
nata solitaria. Sp. 1519. n. 2.

Lunaria racemosa minor & vulgaris, Baub. pin.

354. Comm. boll. 68.

Lunaria minor. Cam. epit. 643.

Oed. dan. t. 18.

Maan - kruid. Belg.

In de Duin - valeyen; veel achter 't Jooden Kerkhof
by 's Hage.

847. OSMUNDA frondibus bipinnatis apice racemi- *regalis*
feris. Sp. 1521. n. 15; Gelr. 563. Fris. 423.

Filix ramosa, non dentata florida. Baub. pin. 357.

Comm. boll. 38.

Filix palustris. Dod. pempt. 463.

Oed. dan. t. 217.

Water - Varen, Groote - Varen. Belg.

Aan donkere vochtige kanten der Slooten in Huls-
horst, Hierden, Tonzel, en elders omtrent
Harderwyk; by Naarden, Zwol; by Balk en op
meer plaatsen in de Wouden in Friesland; by de
Mickelhorst buiten Groningen.

Pharm. OSMUNDE REGALIS. rad.

848. OSMUNDA frondibus lanceolatis pinnatifidis: *Spicenna*
laciniis confluentibus integerrimis parallelis. Sp.

1522. n. 16. Gelr. 566. Fris. 424.

Lonchitis minor. Baub. pin. 359.

Lonchitis aspera. Dod. pempt. 469.

Polypodium folio vario. Tourn. inst. 540.

Struthiopteris. Hall. bist. 1687.

Oed. dan. t. 99.

Te Hulfen by Nymegen; in 't Bosch van Claren-
beek by Arnhem; in Tonzel aan de Nykerker-
weg buiten Harderwyk; omtrent den Tryfelberg
by Meulekate buiten Hattem; by den Zwalu-
wenberg; tusschen de Bilt en Zeist buiten Utrecht;
op veele plaatsen in de Wouden in Friesland; op

CRYPTOGAMIA FILICES.

de Mickelhorst, en aan den weg naar Onnen; en op vele andere plaatsen in de Provincie Groningen; en elders aan byna uitgedroogde Slooten onder de boomen.

III. HALLERUS (bibl. bot. tom. 2. p. 309.) recensens plantas minus vulgares in Flora Gelro-Zuiphanica a me enumeratas, banc plantam pene incredibilem pronunciat; sed si eximius ille Botanicus hanc provinciam unquam peragrasset, procul dubio de veritate convictus fuisset; eademque etiam hac planta non minus vulgaris in Dioecesi Ultrajectina a me, in Frisia ob Hortulano MRESE, et in Provincia Groningana a peritis Botanicis D. RAINVILLE & VAN MARUM observata fuit.

Legi banc plantam fronde superne bifida prope Har-derovicum.

P T E R I S.

aguilina.

849. PTERIS frondibus supradecompositis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis; superioribus minoribus. Sp. 1533. n. 13. Gelr. 565. Fris. 425.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. Baub. pin. 357. Comm. boll. 38.

Filix femina. Fuchs. hist. 596. Cam. epit. 992. Dod. pempt. 462.

Varen-Wyfske. Belg.

Overvloedig in de Besschen op vele plaatsen; en in de Duinen by Bennebroek, Egmond, en elders.

A S P L E N I U M.

Scelopendrium.

850. ASPLENIUM frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipulis hirsutis. Sp. 1537. n. 3.

Phyllitis. Cam. epit. 579. Dod. pempt. 567.

Lingua cervina officinarum. Baub. pin. 353. Comm. boll. 68. Plum. fil. 34. t. 4. f. 4.

Harts-tong. Belg.

In een oude Put in 't Weduwen-buis te Doesburg; en aan sommige oude Muren in de Stad Utrecht, Zwol, en elders.

Pharm. LINCEAE CERVINE herb.

851. As-

CRYPTOGAMIA FILICES.

851. *ASPLENIUM* frondibus pinnatis: pinnis sub-*Trichomanes*
rotundis crenatis. Sp. 1540. n. 19. Gelr. 645.
Trichomanes five *Polytrichum officinarum*. Baub.
pin. 356. Comm. boll. 111. Plum. fil. 26. t. V.
f. 1.
Trichomanes. Fuchs. hist. 796. Cam. epit. 925.
Dod. pempt. 471.
Oed. dan. t. 119.
Wederdood, Steenbreek. Belg.
Aan de Noord-zyde van de Grootte Kerk te Harder-
wyk; aan de muur om 't Huis te Zwanenburg;
aan de Kerk en Pastory-muur te Zoelen in de
Betawe; te Boven-Karspel en te Barsingerhorn
in Noord-Holland; en aan de muur van de oude
Brug van 't Huis Ypensteijn by Alkmaar.
Pharm. POLYTRICHI f. TRICHOMANIS herb.
852. *ASPLENIUM* frondibus alternatim decomposi- *Ruta mura-*
tis: foliolis cuneiformibus crenulatis. Sp. 1541. *ria*.
n. 22. Gelr. 567. Fris. 426.
Ruta muraria. Baub. pin. 355. Dod. pempt. 470.
Comm. boll. 100.
Oed. dan. t. 190.
Steen-Ruite, Muur-Ruite, Venus-Hayr. Belg.
Aan oude Muuren op veele plaatsen.
Pharm. ADICANHI ALBI f. RUTAE MURARIAE
herb.

P O L Y P O D I U M.

853. *POLYPODIUM* frondibus pinnatifidis: pinnis *vulgare*.
oblongis subserratis obtusis, radice squamata.
Sp. 1544. n. 13. Gelr. 568. Fris. 427.
Polypodium vulgare. Baub. pin. 359. Comm. boll.
91. Plum. fil. 27. t. A. f. 2.
Polypodium majus. Dod. pempt. 464.
Boom-Varen, Engelzoet. Belg.
β. *Polypodium minus*. Baub. pin. 359. Dod. pempt.
464. Boerb. lugdb. 1. p. 24.
Op veele plaatsen aan Wallen, Wegen, en in de
Bosschen, op oude Wilge-boomen; en aan de wor-
tels van de Eike-boomen.
Pharm. POLYPODII rad. herb.
Dum florere incipit, primum se flores praesent in fo-
liolis superioribus.

280 CRYPTOGAMIA FILICES.

crispatum. 854. *POLYPODIUM* frondibus subbipinnatis: foliis ovato-oblongis; pinnis obtusiusculis apice acute serratis. *Sp.* 1551. n. 42. *Fris.* 428.
Filix non ramosa major pinnulis latiusculis longioribus in profundos denticulos divisis. *Morif. bist.* 3. p. 579. f. 14. t. 3. f. 11.
Omtrent Oude-Berkoop in een Bosch niet verre van de Ry-weg. (MEESE.)

Filix mas. 855. *POLYPODIUM* frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Sp.* 1551. n. 43. *Gelr.* 569. *Fris.* 429.
Filix non ramosa dentata. *Baub. pin.* 358. *Comm. boll.* 38.
Filix mas. *Dod. pempt.* 464.
Varen Manneke, Bosch-Varen. Belg.
In de Bosschen, en op andere donkere vochtige plaatsen.
Pharm. FILICIS rad. berb.

F. femina. 856. *POLYPODIUM* frondibus bipinnatis: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Sp.* 1551. n. 44. *Fris.* 430.
Filix mas non ramosa, pinnulis angustis rarioribus profunde dentatis. *Morif. bist.* 3. p. 579. f. 14. t. 3. f. 8.
Filicula petræa fæmina 1. *Tabern. ic.* 793.
In de Bosschen van Zandhorst, en elders op schad-achtige plaatsen; op Leeuwenberg in 't Sticht van Utrecht tusschen de steenen der Pedistallen; ook by de voorige, dog zeldzaamer.

P I L U L A R I A.

globulifera. 857. *PILULARIA.* *Sp.* 1563. n. 1. *Fris.* 431.
Pilularia palustris juncifolia. *Vaill. par.* 459. t. 15. f. 6. *Dill. musc.* 538. t. 79. f. 1. *Fuss. act.* 1739. p. 240. t. 11.
Graminifolia palustris repens, vasculis granorum piperis æmulis. *Morif. bist.* 3. p. 608. f. 15. t. 7. f. 49.
Oed. dan. t. 223.
In Friesland ten Oosten Kuik-horne en Bergum aan een Water-poel.

MUS-

M U S C I.

L Y C O P O D I U M.

858. *LYCOPodium* foliis sparsis filamentosis, spicis *clavatum*. teretibus pedunculatis geminis. *Sp.* 1564. *n.* 4.

Gelr. 578. *Fris.* 432.

Lycopodium vulgare pilosum anfrachiosum & repens. *Dill. musc.* 441. *t.* 58. *f.* 1.

Muscus terrestris clavatus. *Baub. pin.* 360. *Comm. boll.* 77.

Oed. dan. t. 126.

Wolfs - Klaauw. Belg.

Op de Heide by Uilenpas, Harderwyk, Veldwyk, Lovenich, aan den Tryfel-berg, in 't Sourfe-Bosch, &c. in Gelderland; by Naarden en Velsen in Holland; by Amersfoort en Doorn in 't Sticht van Utrecht; te Bergum, Dragten, &c. in Friesland.

Pharm. LYCOPODII sem. (pollen.)

In Russia, vernali præsertim tempore, sæpe observatur pluvia sulphurea dicta, quæ est pluvia, cui permixtus est pollen hujus Lycopodii, in spicis præcedentis autumnæ residuus, & vere per ventium dispersus.

859. *LYCOPodium* foliis sparsis integerrimis, spicis terminalibus foliosis *Sp.* 1565. *n.* 8. *Gelr.*

654. *Fris.* 433.

Lycopodium palustre repens, clava singulari.

Vaill. par. 123. *t.* 16. *f.* 11. *Dill. musc.* 452.

t. 62. *f.* 7.

Op 't Ermeller-Veld buiten Harderwyk op vochtige plaatsen; in Friesland by 't voorige.

860. *LYCOPodium* foliis sparsis octofariis, caule *Selago*. dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis.

Sp. 1565. *n.* 9. *Jngr.* 166. *Fris.* 434.

Selago vulgaris abietis rubræ facie. *Dill. musc.*

435. *t.* 56. *f.* 1.

Muscus erectus ramosus saturate viridis. *Baub. pin.* 360.

Oed. dan. t. 104.

In Friesland op verscheide plaatsen in de Wouden op Hei-velden.

alpinum. 861. *LYCOPodium* foliis quadifariam imbricatis acutis, caulibus, erectis bifidis, spicis sessilibus teretibus. *Sp. 1567. n. 15. Gelr. 655.*

Lycopodium fabinæ facie. *Dill. musc. t. 58. f. 2. (non synonyma.)*

Muscus clavatus, foliis cupressi. Raf. bist. 121.

Oed. dan. t. 79.

Hexen-krans. Zutphaniensibus.

Op Kappentulte tusschen Zethem en Halm in 't Graaffschap Zutphen, en op de Heide te Deelen en omtrent Lovenich op de Veluwe.

S P H A G N U M.

palustre. 862. *SPHAGNUM* ramis deflexis. *Sp. 1569. n. 1. Gelr. 577. Fris. 435.*

Sphagnum palustre molle deflexum, squamis cymbiformibus. *Dill. musc. 240. t. 32. f. 1.*

Muscus vulgarissimus. Baux. pin. 360. Comm. boll. 76.

Oed. dan. t. 474.

β. *Sphagnum* palustre molle deflexum, squamis capillaceis. *Dill. musc. 243. t. 32. f. 2.*

Op vochtige Hei-gronden in Water-kuilen buiten Harderwyk, Utrecht, Zwol, in de Wouden in Friesland, en elders.

Muscus terrestris & hortensis. I. B. quem COM-MELINUS *buc refert, est Hypnum sericeum.*

P H A S C U M.

acaule. 863. *PHASCUM* acaule, antheria sessili, foliis ovatis acutis. *Sp. 1570. n. 1. Fris. 436.*

Phascum acaule bulbiforme minus. *Dill. musc. 251. t. 32. f. 12.*

Muscus trichodes acaulos minor latifolius. Vaill. par. 128. t. 27. f. 2.

Oed. dan. t. 249. f. 3.

Aan de Graften om 't Huis Staverden op de Veluwe; op de Bergummer-Heide, en aan de kant

ten van vochtige gruppels by Hitzum en Schalsum
in Friesland.

F O N T I N A L I S.

864. FONTINALIS foliis complicato-carinatis tri-*antipyretica*
fariis acutis, antheris lateralibus. Sp. 1571.

n. 1. Frif. 437.

Fontinalis triangularis major complicata, e folio-
rum alis capsulifera. Dill. musc. 254. t. 33. f. 1.

Muscus aquaticus, folio expanso. Baub. prodr.
152. n. 14.

In donkere Bosschen, en in Slooten en natte Gruppels
onder de Boomen, op veele plaatsen in de Wouden
in Friesland.

865. FONTINALIS foliis imbricatis subulato-lance-*squamosa*
olatis, antheris lateralibus. Sp. 1571. n. 3. Frif.
438.

Fontinalis squamosa tenuis sericea atro-virens.
Dill. musc. 259. t. 33. f. 3.

Fontinalis minor lucens. Baub. bist. 3. p. 778.
Te Franeker gevonden in een Regenbak.

866. FONTINALIS foliis lineari-fetaceis. Linn. suec. *capillacea*.
2. 962. Frif. 439.

Fontinalis capillacea, calycibus stili instar cuspi-
datis. Dill. musc. 260. t. 23. f. 5.

In natte laagten tusschen Franeker en Harlingen op
verscheide plaatsen.

P O L Y T R I C H U M.

867. POLYTRICHUM caule simplici, anthera pa-*communis*
rallelopipeda. Sp. 1573. n. 1. Gelr. 570. Frif.
440.

Mas & Femina.

- a. Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis
ferratis. Dill. musc. 420. t. 54. f. 1.

Polytrichum aureum majus. Baub. ptn. 356.

Adiantum aureum. Tabern. ic. 797.

- Gel of goud Vrouwen-Hayr, Gulden-Hayr,
Gulde Wederdood. Belg.

- β. Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis brevi-
oribus & rigidioribus. Dill. musc. 424. t. 54. f. 2.

Po.

Polytrichum aureum medium. *Baub. pin.* 356.
Camm. boll. 91.

Muscus coronatus humilis rigidior, capitulis longis acutis sessilibus erectis. *Morif. bist.* 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 8. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 31.

Muscus coronatus medius, pileolo villosio tenuiore. *Morif. bist.* 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 6. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 30.

Muscus coronatus humilis tenuifolius, pileolo minore acutiore ruberrimo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 33.

Muscus capillaris, floribus in apice coccineis expansis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 35. *Buxb. cent.* 1. p. 41. t. 62. f. 2.

γ. *Polytrichum quadrangulare minus*, juniperi foliis pilosis. *Dill. musc.* 426. t. 54. f. 3.

Overvloedig op vochtige Hey-gronden en Moschachtige plaatsen.

Pharm. ADIANTHI AUREI *berb.*

Diversitas sexus, ætatis & soli fecit, ut una hæc eademque species pro tot diversis Muscis habita fuerit.

M N I U M.

androgynum. 868. *MNIUM* caule ramoso, androgynum. *Sp.* 1574. n. 4.

Mnium perangustis & brevibus foliis. *Dill. musc.* 230. t. 31. f. 1.

Muscus coronatus humilis minimus, foliolis, pediculis & capitulis minimis erectis. *Morif. bist.* 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 20.

Oed. dan. t. 299.

In de Duinen en in den Hout te Haarlem. (MEERBURGH.)

hygrometricum. 869. *MNIUM* acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. *Sp.* 1574. n. 5. *Fris.* 441.

Bryum bulbiferum aureum, calyptra quadrangulari, capsulis pyriformibus nutantibus. *Dill. musc.* 467. t. 52. f. 75.

Muscus coronatus minor, foliolis latiusculis ad caulem convolutis, capitulis cernuis & obtusis aureis. *Morif. bist.* 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 17. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 37.

Mus-

Muscus aureus capillaris minor. *Herm. lugdb.* 432.

Boerb. lugdb. 1. p. 22. n. 41.

Polytrichum aureum minus. *Baub. pin.* 357. *Comm. boll.* 91.

Op oude vochtige muuren en steenachtige dorre plaatsen onder 't geboomte; ook in de Dainen by 's Hage omtrent Backershagen.

870. *MNIUM caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis.* *Sp.* 1575. n. 6.

Bryum tenue stellatum, setis purpureis. *Dill. musc.* 386. t. 49. f. 51.

Muscus trichodes parvus, foliis musci vulgaris, capitulis longis acutis. *Morif. bist.* 3. p. 628. f. 17. t. 6. f. 4. 16.

Aan oude paalen en boomen by 't Huis Endelgeer. (MEERBURGH.)

871. *MNIUM antheris erectis, opereulis filiformibus* *setaceum.* *longitudine antherarum.* *Sp.* 1575. n. 7.

Bryum stellare nitidum pallidum, capsulis tenuissimis. *Dill. musc.* 381. t. 48. f. 44.

Op de Hooybergen en eenige Wilge-boomen by Noordwyk. (MEERBURGH.)

872. *MNIUM antheris pendulis, pedunculo curvato,* *hornum.* *furculo simplici, foliolis margine scabris.* *Sp.* 1576. n. 10. *Fris.* 443.

Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis magnis nutantibus. *Dill. musc.* 402. t. 51. f. 71.

β. *Muscus polytrichodes humilior, foliis brevioribus raris, pallide viridantibus & vix pellucidis.* *Morif. bist.* 3. p. 630. f. 15. t. 6. f. 3. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 16.

In 't Haagsche en andere Bosschen op de wortels der Eiken.

873. *MNIUM antheris pendulis, foliis ovatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis.* *Syst. edit.* 13. p. 796. n. 19.

Bryum capillare. *Sp.* 1586. n. 30. *fl. belg.* 861.

Bryum foliis latiusculis congestis, capsulis longis nutantibus. *Dill. musc.* 398. t. 59. f. 67.

Polytrichum aureum in minimum, capitulo oblongo,

go, subflavi coloris. *Comm. boll.* 91.

Muscus aureus capillaris minimus, capitulo longo subflavo. Herm. lugdb. 432. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 38.

Op zandige gronden by Harderwyk, Haarlem, en elders.

crudum. 874. *MNIUM* antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis. *Sp.* 1576. n. 11. *Fris.* 443.

Bryum pendulum hornum molle, foliis & lanceolatis & gramineis. *Dill. musc.* 401. t. 5 f. 70.

Veel in de Bosfchen en aan kanten van gruppels; te Leiden op de Stads-muuren.

serpyllifolium. 875. *MNIUM* pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Sp.* 1577. n. 14. *Fris.* 444.

punctatum. α. *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis obovatis intergerrimis obtusis punctatis.

Bryum pendulum, serpilli folio rotundiore pellucido, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 416. t. 53. f. 81.

Muscus polytrichoides palustris, major serpilli latioris folio pellucido. *Morif. bist.* 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 39. 40.

cuspdatum β. *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis alternis acutis serratis.

Bryum pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 413. t. 53. f. 79.

Muscus palustris, foliis subrotundis. *Vaill. par.* t. 26. f. 18.

proliferum γ. *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-congestis lanceolatis acutis. *Gehr.* 646.

Bryum stellare roseum majus, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc.* 411. t. 52. f. 77.

Muscus stellaris roseus. Baub. pin. 361. *prodr.* 151.

undulatum δ. *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis.

Bryum dendroides polycephalon, phyllitidis folio undulato pellucido, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc.* 410. t. 52. f. 76.

Muscus ad polytrichodem accedens ramosus, foliis longis lucidis & veluti crispis. *Morif. bist.* 3. p. 630. f. 15. t. 6. f. 1. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 14.

Mus-

Muscus terrestris ramosus, foliolis latioribus & longioribus crispis, capitulis cylindricis nutantibus, major & minor. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 36.

α. *Te Catwyk aan't eind van 't Malle-gat tusschen het gras.* β. *Aldaar, en veel in 't Haagse-Bosch.* γ. *Te Heemse in Overysfel.* δ. *Omrent Hitzum, en op verscheide plaatsen in de Wouden in Friesland.*

876 *MNIUM* foliis distichis bifidis. *Sp.* 1579. n. 17. *Assum.*
Mnium trichomanis facie, foliolis bifidis. *Dill. musc.* 237. t. 31. f. 6.

Jungermaunia terrestris repens, foliolis ex rotunditate acuminatis bifidis, apertura pene visibili. *Mich. gen.* 8. t. 5. f. 14.

In den Haarlemmer-hout en 't Haagsche-Bosch.
(MEERBURGH.)

877. *MNIUM* foliis distichis, pinnis subtus auricula-*Jungermaunia.*
tis. *Sp.* 1579. n. 18.

Lichenastrum alpinum purpureum, foliis auritis & cochleariformibus. *Dill. musc.* 479. t. 69. f. 1.

Jungermaunia alpina palustris purpurea cambrica, foliis rotundioribus auritis tenuissime denticulatis. *Mich. gen.* 6. t. 5. f. 16.

Te Leiden op de Stads-muuren. (MEERBURGH.)

B R Y U M.

878. *BRYUM* antheris sessilibus terminalibus, calyptra apocarpum.
minima. *Sp.* 1579. n. 1. *Fris.* 445.

Sphagnum subhirtutum obscure virens, capsulis rubellis. *Dill. musc.* 245. t. 32. f. 4.

Muscus apocarpos hirsutus saxi adnascens, capsulis obscure rubris. *Vaill. par.* 129. t. 21. f. 15.

Oed. dan. t. 480.

Op Muuren en oude Boomen.

879. *BRYUM* antheris sessilibus sparsis, calyptris striatis
striatis sursumve pilosis. *Sp.* 1579. n. 2. *Fris.* 446.

Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus, majus. *Dill. musc.* 439. t. 55. f. 2.

Mus.

Muscus apocarpus arboreus ramosus. Vaill. par.
129. t. 25. f. 5. 6.
Op veele plaatsen aan de Boomen.

pomiforme. 880. *BRYUM* antheris erectis sphæricis. *Sp.* 1580. n. 3.
Bryum capillaceum, capsulis sphæricis. *Dill. musc.*
339. t. 44. f. 6.
Muscus trichodes minimus sericeus capillaceus,
capitulis sphæricis. Moris. bist. 3. p. 628. f. 15.
t. 6. f. 6. Vaill. par. 129. t. 24. f. 9. 12.
In 't Haagsche-Bosch in eenige groepen. (MEER-
BURGH.)

pyriforme. 881 *BRYUM* antheris erectis obovatis, calyptra subu-
lata, furculis acaulibus, foliis ovatis muticis.
Sp. 1580. n. 4. *Fris.* 447.
Bryum serpillifolium pellucidum, capsulis pyri-
formibus. *Dill. musc.* 345. t. 44. f. 6.
Muscus capillaceus minimus capitulis pyriformi-
bus turgidis. Vaill. par. 129. t. 29. f. 3.
Aan schaduwachtige wallen, in schraale Weiden, en
in de Duinen by 's Gravenhage.

extinctori-
um. 882. *BRYUM* anthera erecta oblonga minori, caly-
ptis laxis æqualibus. *Sp.* 1581. n. 5.
Bryum calyptra extinctorii forma minus. *Dill.*
musc. 349. t. 45. f. 8.
Muscus coronatus humilis tenuifolius, pileolo
magno acuto infra aperto extinctorium refe-
rente. Moris. bist. 3. p. 630. f. 15. t. 7. f. 12.
Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 32.
In den Enck by Harderwyk.

subulatum. 883. *BRYUM* antheris erectis subulatis; furculis acau-
libus. *Sp.* 1581. n. 6. *Gelr.* 647. *Fris.* 448.
Bryum capsulis longis subulatis. *Dill. musc.* 350.
t. 45. f. 10.
Muscus terrestris capillaris, capsula longa. Cym.
boll. 77.
Muscus subtilissimus omnium, ramosus terrestris,
capitulis falcatis, minimus. Boerb. lugdb. 1. p.
22. n. 42.
Op vochtige Zand-gronden, en onder aan sommige
stammen van Boomen.
Dillenius musc. 328. Muscum Boerhaavii refert ad
suum

Juum Hypnum fericeum ramosius & tenuius,
capsulis acuminatis.

884. BRYUM antheris erectiusculis, foliis piliferis re- *rurale*.
curvis. *Sp.* 1581. *n.* 7. *Gehr.* 571. *Fris.* 449.

Bryum rurale unguiculatum hirsutum elatius & ra-
mosius. *Dill. musc.* 352. *t.* 45. *f.* 12.

Muscus erectus hirsutus, capitulis oblongis acutis,
unguiculis avicularum similibus, vulgarissimus.

Morif. bist. 3. *p.* 628. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 1.

Polytrichon apuleji minus quorundam. *Baub. bist.*
3. *p.* 760. (*quo ad descriptionem.*)

*Op de daken van Boere-woningen en oude Muuren,
en tusschen de steenen der Straaten; ook in de Dui-
nen by Haarlem.*

885. BRYUM antheris erectis, foliis piliferis recti- *muralis*.
usculis, furculis simplicibus cæspitosis. *Sp.* 1581.
n. 8. *Fris.* 450.

Bryum tegulare humile pilosum & incanum. *Dill.*
musc. 355. *t.* 45. *f.* 14.

By de voorgaande.

886. BRYUM antheris erectiusculis, pedunculis ag- *scoparium*.
gregatis, foliis secundis recurvatis, caule de-
clinato. *Sp.* 1582. *n.* 9. *Fris.* 451.

Bryum reclinatum, foliis falcatis, scoparum effi-
gie. *Dill. musc.* 357. *t.* 46. *f.* 16.

Muscus coronatus medius, foliis tenuissimis palli-
dis longioribus, capitulis erectis acutis. *Morif.*

bist. 3. *p.* 630. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 11. *Boerb. lugdb.*
1. *p.* 21. *n.* 34.

*In de Boffchen op de wortels van verrotte Boomen,
en op Hei-velden.*

887. BRYUM antheris erectiusculis, pedunculis sub- *undulatum*
solitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis
patentibus ferratis. *Sp.* 1582. *n.* 10.

Bryum phyllitidis folio rugoso acuto, capsulis
incurvis. *Dill. musc.* 360. *t.* 46. *f.* 18.

Muscus saxatilis viridissimus, foliolis longioribus
crispis. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 47.

Oed. dan. t. 477.

*In 't Haagfche-Bosch op vochtige plaatsen, en op
wortels van Boomen.*

T

888. BRY-

- glaucum.* 888. *BRYUM* antheris erectiusculis: operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, furculis ramosis. *Sp.* 1582. n. 11.
Bryum albidum & glaucum fragile majus, foliis erectis, setis brevibus. *Dill. musc.* 362. t. 46. f. 20.
Muscus capillaceus albus montanus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 21. n. 28.
Muscus trichoides montanus albidus fragilis. *Morif. bist.* 3 p. 630. f. 15. t. 6. f. 22. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 8.
Op de Heide by Harderwyk en elders.
- pellucidum.* 889. *BRYUM* antheris erectiusculis, foliis recurvis acutis, caule hirsuto. *Sp.* 1583. n. 12.
Bryum palustre pellucidum, capsulis & foliis brevibus recurvis. *Dill. musc.* 364. t. 46. f. 23.
Muscus polytrichodes elatior, foliis angustis pellucidis & fere membranaceis. *Pluk. phyt.* t. 44. f. 7. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 15.
In de Moerassen.
- flexuosum.* 890. *BRYUM* antheris erectis, foliis setaceis, pedunculis flexuosis. *Sp.* 1583. n. 15. *Frif.* 442.
Bryum pilosum molle, setis intortis. *Dill. musc.* 375. t. 47. f. 33.
Omtrent bet Heerenveen, en elders in de Wouden, op Hei-velden aan Dykjes en Wegen.
- heteromallum.* 891. *BRYUM* antheris erectis, foliis setaceis secundis. *Sp.* 1583. n. 16. *Gelr.* 618. *Frif.* 453.
Bryum heteromallum. *Dill. musc.* 375. t. 47. f. 37.
Muscus capillaceus, foliis unam partem spectantibus. *Vaill. par.* 132. t. 27. f. 7.
Muscus terrestris non ramosus, fili araneæ tenuitate, capitulis falcatis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 22. n. 43.
Oed. dan. t. 479.
Veel op de Heide, ook onder de Heggen, en ook wel op de stammen en takken van Boomen.
- runcatum.* 892. *BRYUM* antheris erectis subrotundis: operculo mucronato. *Sp.* 1584. n. 18. *Frif.* 454.
Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dill. musc.* 347. t. 45. f. 7.

Mus-

Muscus coronatus minimus, foliolis & capitulis oblongis in pediculis brevissimis. Morif. bist. 3. p. 631. f. 15. t. 7. f. 18. Boerb. lugdb. 1. p. 52. n. 44.

In schraale Landen en aan kanten van Gruppels &c. op veele plaatsen.

893. *BRYUM antheris erectis ovatis, foliis lanceola- viridulum*
tis acuminatis imbricato-patulis. Sp. 1584. n.
19. Gelr. 649.

Bryum capillaceum breve, pallide & laete virens, capsulis ovatis. Dill. musc. 380. t. 48. f. 43.

Muscus capillaceus omnium minimus, foliolis longioribus & angustioribus. Vaill. par. 130. t. 29. f. 5.

In de Koorn-landen in Hierden buiten Harderwyk.

894 *BRYUM antheris erectis, furculo rectiusculo, hypnoides.*
ramis lateralibus brevibus fertilibus. Sp. 1584.
n. 21. Frisf. 455.

Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum. Dill. musc. 372. t. 47. f. 32.

Muscus terrestri vulgari similis lanuginosus. Morif. bist. 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 7. Raj. syn. 37. Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 17.

Oed. dan. t. 476.

β. *Bryum hypnoides, hirsutie canescens, vulgare.*
Dill. musc. 368. t. 47. f. 27.

Muscus terrestris tenuioribus foliis, cespitosus, varius. Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 18.

Op donkere vochtige schaduwachtige plaatsen op de grond, steenen, onder aan de stammen der Boomen, ook op de Hei-velden, en aan Dykjes.

895 *BRYUM antheris pendulis, furculis cy'indricis argenteum.*
imbricatis laevibus. Sp. 1586. n. 27. Gelr. 650.

Bryum pendulum julaceum argenteum & fericeum. Dill. musc. 392. t. 50. f. 62.

Muscus minimus e viridi argenteus, capitulis oblongis cernuis. Morif. bist. 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 17. Boerb. lugdb. 1. p. 22. n. 49.

Muscus saxatilis fericoides. Comm. boll. 77.

β. *Bryum pendulum, furculis teretibus viridibus.*
Dill. musc. 394. t. 50. f. 63.

Zy-achtig Steen-Mosch. Belg.

Op vochtige steenen en daken der buizen. β. in eenige boven op de steenen.

pulvinatum 896. BRYUM antheris subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. Sp. 1586. n. 28. Gelr. 573.

Bryum orbiculare pulvinatum hirsutie canescens, capsulis immerfis. Dill. musc. 359. t. 50. f. 65.

Muscus capillaceus lanuginosus minimus. Vaill. par. 133. t. 29. f. 2. Eoerb. lugdb. 1. p. 22. n. 48.

Muscus aureus capillaris minimus, capitulo oblongo-rotundum subviridi. Herm. lugdb. 432. Eoerb. lugdb. 1. p. 21. n. 39.

Polytrichum aureum minimum capitulatum, oblongo-rotundum, colore subviridi. Comm. boll. 91.

Op vochtige zand-gronden en oude muuren, en op allerhande oude daken aan de Noordzyde.

caespiticium. 897. BRYUM antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-fetaceis, pedunculis longissimis. Sp. 1586. n. 29. Gelr. 572. Frisf. 456.

Bryum pendulum ovatum caespiticium & pilosum, seta bicolori. Dill. musc. 396. t. 50. f. 66.

Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. Vaill. par. 134. t. 29. f. 7.

Op oude Muuren en allerhande Daken, en vochtige Hei-gronden.

898. BRYUM parvum furculis & fetis geminatis. Dill. musc. 385. t. 49. f. 50.

Op sommige Muuren te Voorschooten. (MEERBURGH.)

H Y P N U M.

taxifolium. 899. HYPNUM fronde simplicissima pinnata lanceolata basi pedunculifera. Sp. 1587. n. 2. Frisf. 457.

Hypnum taxiforme minus: basi capsulifera. Dill. musc. 263. t. 34. f. 2.

Muscus pennatus, capitulis adiantici. Vaill. par. 136. t. 24. f. 11.

Oed. dan. t. 473. f. 2.

Op veele plaatsen tusschen het Gras, en op andere vochtige plaatsen.

900. *HYPNUM* fronde pinnata simplici: pinnis dupli-^{denticula-}
catis basi pedunculifera. *Sp.* 1588. *n.* 3. *Fris.* 258.^{tum.}
Hypnum denticulatum pennatum, pinnulis du-
plicato-recurvis. Dill. musc. 266. *t.* 34. *f.* 5.
Muscus filicinus minor, capitulis longis gracili-
bus acutis. Boerb. lugdb. 1. *p.* 20. *n.* 21.
By de voorgaande.
901. *HYPNUM* fronde simplicissima pinnata lanceola-^{bryoides.}
ta apice pedunculifera. *Sp.* 1588. *n.* 4.
Hypnum taxiforme exiguum versus summitatem
capuliferum. Dill. musc. 262. *t.* 34. *f.* 1.
Muscus polytrichoides exiguis capitulis in summis
furculis f. foliis subrotundis erectis. Vaill. par.
163. t. 24. f. 13. Morif. bist. 3. *p.* 629. *f.* 15.
t. 6. *f.* 11.
Oed. dan. *t.* 473. *f.* 1.
In bet. Haagſche - Boſch in vochtige groepen.
(MEERBURGH.)
902. *HYPNUM* fronde pinnata ramosa erecta medio ^{adiantoides.}
pedunculifera *Sp.* 1588. *n.* 6.
Hypnum taxiforme palustre ramosum majus et
erectum. Dill. musc. 264. *t.* 34. *f.* 3.
Muscus taxiformis ramosus. Vaill. par. 136. *t.*
28. f. 5.
In bet. Haagſche - Boſch op de wortels der Boomen.
(MEERBURGH.)
903. *HYPNUM* fronde pinnata ramosa: foliolis im-^{complan-}
bricatis acutis complicatis compressis. *Sp.* 1588.^{tum.}
n. 7.
Hypnum pennatum compressum & splendens,
capulis ovatis. Dill. musc. 268. *t.* 34. *f.* 7.
Muscus trichomanoides filicifolius splendens.
Vaill. par. 139. *t.* 23. *f.* 4.
In de Duinen by Hillegom en Noordwyk. (MEER-
BURGH.)
904. *HYPNUM* furculis ramosis, frondibus subpinna-^{crispum.}
tis: foliolis undulatis planis. *Sp.* 1589. *n.* 11.
Hypnum pennatum undulatum crispum, fetis &
capulis brevibus. Dill. musc. 273. *t.* 36. *f.*
12. B.

Muscus squamosus linearis folio minor, crispus, capitulis recurvis. Tourn. inst. 554. Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 13.

† *Volgens BOERHAAVE.*

triquetrum 905. *HYPNUM* ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Sp. 1589. n. 12. Frisf. 459.*
Hypnum vulgare triangulum maximum & pallidum. Dill. musc. 293. t. 8 f. 28.
Muscus ramosus major spermatophorus. Vaill. par. 137 t. 29. f. 9.
Op veele plaatsen in de Wei-landen en ruige Hoven tusschen het Gras.

ovulabium. 906. *HYPNUM* ramis vagis subrepentibus, foliolis mucronatis imbricatis. *Sp. 1590. n. 13. Frisf. 460.*
Hypnum dentatum vulgarissimum, operculis obtusis. Dill. musc. 295. t. 38. f. 29.
Muscus squamosus ramosus crassior, capitulis incurvis. Tourn. inst. 553. Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 5.
Muscus denticulatus minor sericeus nostras, capitulis adianthi. Morisf. bist. 3. p. 626. f. 15. t. 6. f. 35. Boerb. lugdb. 1. p. 22. n. 44.
By de voorige.

filicinum. 907 *HYPNUM* furculis pennatis: ramulis distantibus, foliolis imbricatis incurvis secundis. *Sp. 1590. n. 14.*
Hypnum repens filicinum crispum. Dill. musc. 282. t. 26. f. 19.
Muscus repens ramosus pennatus, subtilissime divisus, foliolis crispis. Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 25.
In vochtige Wei-landen, op veele plaatsen.

proliferum. 908. *HYPNUM* furculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Sp. 1590. n. 15. Gehr. 575.*
Hypnum filicinum, tamarisci foliis minoribus non splendens. Dill. musc. 276. t. 35. f. 14.
Muscus filicinus major. Baub. pin. 360. Morisf. bist. 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 20. Tourn. inst.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

295

556. t. 326. f. C. Vaill. par. 140. t. 25. f. 1.
Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 22.

Veel in de Boffchen, en in de Salker-waart.

Muscus filicinus minor Baub. prodr. 151. Boerb.
151. Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 23. *quijnam si,*
dubia res est.

909. HYPNUM furculis plano-pinnatis continuatis, *parietinum*
pedunculis aggregatis. Sp. 1590. n. 17. Geir.
576.

Hypnum filicinum, tamarisci foliis majoribus
splendentibus. Dill. musc. 274. t. 35. f. 13.

Muscus vulgaris pennatus major. Baub. pin. 360.
Vaill. par. t. 28. f. 1.

In de Boffchadie van't Huis Staverden op de Ve-
luwe.

910. HYPNUM furculis subbipinnatis decumbentibus: *prælongum*
ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cer-
nuis. Sp. 1591. n. 18. Fris. 461. Jngr. 171.

Hypnum repens filicinum, triangularibus parvis
foliis, prælongum. Dill. musc. 278. t. 35. f. 15.

Muscus repens ramosus pennatus, subtilissima
divisura. Boerb. lugdb. 1. p. 21. n. 26.

In veele Boffchen, onder oude Heggen, en op oud
bout.

911. HYPNUM furculis pinnatis: ramulis approxi- *Crista ca-*
matis: apicibus recurvis. Sp. 1591. n. 19. *strensis.*

Hypnum filicinum, cristam castrensem represen-
tans. Dill. musc. 284. t. 36. f. 20.

Muscus repens ramosus pennatus, subtilissime di-
visus, foliolis crispis reflexis. Boerb. lugdb. 1.
p. 21. n. 27.

† Volgens BOERHAAVE.

912. HYPNUM furculis pinnatis teretiusculis remotis *abietinum.*
inæqualibus. Sp. 1591. n. 20.

Hypnum lutescens, alis subulatis tenacibus. Dill.
musc. 280. t. 35. f. 17.

Muscus squamosus ericæ folio ramosissimus. Boerb.
lugdb. 1. p. 20. n. 11.

Muscus abietis facie. Baub. pin. 360. Baub. bist.
3. p. 765. Comm. bell. 77. Boerb. lugdb. 1. p.
22. n. 52.

*Mofch met de gedaante van den Dennen - boom. Belg.
Op 't Hooge veld by de Haarlemmer - hout.*

Conjuxi hic duos muscos, quos Boerhaavius separavit, quum Muscum abietis facie C. B. ad aliam speciem referre nesciam, atque ea, quæ in loco a Commelino assignato crescit, hæc certe planta est.

*cupressifor
me.*

913. HYPNUM furculis subbipinnatis, foliis secundis recurvis apice subulatis. *Sp.* 1592. n. 22.

Hypnum crispum cupressiforme, foliis aduncis.

Dill. musc. 287. t. 37. f. 23.

β. Muscus squamosus ramosus viridissimus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 7.

γ. Muscus capillaris humilis, confertissime nascens, capitulo cylindrico, operculo rostrato. *Boerb. lugdb.* 1. p. 22. n. 45.

In de Bofschben op de wortels der Boomen, en in de Duinen onder de Hippophae Rhamnoides, ontrent de plaats Backershagen.

Varietates α. & γ. Dillenius testatur sese ab ipso Boerhaavio habuisse.

aduncum.

914. HYPNUM furculis erectiusculo - subramosis, foliis secundis recurvis subulatis, ramis recurvatis. *Sp.* 1592. n. 23.

Hypnum palustre erectum summitatibus aduncis.

Dill. musc. 292. t. 37. f. 26.

In de Duinen by Noordwyk in eenige Bofchjes. (MEERBURGH.)

viticulosum

915. HYPNUM furculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis patulis acuminatis. *Sp.* 1592. n. 25.

Hypnum subhirsutum, viticulis gracilibus erectis, capsulis teretibus. *Dill. musc.* 307. t. 39. f. 43.

Muscus montanus, flagellis longis tenuibus cupressinis, ut plurimum indivisis. *Morif. hist.* 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 7. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 20.

Muscus densis foliolis juniperinis in cespitem aggestis. *Baub. lugdb.* 1. p. 20. n. 9.

In de Duinen by Haarlem.

varrosum

916. HYPNUM ramis vagis, foliis lanceolatis complicato - carinatis quinquefariam recurvatis. *Sp.* 1593. n. 26.

Hyp-

CRYPTOGAMIA MUSCI

297

- Hypnum repens*, triangularibus reflexis foliis, majus. *Dill. musc.* 303. t. 39. f. 38.
Muscus terrestris erectior, foliis reflexis. *Morif. bist.* 3. p. 624. f. 15. t. 5. f. 2. *Boerb. lugab.* t. p. 20. n. 12.
 β. *Hypnum repens*, triangularibus reflexis foliis, minus. *Dill. musc.* 304. t. 39. f. 39.
Muscus erectus, foliis reflexis. *Vaill. par.* 139. t. 27. f. 5.
Veel op vochtige gronden, en in de Duinen by 's Hage.
917. *HYPNUM* furculis repentibus, ramis confertis *palustre.* erectis, foliolis ovatis secundis, antheris erectiusculis *Sp.* 1593. n. 27.
Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum repens. *Dill. musc.* 293. t. 37. f. 27.
In eenige Hoven op de Steenen. (MEERBURGH.)
918. *HYPNUM* furculis reptantibus, ramis vagis *loreum.* erectis, foliis secundis, antheris subrotundis. *Sp.* 1593. n. 28. *Gelr.* 574. app. p. 254.
Hypnum loreum montanum, capsulis subrotundis. *Dill. musc.* 305. t. 39. f. 40.
Musco denticulato similis. *Baub. pin.* 360.
In de Salker-waart.
919. *HYPNUM* furculo erecto, ramis fasciculatis *dendroides.* terminalibus simpliciusculis, antheris erectis. *Sp.* 1593. n. 29. *Gelr.* 651.
Hypnum dendroides sericeum, setis & capsulis longioribus erectis. *Dill. musc.* 313. t. 40. f. 48.
Muscus terrestris repens, veluti spicatus. *Morif. bist.* 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 21. *Boerb. lugab.* t. p. 21. n. 24.
In 't Bosch van Uilenpas.
920. *HYPNUM* furculo erecto, ramis fasciculatis *alopecurum* terminalibus subdivisis, antheris subnutantibus. *Sp.* 1594. n. 30.
Hypnum dendroides obscurius, setis & capsulis brevioribus subnutantibus. *Dill. musc.* 315. t. 41. f. 49.
Muscus squamosus alopecuroides, flagellis recurvis. *Vaill. par.* 137. t. 23. f. 5.



In 't Haagſche-Bosch, en te Catwyk in de Duinen. (MEERBURGH.)

purum.

921. *HYPNUM* furculis pinnato-sparſis ſubulatis, foliis ovatis obtuſis conniventibus. *Sp.* 1594. n. 32. *Gelr.* 652. *Friſ.* 463.

Hypnum cupreſſiforme vulgare, foliis obtuſis. *Dill. muſc.* 309. t. 40. f. 45.

Muſcus ſquamofis cupreſſiformis. *Tourn. inſt.* 554. *Vaill. par.* 138. t. 28. f. 3. *Boerb. lugdb.* 1. p. 20. n. 2.

Veel in natte en ruige Wei-landen en Hoven.

ſluitans.

922. *HYPNUM* foliis lanceolatis alternis remofiſ. *Linn. ſuec.* 1034.

Hypnum erectum aut ſluitans, foliis oblongis peranguſtiſ acutiſ. *Dill. muſc.* 299. t. 38. f. 33.

Aan verſcheide Boekjes te Waſſenaar. (MEERBURGH.)

cuſpidatum

923. *HYPNUM* furculis vagiſ: apice foliis convolutiſ acuminato. *Sp.* 1595. n. 35.

Hypnum paluſtre extremitatiſ cuſpidatiſ & pungentiſ. *Dill. muſc.* 300. t. 39. f. 34.

In de Duinen by 's Hage tuſſchen bet lange gras. (MEERBURGH.)

ſericeum.

924. *HYPNUM* ſurculo repente, ramis confertiſ erectiſ, foliis ſubulatiſ, antheriſ erectiſ. *Sp.* 1595. n. 36. *Gelr.* 653. *Friſ.* 464.

Hypnum vulgare ſericeum recurvum, capſuliſ erectiſ cuſpidatiſ. *Dill. muſc.* 323. t. 42. f. 59.

Muſcus terreſtriſ & *hortenſiſ.* *Baub. biſt.* 3. p. 764.

Muſcus arboreuſ ſplendens ſericeuſ. *Vaill. par.* 132. t. 27. f. 3.

Op veele plaatſen onder aan de ſtammen der Boomen, op Steenen, in vochtige Wei-landen en Hoven.

velutinum.

925. *HYPNUM* ſurculo repente, ramis confertiſ erectiſ, foliis ſubulatiſ, antheriſ ſubnutantiſ. *Sp.* 1595. n. 37. *Friſ.* 465.

Hypnum velutinum, capſuliſ ovatiſ cernuiſ. *Dill. muſc.* 326. t. 42. f. 61.

Mus-

CRYPTOGAMIA MUSCL 299

Muscus terrestris vulgaris minor, adianthi aurei capitulis. Moris. bist. 3. p. 625. Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 3.

Oed. dan. t. 475.

- β *Muscus terrestris vulgaris, præcedenti minor, adianthi aurei capitulis. Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 4.*

Aan de wortels der Boomen op schaduwachtige plaatsen.

926. *HYPNUM furculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis. Sp. 1596. n. 38. Fris. 466. serpens.*

Hypnum trichodes serpens, setis & capsulis longis erectis. Dill. musc. 329. t. 42. f. 64.

Muscus terrestris omnium minimus, capitulis majusculis oblongis erectis. Moris. bist. 3. p. 625. f. 15. t. 5. f. 14. 21. Vaill. par. 138. t. 28. f. 2. 6. 7. 8.

Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis erectis. Tourn. inst. 553. Boerb. lugdb. 1. p. 20. n. 6.

In verscheide Hoven op de Steenen.

927. *HYPNUM furculis ramosissimis: ramis subulatis utrinque attenuatis teretibus. Sp. 1596. n. 40. Fris. 467. myosyroides*

Hypnum myosyroides tenuius, capsulis nutantibus. Dill. musc. 317. t. 41. f. 51.

Muscus trichodes humilis ramosus, capitulis oblongis tumidiusculis donatum. Moris. bist. 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 3.

Onder aan de stammen der Boomen, ook op en tuschen de Steenen.

A L G Æ.

J U N G E R M A N N I A.

928. *JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis: foliolis pinnatis ovatis subciliatis. Sp. 1597. n. 1. Gehr. 655. asplenioides*

Li-

Lichenastrum asplenii facie, pinnis laxioribus.

Dill. musc. 482. t. 69. f. 5.

Muscus trichomanis facie, foliis utrimque splendens rotundis. *Morif. bist.* 3. p. 627. f. 15. t. 6. f. 41.

Langs den Hierder-weg by Harderwyk.

complanata 929. *JUNGERMANNIA* furculis repentibus: foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Sp.* 1599. n. 14. *Fris.* 468.

Jungermannia foliis circinatis imbricatim dispositis ex viridi flavescentibus. *Mich. gen.* 7. t. 5. f. 21.

Lichenastrum imbricatum majus, squamis compressis & planis. *Dill. musc.* 496. t. 72. f. 26.

Aan de stammen van veelerhande Boomen.

Alata. 930. *JUNGERMANNIA* furculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Sp.* 1600. n. 15. *Fris.* 469.

Lichenastrum imbricatum minus, squamis convexo concavis. *Dill. musc.* 447. t. 72. f. 27.

Hepaticoides, furculis & foliolis thuyæ instar compressis, minor. *Vaill. par.* 99. t. 19. f. 10.

By de voërige, dog menigvuldiger.

tamarisci. 931. *JUNGERMANNIA* foliis imbricatis serie duplici: superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo majoribus. *Sp.* 1600. n. 16.

Lichenastrum imbricatum, tamarisci narbonensis facie. *Dill. musc.* 269. t. 72. f. 31.

Hepaticoides, quæ *Muscus trichomanoides* terrestri minor floridus. *Vaill. par.* 100. t. 23. f. 10.

Muscoides squamosum saxatile nigro-purpureum, furculis angustioribus, foliis circinatis minoribus. *Mich. gen.* 10. t. 6. f. 5.

Op verscheide plaatsen aan de Beuke-Boomen.

ciliaris. 932. *JUNGERMANNIA* furculis repentibus, foliolis duplicato-imbricatis: inferne auriculatis ciliatis. *Sp.* 1601. n. 18.

Lichenastrum filicinum pulchrum villosum. *Dill. musc.* 503. t. 73. f. 35.

In den Haarlemmer-hout. (MEERBURGH.)

933. JUN-

933. JUNGERMANNIA furculis erectiusculis bifari- *varia*.
 am imbricatis, foliis bipartitis. *Sp.* 1601. n.
 19. *Fris.* 470.
 Jungermannia repens, foliis cordatis carinatis.
Micb. gen. 8. t. 5. f. 9.
 Lichenastrum foliis variis. *Dill. musc.* 505. t. 73.
 f. 36.
In de Roffchen en op de Heide; ook in sommige Ho-
ven onder 't geboomte.

934. JUNGERMANNIA acaulis, foliolo frondi inna- *epiphylla*.
 to. *Sp.* 1602. n. 24. *Gelr.* 658.
 Lichenastrum capitulis rotundis e foliorum medio
 enascentibus. *Dill. musc.* 508. t. 74. f. 41.
 Lichen petræus, cauliculo calceato. *Baub. pin.*
 362. *Comm. boll.* 66.
Oed. dan. t. 359.
Op vochtige steenachtige plaatsen.

935. JUNGERMANNIA acaulis, fronde lineari ramo- *furcata*.
 fa: extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Sp.*
 1602. n. 27.
 Lichenastrum tenuifolium furcatum, thecis glo-
 bosis pilosis. *Dill. musc.* 512. t. 74. f. 45.
 Heparica arborea globulifera. *Vail. par.* 98. t.
 23. f. 11.
In 't Haagfche - Bosch in eenige groepen. (MEER-
BURGH.)

T A R G I O N I A.

936. TARGIONIA. *Sp.* 1603. n. 1.
 Targionia minima & vulgaris. *Micb. gen.* 3. t. 3. *hypophylla*.
 Lichen petræus minimus, fructu orobi. *Baub.*
pin. 362. *Comm. boll.* 68. *Dill. musc.* 532. t. 78. f. 9.
Op vochtige steenachtige plaatsen. (COMMELIN)
Habitat proprie in Italia, Hispania, & circa Con-
stantinopolin, sed in Belgio nascens mihi nondum
visa. Suspicio COMMELINUM Jungermannia
speciem pro ea habuisse, cum iisdem cum Junger-
mannia epiphylla 934. locis crescere dicat.

M A R C H A N T I A.

937. MARCHANTIA calyce communi decemfido. *polymorpha*
Sp.

Sp. 1603. *n.* 1. *Gelr.* 579. *Fris.* 471.

α. *Marchantia major*, capitulo stellato: radiis tere-
tibus. *Michb. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 1.

Lichen fontanus major stellatus æque ac umbella-
tus & cyathophorus. *Dill. musc.* 523. *t.* 76. *f.* 6.

Lichen petræus latifolius siye Hepatica fontana.
Paub. pin. 362. *Comm. boll.* 66.

Lichen petræus. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerb. lugdb.*
1. *p.* 17. *n.* 11.

Steen-Lever-kruid. Belg.

β. *Marchantia stellata.* *March. act.* 1713. *p.* 307. *t.* 5.

Marchantia capitulo stellato: radius teretibus.
Michb. gen. 2. *t.* 1. *f.* 2.

Lichen domesticus minor stellatus æque ac umbel-
latus & cyathophorus. *Dill. musc.* 527. *t.* 77. *f.* 7.

Lichen petræus stellatus. *Baub. pin.* 362. *Comm.*
boll. 66.

Lichen secundus. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerb. lugdb.*
1. *p.* 17. *n.* 12.

γ. *Marchantia calyce communi octopartito: laciniis*
e plano convexis. *Linn. lapp.* 423. *Gelr.* 580.

Marchantia capitulo non dissecto. *Michb. gen.* 1.
t. 1. *f.* 5.

Lichen petræus umbellatus. *Paub. pin.* 362. *Comm.*
boll. 66.

Lichen tertius. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerb. lugdb.*
1. *p.* 17. *n.* 13.

In de Hoven en elders, op schaduwwachtige plaatsen.
Pharm. α. HEPATICÆ FONTANÆ. herb.

cruciata. 938. *MARCHANTIA calyce communi quadripartito:*
laciniis tubulosis. *Sp.* 1604. *n.* 3.

Lichen semifer lunulatus, florifer pileatus,
tandem cruciatus. *Dill. musc.* 521. *t.* 75. *f.* 5.

Lichen seu Hepatica lunulata, epiphyllocarpos.
Raj syn. 41. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 16.

† *Volgens BOERHAAVE.*

umbella. 939. *MARCHANTIA calyce communi hæmisphæ-*
rico apiculato: margine lamellis radiato. *Sp.*
1604. *n.* 4.

Lichen pileatus parvus carinatus, capitulis fim-
briatis. *Dill. musc.* 521. *t.* 75. *f.* 4.

In de Duinen by Wassenaar, in de Elze-boschjes.
(MEERBURGH.)

Rarissima Belgii plantula.

940. MAR-

940. *MARCHANTIA* calyce communi quinqueloculari *conica*.
 subovato. *Sp.* 1604. n. 6.
Lichen vulgaris major pileatus & verrucosus. Dill.
musc. 516. t. 75. f. 1.
Lichen petræus, cauliculo pileolum sustinente.
Baub. pin. 362. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 15.
Oed. dan. t. 274.
 β. *Lichen verrucosus Dood. Raj. syn.* 41. *Boerb.*
lugdb. 1. p. 17. n. 17.
 † *Volgens BOERHAAVE.*

R I C C I A.

941. *RICCIA* frondibus dichotomis lineari-filiformi-*fluitans*.
 bus. *Sp.* 1606. n. 4. *Fris.* 472.
Lichenastrum aquaticum fluitans tenuifolium fur-
catum. Dill. musc. 213. t. 74. f. 42.
Hepatica palustris dichotoma, segmentis angu-
stioribus. Vaill. par. 98. t. 10. f. 3.
Oed. dan. t. 275.
In Friesland in den eersten opvaart ten Oosten bet
Verlaat by de Bonte bok, en in de Vaart by de
Schans naar 't Heeren-veen; en elders.
DILLENII icon melius plantam exprimit quam
VAILLANTII.
MEESE nunquam fructificationes in ea detex-it.
Aquis fasciculatim innatat, aut Lemna aliisve plan-
tis aquaticis se adfigit; a fine Junii ad finem
Julii præsertim obvia.

A N T H O C E R O S.

942. *ANTHOCEROS* frondibus indivisis sinuatis lævi-*lente*.
 bus. *Sp.* 1606. n. 2.
Anthoceros foliis majoribus minus laciniatis. Dill.
musc. 476 t. 68. f. 2.
Lichen capillaceus, ex plurimis capillamentis
nigricantibus constans. Merr. pin. 72. *Comm.*
boll. 66.
Op vochtige plaatsen, en op verrot hout. (COMM.)
Juxta urbem Harlemensem in fossarum aggeribus.
(Linn. b. Cliff. 477.)

L I C H E N.

- scriptus.* 943. LICHEN leprofus albicans, lineolis nigris ramosis characteriformibus. *Sp.* 1606. n. 1. *Gelr.* 659. *Fris.* 473.
Lichenoides crusta tenuissima, peregrinis velut litteris inscripta. *Dill. musc.* 125. t. 18. f. 1.
Op de bast van jonge Eike en andere Boomen.
- geographicus.* 944. LICHEN leprofus flavescens, lineolis nigris mappam referens. *Sp.* 1607. n. 2. *Fris.* 474.
Lichenoides nigro-flavum tabulæ geographicæ intar pictum. *Dill. musc.* 126. t. 18. f. 5.
Oed. dan. t. 468. f. 1.
Zeer fraay op Boomen, wier bast nog ongeborsten en glad is.
- rugosus.* 945. LICHEN leprofus albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris confertis. *Sp.* 1607. n. 3. *Fris.* 475.
Lichenoides punctatum & rugosum nigrum. *Dill. musc.* 125. t. 18. f. 2.
In de Boffchen aan de stammen van Beuke- en Eike-Boomen.
- sanguinari-
us.* 946. LICHEN leprofus cinereo-virefcens, tuberculis atris. *Sp.* 1607. n. 4. *Gelr.* 660.
Lichenoides leprofum, crusta cinereo-virescente, tuberculis nigerrimis. *Dill. musc.* 126. t. 18. f. 3.
Aan de stammen der Boomen op veele plaatsen.
- fusco-
niger.* 947. LICHEN leprofus fuscus, tuberculis atris. *Sp.* 1607. n. 5. *Fris.* 476.
Buiten Franeker op stammen van doode Effchen-boomen.
- sagineus.* 948. LICHEN leprofus albus, tuberculis albis farinaceis. *Sp.* 1608. n. 10. *Fris.* 478.
Op veele plaatsen op de bast van Beuke-boomen.
- ericetorum.* 949. LICHEN leprofus candidus, tuberculis incarnatis. *Sp.* 1608. n. 12. *Gelr.* 598. *Fris.* 479.
Coralloides fungiforme carneum, basi leprosa. *Dill. musc.* 76. t. 14. f. 1.

Fun-

Fungilli incarnati coloris minuti musco infidentes.

Mentz. pug. t. 6. Comm. boll. 40.

Oed. dan. t. 472.

Op de Heide by Lovenich op de Veluwe; op de Rhenense-berg; in de Haarlemmer-hout, en in verscheide Boschen in Friesland, en elders.

950. LICHEN crustaceus flavus, scutellis luteis. *Sp. candelarium* 1608. n. 13. *Frisf. 480.*

Lichenoides crustosum orbiculis & scutellis flavis.

Dill. musc. 136. t. 18. f. 18.

Aan de stammen van veelerbande oude Boomen, en aan oude Muuren.

951. LICHEN crustaceus albicans, scutellis pallidis. *pallidusens.* *Sp. 1608. n. 15.*

Lichenoides crustosum orbiculare incanum. *Dill. musc. 130. t. 18. f. 17.*

Op den bast der Boomen op veele plaatsen.

Ipsos etiam Muscos arboribus adnascens investit.

952. LICHEN crustaceus albicans, scutellis nigris: *subfuscus.* junioribus urceolatis cavis. *Sp. 1609. n. 16.* *Gelr. 661. Frisf. 481.*

Lichenoides crustaceum & leprosum, scutellis subfuscis. *Dill. musc. 134. t. 18. f. 16.*

Gelyk de voorgaande.

953. LICHEN imbricatus, foliolis sinuatis scabris la-*saxatilis.* cunosis, scutellis badiis. *Sp. 1609. n. 19.*

Lichenoides vulgatissimum cinereo glaucum lacunosum & cirrhosum *Dill. musc. 188. t. 24. f. 83.*

Muscus cranio humano innatus. *Baub. bist. 3. p. 764. Comm. boll. 78.*

Op Doods-boofden van Menschen, die in een vochtigen keider zyn gelegd.

Pharm. USNEA cranii humani.

Non solum hic Lichen, sed & varia Hypna cranii innascuntur. Vid. Dill. musc. 190.

954. LICHEN imbricatus, foliolis lobatis nitidis li-*olivaceus.* vidis. *Sp. 1610. n. 21. Frisf. 482.*

Lichen crustæ modo arboribus adnascens, olivaceus. *Vaill. par. t. 20. f. 8.*

Lichenoides olivaceum, scutellis amplioribus.

verrucosis. *Dill. musc.* 184. t. 24. f. 78.

Op veele plaatsjen, aan de basten der Boomen, aan Muuren, en andere steenen.

parietinus. 955. *LICHEN* imbricatus, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Sp.* 1610. n. 25. *Fris.* 483. *Lichen* dioscoridis & plinii secundus. *Col. ecphr.*

1. 331. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 1. 2. 3.

Lichenoides vulgare sinuosum, foliis & scutellis luteis. *Dill. musc.* 180. t. 24. f. 76.

Muscus crustæ modo arboribus adnascens. *Baub. pin.* 361. *Comm. boll.* 77.

Zeer gemeen aan oude Fruit- en anderen Boomen, ook aan Muuren, planken, paalen, en anderen lichbaamen.

Variat colore cinereo, viridante & flavescente.

phyodes. 956. *LICHEN* imbricatus: laciniis obtusis subinflatis. *Sp.* 1610. n. 26. *Gelr.* 662. *Fris.* 484.

Lichenoides ceratophyllum obtusius & minus ramosum. *Dill. musc.* 154. t. 20. f. 49.

Aan de stammen der Berke-boomen.

stellaris. 957. *LICHEN* imbricatus: foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. *Sp.* 1611. n. 27. *Gelr.* 663. *Fris.* 485.

Lichen crustæ modo arboribus adnascens, tenuiter divisus. *Tourn. inst.* 548. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 5.

Lichenoides cinereum, segmentis argutis stellatis, scutellis nigris. *Dill. musc.* 176. t. 24. f. 70.

Aan de basten der Boomen op veele plaatsjen

ciliaris. 958. *LICHEN* foliaceus erectiusculus: laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Sp.* 1611. n. 28.

Lichen latifolius ramosus minor hirsutus. *Tourn. inst.* 550. t. 325. f. C. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 25.

Lichenoides hispidum majus & rigidius, scutellis nigris. *Dill. musc.* 150. t. 20. f. 45.

Musco - fungus arboreus cinereus scutellatus, marginibus pilosis. *Morif. bist.* 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 6. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 21.

β. *Lichen* cinereus arboreus, marginibus fimbriatis. *Tourn.*

Tourn. inst. 550. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 29.
Aan veele Boomen.

959. *LICHEN foliaceus adscendens laciniatus: mar- iflandicus.*
ginibus elevatis ciliatis. Sp. 1611. n. 29.

β. *Lichenoides eryngii folia referens, tenuioribus*
& crispioribus foliis. Dill. musc. 212. t. 28 f. 112.

Oed. dan. t. 155.

Op den weg van Leiden naar Voorfchooten aan
een oude Schutting. (MEERBURGH.)

960. *LICHEN foliaceus adscendens laciniatus crispus nivalis.*
glaber lacunofus albus margine elevato. Sp.
 1612. n. 30.

Lichenoides lacunofum candidum glabrum, en-
diviæ crispæ facie Dill. musc. 162. t. 21. f. 56.

Oed. dan. t. 227.

In de Duinen by Hillegom. (MEERBURGH.)

961. *LICHEN foliaceus liciniatus obtusus glaber: pulmonari-*
supra lacunofus; subtus tomentosus. Sp. 1612. us.
 n. 31. *Gelr.* 581. *Frif.* 487.

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare,
marginibus peltiferis. Dill. musc. 212. t. 29. f.

113.

Muscus pulmonarius. Baub. pin. 361. *Comm. boll.*
 78.

Longe - kruid. Belg.

Aan de stammen en takken van oude Boomen, en aan
vochtige wallen en dykjes op veele plaatfen.

Pharm. MUSCUS PULMONARIUS.

962. *LICHEN foliaceus decumbens furfuraceus: la- surfuraceus*
cinii acutis; subtus lacunofus atris. Sp. 1612.
 n. 32.

Lichenoides cornutum amarum: desuper cinere-
um; inferne nigrum. Dill. musc. 157. t. 21. f. 52.

Muscus amarus, absinthii folio. Baub. bist. 3. p.
 764. *Comm. boll.* 78.

Aan oude planken van schuttingen aan de Duinkant.

963. *LICHEN foliaceus erectus compressus ramosus: farinaceus.*
verrucis marginalibus farinosis. Sp. 1613. n. 35.

Gelr. 664. *Frif.* 488.

Lichenoides segmentis argutioribus ad margines

V 2

ver-

verrucosis & pulverulentis. *Dill. musc.* 172. t. 23. f. 63.

Aan oude Beuke- en Eike-boomen, als mede aan schuttingen, bekken, en paalen.

calicaris. 964. **LICHEN** foliaceus erectus linearis ramosus lacunofus convexus mucronatus. *Sp.* 1613. n. 36. *Fris.* 489.

Lichen cinereus latifolius ramosus. Tourn. inst. 550. *Vaill. par.* 115. t. 20. f. 6. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 28.

Lichenoides coralliforme rostratum & canaliculatum. Dill. musc. 170. t. 23. f. 62.

Musculus arboreus ramosus coralloides. Baub. pin. 361. *Comm. boll.* 77.

Aan de Takken van Appel- en anderen Boomen.

fraxineus. 965. **LICHEN** foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunofus glaber; scutellis subpendunculatis. *Sp.* 1614. n. 37. *Gelr.* 665. *Fris.* 490.

Lichen pulmonarius cinereus mollior, in amplis lacinias divisus. Tourn. inst. 549. t. 325. f. A. B. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 27.

Lichenoides longifolium rugosum rigidum. Dill. musc. 165. t. 22. f. 59.

β. *Musco-fungus arboreus angustior scutellatus & peltatus. Moris. hist.* 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 3. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 26.

Aan de stammen van Eike- en Beuke-boomen.

prunastri. 966. **LICHEN** foliaceus erectiusculus lacunofus: subtus tomentosus albus. *Sp.* 1614. n. 39.

Lichen cinereus cornua damæ referens. Tourn. inst. 549. *Boerb. lugdb.* 1. p. 17. n. 24.

Lichen arboreus, variis magnitudine, ramis, foliis, colore, ex variis arboribus lectus hyeme sævissima. Boerb. lugdb. 1. p. 17. n. 23.

Lichenoides cornutum bronchiale molle subtus incanum. Dill. musc. 160. t. 21. f. 55.

Aan de Wilge, Effche en anderen Boomen, dog voornamelyk aan den Slee-Doorn. 421.

caperatus. 967. **LICHEN** pallide viridis rugosus margine undulatus. *Sp.* 1614. n. 41. *Gelr.* 584. *Fris.* 491.

Lichenoides caperatum rosaceæ expansum. Dill. musc. 193. t. 25. f. 97. a. Li-

- α. Lichen crustæ modo asseribus adnascens latior mollior, vix vasculosus cinereus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 6.
- β. Lichen crustæ modo asseribus adnascens, latior mollior, vix vasculosus roseus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 7.
- γ. Lichen crustæ modo asseribus adnascens, latior mollior, vix vasculosus, eleganter variegatus ex roseo, albo, nigrescente. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 8.

Aan oude boomen, planken, kei-steenen, ook aan de dykjes langs den Hierder-weg by Harderwyk.

968. LICHEN foliaceus depresso lobatus glaber: *glaucus*.
 margine crispo farinaceo. *Sp.* 1615. n. 42.
 Lichenoides endiviæ foliis crispis splendentibus
 subtus nigricantibus. *Dill. musc.* 192. t. 25. f. 96.
 Musco-fungus lichenoides arborum crispus cine-
 reus subtus nigricans. *Morif. bist.* 3. p. 633. f.
 15. t. 7. f. 4.
Oed. dan. t. 598.
Op de Duinen te Catwyk. (MEERBURGH.)

969. LICHEN coriaceus repens lobatus obtusus pla-
 nus: subtus venosus villosus, pelta marginali
 adscendente. *Sp.* 1616. n. 48. *Gelr.* 582. *Fris.*
 493.

Lichen maritimus. C. B. *Comm. boll.* 65. *Boerb.*
lugdb. 1. p. 16. n. 10.

Lichen pulmonarius saxatilis digitatus. *Vaill. par.*
 116. t. 21. f. 16.

Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis,
 sinuosis. *Dill. musc.* 200. t. 27. f. 102.

Musco-fungus terrestris latifolius cinereus: he-
 paticæ facie. *Morif. bist.* 3. p. 632. f. t. 7. f. 1.

Honds-Masch. Belg.

*Op dorre zandige plaatsen aan de Bronsbergen
 buiten Zutphen; in de Duinen, vaer te Cat-
 wyk; op 't booge veld in den Haarlemmer-hout;
 by Kranenborgs-erf in Tonsel buiten Harder-
 wyk; in Friesland, in de Wouden op verschei-
 de plaatsen, onder de Haide-struiken; als ook aan
 dykjes en wallen in de schaduwe.*

Pharm. MUSCUS CANINUS f. LICHEN CINE-
 REUS TERRESTRIS.

Hujus plures ratione fimbriarum varietates in maritimis oris detexit Magnus BOERHAAVIUS.

pustulatus. 970. **LICHEN** umbilicatus: subtus lacunofus furfure nigro adpersus. *Sp.* 1617. *n.* 53.

Lichen cruitæ modo faxis adnascens verrucosus cinereus & exultus. *Tourn. inst.* 549. *Vaill. par.* 116. *t.* 20. *f.* 9. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 9.

Lichenoides pustulatum cinereum & veluti ambustum. *Dill. musc.* 227. *t.* 30. *f.* 131.

Oed. dan. t. 597. *f.* 2.

Op groote Kei-steenen, die lang in de open lucht hebben gelegen.

cocciferus. 971. **LICHEN** scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Sp.* 1618. *n.* 58. *Gelr.* 666. *Fris.* 494.

Lichen pyxidatus prolifer, acetabulorum fimbriis tumulentibus coccineis. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 36.

Coralloides scyphiforme tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 82. *t.* 14. *f.* 7.

Veel op dorre Hei-gronden, en in 't Haagsche-Bosch.

Pharm. MUSCUS PYXIDATUS.

cornucopioides. 972. **LICHEN** scyphifer simplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Sp.* 1619. *n.* 59.

Coralloides scyphiforme: marginibus radiatis & foliatis. *Dill. musc.* 85. *t.* 14. *f.* 9.

In de Duinen by bet Huis ten Deyl. (MEERBURGH.)

pyxidatus. 973. **LICHEN** scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Sp.* 1619. *n.* 60. *Fris.* 495. *Gelr.* 587.

Lichen pyxidatus major. *Tourn. inst.* 549. *t.* 325. *f.* *D. Vaill. par.* 115. *t.* 21. *f.* 8. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 30.

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. *Dill. musc.* 79. *t.* 14. *f.* 6.

Musculus pyxoides terrestris. *Baub. pin.* 361. *Comm. Holl.* 78.

β. Lichen pyxidatus prolifer. *Tourn. inst.* 549. *Vaill. par.* 115. *t.* 21. *f.* 5. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 37.

γ. Lichen pyxidatus, acetabulorum oris fuscis & tumen-

- mentibus. *Tourn. inst.* 549. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 37.
8. Lichen pyxidatus, acetabulorum oris nigerimis & tumentibus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 38.
By de voorgaande.
974. LICHEN scyphifer simplex denticulatus, stipi- ~~fimbriatus~~.
te cylindrico. *Sp.* 1619. n. 61. *Fris.* 496.
Lichen pyxidatus minor. *Tourn. inst.* 549. *Vaill.*
par. 115. t. 21. f. 6. *Mich. gen.* 83. t. 41. f.
45. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 31.
Coralloides scyphiforme gracile, marginibus ser-
ratis. *Dill. musc.* 84. t. 14. f. 8.
In de Boffchen op dorre groonden.
975. LICHEN scyphifer ramosus denticulatus filifor- *gracilis*.
mis. *Sp.* 1619. n. 62. *Fris.* 497.
Coralloides scyphiforme ferratum elatius, cauli-
bus gracilibus glabris. *Dill. musc.* 88. t. 14. f. 13.
Musco-fungus pyxidatus gracilior ramosus, ca-
lycibus serratis. *Morif. bist.* 3. p. 362. f. 15. t.
7. f. 6.
By de voorgaande.
976. LICHEN scyphifer ramosissimus: ramis cylindri- *digitatus*.
cis, calycibus integris nodosis. *Sp.* 1620. n. 63.
Fris. 498.
Coralloides ramulosum, tuberculis coccineis. *Dill.*
musc. 96. t. 15. f. 19.
Als vooren.
977. LICHEN scyphifer simpliciusculus subventrico- *cornutus*.
sus, calycibus integris. *Sp.* 1620. n. 64. *Fris.*
499.
Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. *Dill.*
musc. 90. t. 15. f. 14.
Als vooren.
978. LICHEN pyxidatus non ramosus, acetabulis
fimbriatis. *Tourn. inst.* 549. *Boerb. lugdb.* 1. p.
18. n. 34.
Lichen cornubus simplicissimis acutis farinosis.
Hall. bist. 1902.
Coralloides scyphiforme cornutum. *Dill. musc.* 92.
t. 15. f. 16.

β. Lichen pyxidatus, corniculis aduncis. *Tourn. inst.* 549.

Lichen pyxidatus minimus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 33.

Op de Heide, in de Boffchen.

deformis. 979. LICHEN scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus dentatis. *Sp.* 1620. n. 65.

Lichen pyxidatus teres, acetabulis minoribus repandis. *Tourn. inst.* 549. *Mich gen.* 80. t. 41. f. 1. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 33.

Op de Heide.

gangiferi- 980. LICHEN fruticulosus perforatus ramosissimus, *aus.* ramulis nutantibus. *Sp.* 1620. n. 66. *Gelr.* 588. *Fris.* 500.

Coralloides montanum fruticuli specie ubique candicans. *Dill. msc.* 107. t. 16. f. 29.

Coralloides corniculis candidissimis. *Tourn. inst.* 595. *Boerb. lugdb.* 1. p. 19. n. 5.

Musculus corallinus, sive Corallina montana. *Tabern. ic.* 810.

Musculus coralloides, sive cornutus montanus. *Baub. pin.* 391. *Comm. boll.* 78.

Oed. dan. t. 180.

Geboornde Berg - Mosch. Belg.

β. Coralloides candida ramosissima exigua. *Boerb. lugdb.* 1. p. 19. n. 6.

γ. Coralloides candida ramosissima mollis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 19. n. 7.

δ. Coralloides candida ramosissima mollis capillaris. *Boerb. lugdb.* 1. p. 19. n. 8.

ε. Coralloides candida ramosissima mollissima, filis pilo tenuioribus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 19. n. 9.

Op de Duinen te Catwyk, en 't booge veld aan den Haarlemmer - hout; ook op dorre Hei - gronden.

Rangiferi in Lapponia, qui hoc Lichene per integram hyemem vitam sustentant, eum effodiunt, etiamsi ad altitudinem duarum orgyarum nive tecta sit tellus, uti Ill. LINNÆUS, cum in Belgio degebat, mihi retulit.

uncialis. 981. LICHEN fruticulosus perforatus, ramulis brevissimis acutis. *Sp.* 1621. n. 67 *Fris.* 501.

Coralloides perforatum minus molle & tenue. *Dill.*

- Dill. musc.* 99. t. 19 f. 22.
 β. Coralloides perforatum majus molle & crassum.
Dill. musc. 98. t. 16. f. 21. B.
Op booge Hei-velden.
982. LICHEN fruticulosus subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. *Sp.* 1621. n. 68. *Fris.* 502.
 Coralloides corniculis longioribus & rarioribus.
Dill. musc. 102. t. 16. f. 26.
 Coralloides cornua cervi referens, corniculis longioribus. *Tourn. inst.* 565. *Boerb. lugdb.* 1. p. 16. n. 2.
 Muscus corniculatus. *Tabern. ic.* 809. *Baub. bist.* 3. p. 767.
 β. Coralloides sparsum, caulibus tortuosis & spinosis.
Dill. musc. 101. t. 16. f. 24.
 Coralloides cornua cervi referens, corniculis brevioribus. *Tourn. inst.* 565. *Boerb. lugdb.* 1. p. 18. n. 1.
 Muscus coralloides saxatilis cervi cornua referens.
Baub. pin. 361. *Comm. boll.* 78.
Op den Tryffelberg by Hattem. β. Op voochtige steenachtige plaatsen, en op Hei-velden.
 β. *Pro distincta specie habetur a DILLELIO.*
983. LICHEN fruticulosus ramosus articulatus, articulis longis cylindricis, peltis pedunculatis. *Meess.*
Fris. 503. t. 1.
 Corallina (*terrestris*) opposita ramosa, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis transversim oblongis. *Pallas Zoophyt.* 427.
Op de Bergummer-Heide in Friesland.
 Cl. I. ELLIS (*act. angl. vol. LVII. ad ann. 1767. p. 420.*) ad *Zoophyta hunc Lichenem refert, statuens non esse plantam, sed ē mari, quod Belgii olim obtegit, adventitium esse, atque, quod Cl. PALLAS. ut fructificationes describit, ramos esse imperfectos. Ill. LINNÆUS (syst. nat. edit. 12. tom. 1. p. 1306.) quoque ad Vermes Zoophyta refert nomine Corallinae terrestris.*
- 984 LICHEN filamentosus pendulus, ramis implexis, *phicatus.*
scutellis radiatis. Sp. 1662. n. 72. *Gelr.* 583.
Usnea vulgaris, loris longis implexis. Dill. musc.
 56. t. 11. f. 1.

Muscus arboreus, usnea officinarum. *Baub. pin.* 361. *Comm. boll.* 77.

Room - Moscb. Belg.

Aan velerbande soorten van Boomen.

Pharm. MUSCUS ARBOREUS.

hirtus. 985. LICHEN filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Sp.* 1623. n. 78. *Gelr.* 667.

Usnea vulgarissima tenuior & brevior sine orbiculis. *Dill. musc.* 67. t. 13. f. 12.

Muscus ramosus. *Tabern. ic.* 807.

Veel aan verscheide Boomen.

articulatus 986. LICHEN filamentosus articulatus, ramulis tenuissimis punctatis. *Sp.* 1623. n. 80.

Usnea capillacea & nodosa. *Dill. musc.* 60. t. 11. f. 4.

Muscus arboreus nodosus. *Baub. pin.* 361.

Musco - fungus arborum nodosus s. geniculatus.

Morif. bist. 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 11.

In de Duinen te Waffenaar. (MEERBURGH.)

floridus. 987. LICHEN filamentosus ramosus erectus, scutellis radiatis. *Sp.* 1624. n. 81. *Gelr.* 585.

Usnea vulgarissima tenuior & brevior cum orbiculis. *Dill. musc.* 69. t. 13. f. 13.

Muscus arboreus cum orbiculis. *Baub. pin.* 361. *Comm. boll.* 77.

Muscus ramosus floridus. *Tabern. ic.* 808.

Veel aan Beuke - boomen.

T R E M E L L A.

Nostoc. 988. TREMELLA plicata undulata. *Sp.* 1625. n. 2. *Gelr.* 668. *Gmel. fuc.* 222.

Tremella terrestris sinuosa pinguis & fugax. *Dill. musc.* 52. t. 10. f. 14.

Nostoe paracelsi. act. paris. 1708. p. 228.

In de Hoven en Wei - landen in de Na - zomer na langdurigen regen.

verrucosa. 989. TREMELLA tuberculosa solida rugosa. *Sp.* 1625. n. 5. *Gelr.* 670. *Gmel. fuc.* 227.

Tremella fluviatilis gelatinosa & uterculosa. *Dill. musc.*

musc. 54. t. 10. f. 16.

*In de beeken op de Steenen by Effenburg, Vaassen,
Reukum, en elders op de Veluwe.*

990. *TREMELLA subglobosa sessilis solitaria glabra. purpurea.*

Sp. 1626. n. 7. *Fris.* 508.

Lichenoides tuberculolum, amœne purpureum.

Dill. musc. 127. t. 18. f. 6.

*Aan kwynende en doode takken van Abricose, Aal-
bezie, en andere soorten van Boomen in 't Voor-
en Na-jaar.*

Colore suo pulchre rubro facile dignoscitur.

F U C U S.

991. *FUCUS caule filiformi ramoso, foliis lanceolatis natans.*

*ferratis, fructificationibus globosis peduncula-
tis. Sp.* 1628. n. 13. *Gmel. fuc.* 92.

Fucus folliculaceus, ferrato folio. Baub. pin. 365.

Lenticula marina, ferratis foliis. Dalech. bist. 1397.

Zee-Kroos. Belg.

Op 't Strand tusschen Scheveningen en Catwyk.

(MEERBURGH.)

992. *FUCUS fronde plana dichotoma costata ferrato-ferratus.*

*dentata, fructificationibus terminalibus tuber-
culosis. Sp.* 1626. n. 1. *Baster. opusc.* 6. p. 120.

n. 3. f. 3. *Gmel. fuc.* 57.

Fucus f. Alga latifolia major dentata. Moris. bist.

3. p. 648. f. 15. t. 9. f. 1. *bona.*

Te Catwyk aan 't Strand. (MEERBURGH.)

993. *FUCUS fronde plana dichotoma costata integer-vesiculosus.*

*rima: vesiculis axillaribus geminis: terminali-
bus tuberculatis. Sp.* 1626. n. 2. *Fris.* 509.

Gmel. fuc. 60.

*Fucus maritimus vel Quercus maritima vesiculas
habens. Baub. pin.* 365. *Comm. boll.* 39.

Quercus marina. Lob. ic. 2. p. 255. *Clus. bist.* 1.

p. 21.

Zee-Eike. Belg.

Overvloedig in de Zuider-Zee omtrent 't Eyland

Wieringen, en aan 't Zee-strand van Friesland.

Potenter resolvit tumores duros. Vid. Gmel. fuc.

p. 67.

994. *FU-*

divaricatus 994. *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima, axillis divaricatis: vesiculis axillaribus geminis. *Sp.* 1627. n. 8. *Fris.* 511.

Fucus bullatus fruticescens, caule nudo, foliis rectis compressis bifidis. *Morif. bist.* 3. p. 647. f. 15. t. 8. f. 5.

In Friesland tusschen Harlingen en Dykshoek op verscheide plaatsen aan 't Strand.

Cl. GMELINUS (*Fuc.* p. 62.) pro varietate *Fuci* vesiculosi habet.

ceranoides 995. *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, fructificationibus tuberculatis bifidis terminalibus. *Sp.* 1626. n. 3. *Fris.* 510. *Gmel. fuc.* 115.

Fucus humilis dichotomus *ceranoides*, latoribus foliis ut plurimum verrucosis. *Morif. bist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 12.

By de voorige; ook by Wieringen.

Morisoni icon non satis bona. *Vid. Meese Fris.* 510.

canaliculatus 996 *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima canaliculata lineari, fructificationibus tuberculatis bipartitis obtusis. *Syst. edit.* 13. p. 812. *Gmel. fuc.* 73. t. 1. A. f. 2.

Oed. dan. t. 244.

β. *Fucus excisus.* *Sp.* 1627. n. 10.

Fucus dichotomus membranaceus ex viridi flavescens *ceranoides* angulos rotundiusculos efformans. *Morif. bist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 11.

Te Catwyk dan 't Strand. (MEERBURGH.)

nodosus 997. *Fucus* fronde compressa dichotoma, foliis distichis integerrimis, vesiculis innatis solitariis dilatatis. *Sp.* 1628. n. 11. *Fris.* 512. *Baster. opusc.* 6. p. 121. t. 11. f. 5. *Gmel. fuc.* 78. t. 1. B. f. 1.

Fucus maritimus *nodosus.* *Eaub. pin.* 365. *Comm. boll.* 39.

Fucus marinus tertius. *Dod. pempt.* 480.

Oed. dan. t. 146.

Knobbelachtig Wierd, Pater noster Wierd. Belg.

Omtrent bet Eyland Wieringen, en in Friesland aan 't Stand.

998. *FU-*

998. *Fucus* fronde compressa ramosa, foliis distichis alternis integerrimis, fructificationibus pedunculatis oblongis mucronatis. *Sp.* 1529. n. 17. *Fris.* 513. *Gmel. fuc.* 81. t. 2. B.
Fucus marinus quartus. Dod. pempt. 480.
Fucus maritimus alter, tuberculis paucissimis. Baub. pin. 368. *Comm. boll.* 39.
Oed. dan. t. 106.
By de voorige, en ook te Harderwyk aan 't Zee-Strand.
Sæpe buic innascitur Sertularia pluma.
999. *Fucus* fronde filiformi ramosissima, vesiculis ovatis terminatis foliolis multipartitis obtusis apice fructificantibus. *Sp.* 1629. n. 20. *Gmel. fuc.* 86. t. 2. A. f. 3.
Fucus radicibus arborum fibrosis similis. Raj. syn. 49. n. 45. *Mees. fris.* 514.
Fucus folliculaceus, foliis foeniculi brevioribus. Baub. pin. 365.
In Friesland aan de Zee.
Coloris est rufi, substantiæ corneæ.
1000. *Fucus* fronde filiformi subfragili opaca. *Sp.* *Filum.* 1631. n. 31. *Gmel. fuc.* 131.
Fucus sive Filum maritimum germanicum. Bocc. mus. 1. p. 271. t. 9. f. 9.
Filum maritimum germanicum. Baub. prodr. 155.
Alga nigro capillaceo folio. Baub. pin. 364.
Comm. boll. 5.
By 't Eyland Wieringen.
1001. *Fucus* fronde palmata plana. *Sp.* 1630. n. 26. *palmatus.*
Fucus membranaceus ceranoides. Baub. prodr. 155.
Fucus foliaceus humilis palmam humanam referens. Moris. bist. 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 1.
Alga membranacea ceranoides. Baub. pin. 364.
Comm. boll. 5.
Aan de Stranden van de Noord-Zee, omirent Zandvoort.
Cl. GMELINUS synonyma Baubini ad Suum Fucum dulcem refert (fuc. 189. 202.)
1002. *Fucus* fronde filiformi ramosissima hirta. *Sp.* *ericoides.* 1631. n. 33. *Fu-*

divaricatus 994. *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima, axillis divaricatis: vesiculis axillaribus geminis. *Sp.* 1627. n. 8. *Fris.* 511.

Fucus bullatus fruticescens, caule nudo, foliis rectis compressis bifidis. *Morif. bist.* 3. p. 647. f. 15. t. 8. f. 5.

In Friesland tusschen Harlingen en Dykshoek op verscheide plaatsen aan 't Strand.

Cl. Gmelinus (*Fuc.* p. 62.) pro varietate *Fuci* vesiculosi habet.

ceranoides. 995. *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, fructificationibus tuberculatis bifidis terminalibus. *Sp.* 1626. n. 3. *Fris.* 510. *Gmel. fuc.* 115.

Fucus humilis dichotomus *ceranoides*, latoribus foliis ut plurimum verrucosis. *Morif. bist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 12.

By de voorige; ook by Wieringen.

Morisoni icon non satis bona. *Vid. Meese Fris.* 510.

canaliculatus. 996 *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima canaliculata lineari, fructificationibus tuberculatis bipartitis obtusis. *Syst. edit.* 13. p. 812. *Gmel. fuc.* 73. t. 1. A. f. 2.

Oed. dan. t. 244.

β. *Fucus excisus*. *Sp.* 1627. n. 10.

Fucus dichotomus membranaceus ex viridi flavescens *ceranoides* angulos rotundiusculos efformans. *Morif. bist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 11.

Te Catwyk dan 't Strand. (MEERBURGH.)

nodosus. 997. *Fucus* fronde compressa dichotoma, foliis distichis integerrimis, vesiculis innatis solitariis dilatatis. *Sp.* 1628. n. 11. *Fris.* 512. *Baster. opusc.* 6. p. 121. t. 11. f. 5. *Gmel. fuc.* 78. t. 1. B. f. 1.

Fucus maritimus *nodosus*. *Eaub. pin.* 365. *Comm. boll.* 39.

Fucus marinus *tertius*. *Dod. pempt.* 480.

Oed. dan. t. 146.

Knobbelachtig Wierd, Pater noster Wierd. Belg.

Omtrent bet Eyland Wieringen, en in Friesland aan 't Stand.

998. *Fu-*

998. *Fucus* fronde compressa ramosa, foliis distichis alternis integerrimis, fructificationibus pedunculatis oblongis mucronatis. *Sp.* 1529. n.

17. *Fris.* 513. *Gmel. fuc.* 81. t. 2. B.

Fucus marinus quartus. *Dod. pempt.* 480.

Fucus maritimus alter, tuberculis paucissimis.

Baub. pin. 368. *Comm. boll.* 39.

Oed. dan. t. 106.

By de voorige, en ook te Harderwyk aan 't Zee-Strand.

Sæpe buic innascitur Sertularia pluma.

999. *Fucus* fronde filiformi ramosissima, vesiculis ovatis terminatis foliolis multipartitis obtusis apice fructificantibus. *Sp.* 1629. n. 20. *Gmel.*

fuc. 86. t. 2. A. f. 3.

Fucus radicibus arborum fibrosis similis. *Raj. syn.*

49. n. 45. *Mees. frif.* 514.

Fucus folliculaceus, foliis foeniculi brevioribus. *Baub. pin.* 365.

In Friesland aan de Zee.

Coloris est rufi, substantiæ corneæ.

1000. *Fucus* fronde filiformi subfragili opaca. *Sp.* *Filum.*

1631. n. 31. *Gmel. fuc.* 131.

Fucus sive *Filum maritimum germanicum.* *Bocc. mus.* 1. p. 271. t. 9. f. 9.

Filum maritimum germanicum. *Baub. prodr.* 155.

Alga nigro capillaceo folio. *Baub. pin.* 364.

Comm. boll. 5.

By 't Eyland Wieringen.

1001. *Fucus* fronde palmata plana. *Sp.* 1630. n. 26. *palmatus.*

Fucus membranaceus ceranoides. *Baub. prodr.*

155.

Fucus foliaceus humilis palmam humanam referens. *Morif. bist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 1.

Alga membranacea ceranoides. *Baub. pin.* 364.

Comm. boll. 5.

Aan de Stranden van de Noord-Zee, omirent Zandvoort.

Cl. GMELINUS synonyma Baubini ad Suum Fucum dulcem refert (fuc. 189. 202.)

1002. *Fucus* fronde filiformi ramosissima hirta. *Sp. ericoides.*

1631. n. 33.

Fu-

divaricatus 994. *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima, axillis divaricatis: vesiculis axillaribus geminis. *Sp.* 1627. n. 8. *Frif.* 511.

Fucus bullatus fruticescens, caule nudo, foliis rectis compressis bifidis. *Morif. bist.* 3. p. 647. f. 15. t. 8. f. 5.

In Friesland tusschen Harlingen en Dykshoek op verscheide plaatsen aan 't Strand.

Cl. GMELINUS (*Fuc.* p. 62.) *pro varietate Fuci* vesiculosi habet.

ceranoides. 995. *Fucus* fonde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, fructificationibus tuberculatis bifidis terminalibus. *Sp.* 1626. n. 3. *Frif.* 510. *Gmel. fuc.* 115.

Fucus humilis dichotomus ceranoides, latoribus foliis ut plurimum verrucosis. *Morif. bist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 12.

By de voorige; ook by Wieringen.

Morisoni icon non satis bona. Vid. Meese Frif. 510.

canaliculatus. 996 *Fucus* fronde plana dichotoma integerrima canaliculata lineari, fructificationibus tuberculatis bipartitis obtusis. *Syst. edit.* 13. p. 812. *Gmel. fuc.* 73. t. 1. A. f. 2.

Oed. dan. t. 244.

β. *Fucus excisus. Sp.* 1627. n. 10.

Fucus dichotomus membranaceus ex viridi flavescens ceranoides angulos rotundiusculos efformans. *Morif. bist.* 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 11.

Te Catwyk dan 't Strand. (MEERBURGH.)

nodosus. 997. *Fucus* fronde compressa dichotoma, foliis distichis integerrimis, vesiculis innatis solitariis dilatatis. *Sp.* 1628. n. 11. *Frif.* 512. *Baster. opusc.* 6. p. 121. t. 11. f. 5. *Gmel. fuc.* 78. t. 1. B. f. 1.

Fucus maritimus nodosus. *Eaub. pin.* 365. *Comm. boll.* 39.

Fucus marinus tertius. *Dod. pempt.* 480.

Oed. dan. t. 146.

Knobbelachtig Wierd, Pater noster Wierd. Belg.

Omtrent bet Eyland Wieringen, en in Friesland aan 't Stand.

998. *Fu-*

niculata crassior. *Dill. musc.* 33. t. 6. f. 36.
Zeer veel in Friesland aan 't Strand, en dikwils op Mossels.

Variat colore alba, rubente, & ex albo rubente.
Conf. Dill. musc. t. 6. f. 37, & t. 7. f. 40.

1015. *CONFERVA* filis geniculatis: articulis cylindri- *catenata*.
cis. Sp. 1636. n. 16. *Fris.* 525.

Conferva ramosa, geniculis longioribus cateniformibus. *Dill. musc.* 27. t. 5. f. 27.

In plassen met brak water by Dyks-hoek in Friesland.

1016. *CONFERVA* filamentis geniculatis, ramis fasciculatis. *Sp.* 1636. n. 17. *Fris.* 526.

Conferva marina geniculata nigra palmata. *Dill. musc.* 32. t. 6. f. 35.

Oed. dan. t. 395.

Na barden storm, by Koehool in Friesland aan 't strand gevonden door MEËSE.

B Y S S U S.

1017. *BYSSUS* capillaris mollissima parallela fragillissima pallida. *Syst. edit.* 12. tom. 3. p. 235. *edit.* 13. p. 819.

Byssus latissima filtrum f. pannum laneum simulans, filamentis tenuissimis non ramosis. *Mich. gen.* 211. n. 10.

In dehuizen onder de houte vloeren; veel te Enckhuizen.

1018. *BYSSUS* filamentis plumosis natantibus. *Sp.* 1637. *Flos aqua.* n. 11. *Geir.* 672. *Fris.* 527.

Byssus latissima papyri instar supra aquam expansa. *Dill. musc.* 2.

Water-bloeizel. Belg.

Veel op 't Water in de voor-zomer.

Cl. F. G. WEIS (plant. cryptog. flora Gotting. p. 19. non vult ad vivas pertinere plantas, sed esse materiam collectam e particulis putredine destructarum plantarum aquaticarum, ob levitatem summam aqua petentibus superscieri.

1019. *BYSSUS* lanuginosa violacea lignis adnascens *phosporica*.
 X *Dill.*

- Dill. musc.* 4. t. 1. f. 6. *Sp.* 1638. n. 2. *Gelt.* 673. *Fris.* 528.
 Op oud verrot hout, op vochtige en beschaduwde plaatsen, en in beslootene kelders.
- velutina.* 1020. *BYSSUS* capillacea viridis: filamentis ramosis. *Sp.* 1638. n. 3. *Fris.* 529.
Byssus tenerrima viridis velutum referens. *Dill. musc.* 7. t. 1. f. 14.
Byssus terrestris viridis herbacea & mollissima, filamentis ramosis & non ramosis. *Mich. gen.* 211. t. 89. f. 5.
 Op den gront in de schaduw op zeer veele plaatsen.
- Jolithus.* 1021. *BYSSUS* pulverulenta sanguinea saxis innascens. *Sp.* 1638. n. 8. *Fris.* 530.
Byssus germanica minima saxatilis aurea violæ odorem spirans. *Mich. gen.* 210. t. 89. f. 3.
Jolithus s. lapis violaceus. *Swenck. foss.* 382.
 Op steenen en tusschen de zelve by veranderlyk en vochtig weêr, en ook op den gront in donkere vochtige plaatsen, als ook in bloempotten in kassen en broei-bakken.
- sandelaris.* 1022. *BYSSUS* pulverulenta flava lignis adnascens. *Dill. musc.* 3. t. 1. f. 4. *Sp.* 1639. n. 9. *Gelt.* 674. *Fris.* 531.
 Aan oude planken, muuren, en op oude panne-daken.
- botryoides.* 1023. *BYSSUS* pulverulenta viridis. *Sp.* 1639. n. 10. *Fris.* 532.
Byssus botryoides saturate viridis. *Raj. angl.* 3. p. 5. 6. *Dill. musc.* 3. t. 1. f. 5.
 Zeer gemeen op donkere vochtige gronden, en op de Tuin-potten.
- incana.* 1024. *BYSSUS* pulverulenta incana, farinæ instar strata. *Dill. musc.* 3. t. 1. f. 3. *Sp.* 1639. n. 11.
 Aan de kanten der slooten, langs zandige wegen.
- latic.* 1025. *BYSSUS* pulverulento-crustacea albissima. *Sp.* 1639. n. 12. *Fris.* 533.
Byssus candidissima, calcis instar muscos vestiens. *Dill. musc.* 2. t. 1. f. 2.
 Op de basten van oude Boomen, en op de Mossen.

F U N G I

A G A R I C U S.

1026. *AGARICUS stipitatus*, lamellis ramosis decur-^{Chanterel-}
rentibus. *Sp.* 1639. *n.* 1. *Gelr.* 675. *Fris.* 540. ^{lus.}
 α. *Fungus minimus flavescens infundibuliformis.*
Baub. pin. 373. *Comm. boll.* 42. *Boerb. lugdb.*
1. p. 12. *n.* 13. *Vaill. par.* 60. *t.* 11. *f.* 9. 10.
 Elvela pediculata pileata, pileo subtus reticu-
 lato. *Guett. stamp.* 1. *p.* 12.
 β. *Fungus angulosus & velut in lacinias sectus.* *Baub.*
pin. 371. *Vaill. par.* *t.* 11. *f.* 14. 15.
Oed. dan. *t.* 264.
Chanterelle of Geele Champignon. Vulgo.
 γ. *Fungus pallidus*, Chanterelle dictus, se contor-
 quens esculentus. *Baub. hist.* 3. *p.* 832.
 α. *Op 't bobbelige veld buiten Haarlem.* β. *Veel*
onder de Boomen en in de Boffchen by Putten,
Uilenpas, Keppel, en elders in Gelderland; op
Zandenburg, Hardenbroek, &c. in 't Sticht
van Utrecht; omtrent het Orange-woud in
Friesland. γ. buiten Franeker.
Synonymum γ. *Baub.* *Fungus intybaceus*, & alius
interaneorum vituli similis, cinereus, a Com-
melino β. adpositum excludatur.
1027. *AGARICUS stipitatus*, lamellis omnibus ma-^{integer.}
 gnitudine æqualibus. *Sp.* 1640. *n.* 3. *Fris.* 541.
Agaricus major, pediculo longo modice crasso,
 lamellis albis creberrimis superne ad margines
 apparentibus. *Raj. suppl.* 18. *Buxb. cent.* 4.
p. 12. *t.* 19.
Op Hei-velden, en in sommige Wei-landen, omtrent
Augustinisga &c. in Friesland.
1028. *AGARICUS stipitatus*, lamellis dimidiatis soli-^{muscarius.}
 tariis, stipite volvato: apice dilatato, basi
 ovata. *Sp.* 1640. *n.* 4. *Gelr.* 676.
Agaricus caulescens, pileo sanguineo, verrucis
 lamellisque albis, stipite albo basi globofo.
Linn. lapp. 515.
Fungi mulcas interficientis 111. species aut va-
 X 2 ri-

rietas. *Baub. pin* 373. n. 19.

Fungorum perniciosorum genus 12. n. 4. *Clus. bist.* 2. p. 280.

In de Laan van den Vanenburg op de Veluwe.

piperatus. 1029. *AGARICUS* stipitatus, pileo planiusculo lactescente, margine deflexo, lamellis incarnatopallidis. *Sp.* 1641. n. 8. *Gehr.* 677.

Fungus piperatus albus crassus, lacteo succo turgens. *Baub. bist.* 3. p. 825. *Misch. gen.* 141.

Roerb. lugdb. 1. p. 11. n. 4.

Fungus albus acris. *Baub. pin.* 371.

β. Fungus pileolo lato orbiculato candicante. C. B. *Comm. boll.* 40.

Fungus umbilicosus lactescens. *Sterb. fung.* 116. *In de Bosschen in Gelderland; β. in de Aardenhouts-Laan buiten Haarlem.*

campestris. 1030. *AGARICUS* stipitatus, pileo convexo squamato albido, lamellis ruffis. *Sp.* 1641. n. 9. *Gehr.* 678. *Fris.* 542.

Fungus pileolo lato & rotundo *Baub. pin.* 370. *Comm. boll.* 39.

Fungus campestris albus superne, inferne rubens. *Baub. bist.* 3. p. 824.

Witte Champignon, eetbaare Campernoelje, ook Duivels-brood. Belg.

β. Fungus pileolo lato & rotundo livido. *Baub. pin.* 370. *Roerb. lugdb.* 1. p. 11. n. 2.

γ. *AGARICUS* stipitatus, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Sp.* 1642. n. 14. *Fris.* 543.

Fungus orbicularis exalbidus pratensis. *Baub. pin.* 370. *Roerb. lugdb.* 1. p. 11. n. 5.

Fungus divi georgii, coloris exalbidi cum pauca flavitie, esculentus pratensis 1. *Baub. bist.* 3. p. 824.

Fungus croceus magnus. *Sterb. fung.* 63. t. 11. f. 3.

Op verscheide plaatsen in den berfst in de Weiden, en ook op 't hooge Veld by de Haarlemmer hout.

mammosus. 1031. *AGARICUS* stipitatus, pileo convexo acuminato griseo, lamellis convexis griseis crenatis, stipite nudo. *Sp.* 1642. n. 15. *Fris.* 544.

Fungus minor, capitulo pileum nauticum referen-

rente, pediculo longiore. *Buxb. cent. 4. p. 13.*
t. 21. f. 1.

By bet Strandmeesters - Huis aan den Zeedyk, om-
trent het Bildt in Friesland.

1032. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphaerico *clypeatus*.
viscido acuminato, lamellis albis, stipite lon-
go cylindrico albo. *Sp. 1642. n. 16. Fris. 545.*
Fungus clypeatus in medio protuberans. *Vaill.*
par. 68.

Veel in Boffchadien, en in de Hoven in 't najaar.

1033. AGARICUS stipitatus, pileo campaniformi al- *extinctori-*
bido lacero, lamellis niveis, stipite subbulbo- *us.*
so subulato nudo. *Sp. 1643. n. 17.*

Fungus perniciosus ex eodem pediculo multiplex.
Tourn. inf. 560. Boerb. lugdk. 1. p. 12. n. 19.
fl. Belg. 1051.

Fungi dumetorum ex uno pede prodeuntes.
Baub. pin. 374. Comm. boll. 41.

Fungorum perniciosorum genus XXII. Spec. V.
Clus. hist. 2. p. 285.

Aan oude Roomen; ook by de wegen te Schalkwyk
in 't Sticht van Utrecht.

Variat colore, magnitudine & numero, pro diver-
sis, quibus innascitur arboribus. (BOERH.)

1034. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato lace- *finetarius*
ro, lamellis nigris lateraliter flexuosis, stipite
fistuloso. *Sp. 1643. n. 18. Gelr. 679. Fris. 546.*

Fungus oris laceris & in lacinias divisus. *Baub.*
pin. 373. Comm. boll. 41.

Fungus comatus. *Sterb. fung. 228. t. 22. f. I.*
K. L.

Fungorum perniciosorum genus 16. n. 3. *Clus.*
hist. 2. p. 282.

Padden-stoelen. Vulgo.

Op Mest-boopen, en op donkere vochtige vernatte
gronden.

1035. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato stria- *campanula-*
to pellucido, lamellis adscendentibus, stipite *tus.*
nudo. *Sp. 1643. n. 19. Fris. 547.*

Fungus multiplex obtuse conicus, colore griseo
murino. *Vaill. par. 71. t. 12. f. 1. 2.*

Musculus arboreus, usnea officinarum. *Baub. pin.*
361. *Comm. boll.* 77.

Room - Moscb. Belg.

Aan velerbande foorten van Boomen.

Pharm. MUSCULUS ARBOREUS.

hirtus. 985. LICHEN filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Sp.* 1623. n. 78.
Gelr. 667.

Usnea vulgarissima tenuior & brevior sine orbiculis. *Dill. musc.* 67. t. 13. f. 12.

Musculus ramosus. *Tabern. ic.* 807.

Veel aan verscheide Boomen.

articulatus 986. LICHEN filamentosus articulatus, ramulis tenuissimis punctatis. *Sp.* 1623. n. 80.

Usnea capillacea & nodosa. *Dill. musc.* 60. t. 11. f. 4.

Musculus arboreus nodosus. *Faub. pin.* 361.

Musco-fungus arborum nodosus s. geniculatus.

Morif. bist. 3. p. 634. f. 15. t. 7. f. 11.

In de Duinen te Wassenaar. (MEERBURGH.)

floridus. 987. LICHEN filamentosus ramosus erectus, scutellis radiatis. *Sp.* 1624. n. 81. *Gelr.* 585.

Usnea vulgarissima tenuior & brevior cum orbiculis. *Dill. musc.* 69. t. 13. f. 13.

Musculus arboreus cum orbiculis. *Baub. pin.* 361.

Comm. boll. 77.

Musculus ramosus floridus. *Tabern. ic.* 808.

Veel aan Beuke-boomen.

T R E M E L L A.

Nostoc. 988. TREMELLA plicata undulata. *Sp.* 1625. n. 2.
Gelr. 668. *Gmel. fuc.* 222.

Tremella terrestris sinuosa pinguis & fugax. *Dill. musc.* 52. t. 10. f. 14.

Nostoc paracelsi. act. paris. 1708. p. 228.

In de Hoven en Wei-landen in de Na-zomer na langdurigen regen.

verrucosa. 989. TREMELLA tuberculosa solida rugosa. *Sp.* 1625.
n. 5. *Gelr.* 670. *Gmel. fuc.* 227.

Tremella fluviatilis gelatinosa & uterculosa. *Dill. musc.*

CRYPTOGAMIA FUNGI 327

- Fungus ceraforum imbricatim alteralteri innatus, variegatus. *Baub. pin. 372. Comm. boll. 40.*
Gekrulde Spaander Fungus. Belg.
 β. *Agaricus lichenis facie variegatus. Tourn. inst. 362. Boerb. lugdb. 1. p. 14. n. 5.*
 Fungus salignus lichenis forma variegatus. *Baub. pin. 372. Comm. boll. 40.*
 γ. *Agaricus foliaceus variegatus multiplex. Boerb. lugdb. 1. p. 14 n. 15.*
Aan oude Karfe, Wilge, en andere boomen, als mede aan rottige planken en paalen.

P H A L L U S.

1041. *PHALLUS pileo ovato celluloso, stipite nudo* ^{*esulentus*}
rugoso. Sp. 1648. n. 1. Gelr. 598.
Phallus petiolo nudo, pileo subtus undique annexo. Linn. b. Cliff. 379. Gelr. 599.
Boletus esculentus rugosus. Mich. gen. 203. t. 85. f. 2.
Merulius 1 - 5. Boerb. lugdb. 1. p. 13.
Fungus porosus. Baub. pin. 370.
Oed. dan. t. 53.
Morillies. Vulgo.
In 't laatst van April in de Zalker- en Herkeloerwaard, en in andere Boffchen, onder en aan de kanten van Heggen, voornaamlyk van Ype-boomen: ook wel op den Run, die men in de Hoven strooit.
1042. *PHALLUS volvatus stipitatus, pileo celluloso.* ^{*impudicus*}
Sp. 1648. n. 2. Gelr. 597.
Phallus vulgaris torus albus, volva rotunda, pileo cellulato ac summa parte umbilico pervio ornato. Mich. gen. 201. t. 83.
Phallus hollandicus f. batavicus. Dalech. bist. 1398.
Fungus foetidus penis imaginem referens. Baub. pin. 374. Comm. boll. 41.
Oed. dan. t. 175.
In de Riet-landen by Haarlem door LINNÆUS; in de Duinen en Zandige gronden by Heemstede door COMMELIN; en in de Laanen by Uilenpaas door my gevonden.

CLATHRUS.

- cancellatus*. 1043. CLATHRUS acaulis subrotundus. *Sp.* 1648. n. 1.
 Clathrus ruber. *Mich. gen.* 213. t. 93.
 Boletus cancellatus purpureus. *Tourn. inst.* 561.
 t. 329. f. 6.
 Fungus rotundus cancellatus. *Baub. pin.* 375.
Aan den weg tusschen Amsterdam en Haarlem in
't Riet gevonden 1735 door LINNEUS.

HELVELLA.

- Mitra*. 1044. HELVELLA pileo deflexo adnato lobato diffor-
 mi. *Sp.* 1649. n. 1.
 Fungus autumnalis velut apex staminis. *Mentz.*
pug. t. 6.
 Fungoides fungiforme crispum laciniatum & va-
 rie complicatum. *Mich. gen.* 204. t. 86. f. 7.
Oed. dan. t. 116.
Aan de boomen in 't Bosch te Meersbergen in 't
Sticht van Utrecht.

PEZIZA.

- lentifera*. 1045. PEZIZA campanulata lentifera. *Sp.* 1649. n. 1.
Gelt. 600. *Fris.* 554.
 Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti seri-
 ceum. *Mich. gen.* 222. t. 102. f. 1.
 Fungoides infundibuli forma, semine foetum.
Tourn. inst. 560. *Vaill. par.* 56. t. 11. f. 6. 7.
Boerb. lugdh. i. p. 13.
 Fungus minimus, ligneis tabellis areolarum hor-
 torum adnascens. *Baub. pin.* 374.
Oed. dan. t. 105.
In de Bosschen op takken en andere stukken hout;
ook in de Hoven aan de kanten van oude braeibak-
ken; en op de bedden met Run overdekt.
- punctata*. 1046. PEZIZA turbinata truncata, disco punctato. *Sp.*
 1650. n. 2. *Fris.* 555.
 Muscus minimus lignosus, disco punctato. *Bocc.*
mus. 2. p. 149. t. 107.
Oed. dan. t. 288.
In de Wei-landen op boompjes oude Paarde- en Koe-
mest, in den Herfst, dog niet veel.

1047. PE-

1047. PEZIZA cyathiformis: extus angulata venis *Acetabulum*.
ramosis. Sp. 1650. n. 4.
 Fungi peyizæ plinii. *Col. ecpr. 1. p. 385.*
 Fungoides angulatum, acetabuli forma. *Tourn. inst. 561. Boerb. lugdb. 1. p. 13. n. 2.*
 Fungoides fuscum acetabuli forma, externe ramificatum, seu Fungoides maximum pyxidatum. *Vaill. par. 57. t. 13. f. 1.*
 β. Fungi peyizæ altera species. *Col. ecpr. 1. p. 337.*
 Fungoides crispum, acetabuli forma. *Tourn. inst. 561. Boerb. lugdb. 1. p. 13. n. 3.*
 † *Volgens BOERHAAVE.*
Ab Ill. HALLERO bist. 2223. conjungitur cum
Peziza cocbleata.
1048. PEZIZA plana: margine convexo piloso. *Sp. scutellata.*
1651. n. 7. Fris. 556.
 Fungoides, qui fungus minimus scutellatus, coloris aurantij. *Vaill. par. 57. t. 13. f. 13. 14.*
In de Wei-landen, menigvuldig by een, op boopjes
oude Koe-mest, in nat weder.
1049. PEZIZA concava rugosa auriformis. *Syst. edit. Auricula.*
13. p. 823.
 Tremella *Auricula Sp. 1625. n. 3. Gelr. 669.*
Belg. 936. Fris. 507.
 Agaricum auriculæ forma. *Micb. gen. 124. t. 66.*
f. 1.
 Fungus membranaceus auriculam referens. *Baub. pin. 372. Comm. boll. 40.*
Judas Ooren. Belg.
Aan de stammen van oude Vlier-en andere Boomen,
in den voortyd.
 Pharm. AURICULÆ JUDÆ.

C L A V A R I A.

1050. CLAVARIA ramosa lignea nigra. *Sp. 1652. n. 4. digitata.*
 Agaricus digitatus niger. *Tourn. inst. 562. Boerb. lugdb. 1. p. 14. n. 11.*
 Hypoxylum, excrementum ligni putridi fungosum digitatum. *Mentz. pug. t. 6.*
Aan oud verrot hout.
Sapius est simplicissima. Jacq. vind. 196.

Hypoxylon 1051. *CLAVRIA* ramoso - cornuta compressa. *Sp.* 1652. n. 5. *Fris.* 557.

Fungus cornu dorcadis facie. *Epb. nat. cur. dec.* 1. ann. 4. p. 195.

BREYNIUS *Epb.* l. c. scribit, hunc fungum anno 1661. Amstelodami ex arboris pyri aut pruni trunco originem habuisse. MEESE in pago Harkema opeinde & prope Franequeram in arboribus vetustis putridis reperit. Ego in Belgio buscusque nullibi offendi.

coralloides 1052. *CLAVARIA* ramis confertis ramosissimis inæqualibus. *Sp.* 1652. n. 6. *Fris.* 559.

Corallo - fungus flavus. *Vaill. par.* 41. t. 8. f. 4. Coralloides flava & albida. *Tourn. inst.* 564. t. 332. f. B.

Barba caprina. *Sterb. fung.* 96. 97. t. 11. f. D. C. B. A.

In de Wei-landen omtrent Hitzum &c. in Friesland in October en November.

MEESE tres vel quatuor bujus uarietates recenset.

L Y C O P E R D O N.

Tuber. 1053. *LYCOPERDON* globosum solidum muricatum, radice destitutum. *Sp.* 1053. n. 1.

c. *Lycoperdon* subterraneum, ovato oblongum, glabrum, basi & radice carens. *Gleditsch. fung.* 156.

Tubera subterranea, testiculorum forma. *Mentz. pug.* t. 6. *Boerb. lugdb.* 1. p. 15.

Tartuffels. Belg.

By 't Huis 't Velde en de Ehse in 't Graafschap Zutphen.

Bovista. 1054. *LYCOPERDON* subrotundum: lacerato - dehiscens. *Sp.* 1053. n. 3. *Gelr.* 601. *Fris.* 560.

Lycoperdon vulgare. *Tourn. inst.* 563. *Boerb. lugdb.* 1. p. 15. n. 1.

Fungus rotundus orbicularis. *Baub. pin.* 374. *Comm. boll.* 42.

Fungus pulverulentus, dictus Crepitus lupi. *Baub. bist.* 3. p. 848.

Wolfs-jeest, *Bovist.* Belg.

f. Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus get-

- germanis Boiss. *Baub. bist.* 3. p. 848. *Comm. boll.* 42.
- γ. *Lycoperdon globosum sessile parvum & glabrum.*
Gleditsch. fung. 143.
- δ. *Lycoperdon rotundum album.* *Tourn. inst.* 563.
- ε. *Lycoperdon sphaericum, cortice tenaci castaneo.*
Boerb. ludb. 1. p. 15. n. 11.
- ζ. *Lycoperdon minus & multiplex sphaericum.* *Tourn. inst.* 563. *Boerb. lugdb.* 1. p. 15. n. 2.
- η. *Lycoperdon minus & multiplex ovatum.* *Tourn. inst.* 563. *Boerb. lugdb.* 1. p. 15. n. 3.
- θ. *Lycoperdon semiorbiculare.* *Tourn. inst.* 563. *Boerb. lugdb.* 1. p. 15. n. 5.
- Fungus niger, culicis figuram referens.* *Baub. pin.* 375. *Comm. boll.* 42.
- Fungus semioribicularis.* *Dod. pempt.* 485.
- ι. *Lycoperdon parvum, mortarii bellici forma.*
Boerb. lugdb. 1. p. 15. n. 9.
- κ. *Lycoperdon oblongum, utrinque introrsum emarginatum.* *Tourn. inst.* 563. *Boerb. lugdb.* 1. p. 15. n. 7.
- Fungus Boletus fuscus, basi globosa.* *Bocc. mus.* 1. t. 301. f. 4.
- λ. *Lycoperdon, qui fungus globosus levis pallidus ducis poli & rom.* *Bocc. mus.* 1. t. 303. f. 3. *Boerb. lugdb.* 1. p. 15. n. 8.
- μ. *Lycoperdon ingens conoides pileatum, plerumque gemellum.* *Boerb. lugdb.* p. 15. n. 10.
- α. & η. *Op zandige gronden in Moes- boven en Wei- landen β. Aan de dyken van de Beemster en Purmer op klei- grond. γ. In de Alleën by Harderwyk. δ. De overige gelyk ook de voorige Varieteiten vindt men in Friesland op de Kley en in de Wouden in Wei- landen en Boffchen.*
- Pharm. BOVISTA s. CREPITUS LUPI.
- Varietas β. quandoque eximia molis occurrit, ita ut quartam dolii zytopeptarum aequet.* Cl. BERGIUS (act. suec. vol. XXIII. p. 324.) reperit ineunte Septembri, in colle ex fimo putrido nato, ceterum takaco plantando destinato, *Lycoperdon, ejus peripheria major erat duarum ulnarum trium digitorum, pondus 18 librarum; ad quam magnitudinem quinque aut sex ad summum diebus creverat*
1055. *LYCOPERDON volva multifida patente, capistellatum.*
 tulo glabrò: ore acuminato plicato. *Sp.* 1553.
 n. 15. Ge.

CLATHRUS.

- cancellatus*. 1043. CLATHRUS acaulis subrotundus. Sp. 1648. n. 1.
 Clathrus ruber. Mich. gen. 214. t. 93.
 Boletus cancellatus purpureus. Tourn. inst. 561.
 t. 329. f. 6.
 Fungus rotundus cancellatus. Baub. pin. 375.
 Aan den weg tusschen Amsterdam en Haarlem in
 't Riet gevonden 1735 door LINNÆUS.

HELVELLA.

- Mitra*. 1044. HELVELLA pileo deflexo adnato lobato diffor-
 mi. Sp. 1649. n. 1.
 Fungus autumnalis velut apex staminis. Mentz.
 pug. t. 6.
 Fungoides fungiforme crispum laciniatum & va-
 rie complicatum. Mich. gen. 204. t. 86. f. 7.
 Oed. dan. t. 116.
 Aan de boomen in 't Bosch te Meersbergen in 't
 Sticht van Utrecht.

PEZIZA.

- lentifera*. 1045. PEZIZA campanulata lentifera. Sp. 1649. n. 1.
 Gelr. 600. Fris. 554.
 Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti seri-
 ceum. Mich. gen. 222. t. 102. f. 1.
 Fungoides infundibuli forma, femine foetum.
 Tourn. inst. 560. Vaill. par. 56. t. 11. f. 6. 7.
 Boerb. lugdh. 1. p. 13.
 Fungus minimus, ligneis tabellis areolarum hor-
 torum adnascens. Baub. pin. 374.
 Oed. dan. t. 105.
 In de Boffchen op takken en andere stukken hout;
 ook in de Hoven aan de kanten van oude braeibak-
 ken; en op de bedden met Run overdekt.
- punctata*. 1046. PEZIZA turbinata truncata, disco punctato. Sp.
 1650. n. 2. Fris. 555.
 Muscus minimus lignosus, disco punctato. Bocc.
 mus. 2. p. 149. t. 107.
 Oed. dan. t. 288.
 In de Wei-landen op boompjes oude Paarde- en Koe-
 mest, in den Herfst, dog niet veel.

1047. PE-

Oed. dan. t. 467. f. 4.

Schimmel. Belg.

Op oud Brood en andere verrottende lichaamen.

1061. *MUCOR stipitatus*; capitulo subrotundo aggre- *glaucus*.
gato. *Sp. 1756. n. 8. Fris. 562.*

Aspergillus capitatus, capitulo glauco, semini-
bus rotundis. *Mich. gen. 212. t. 91. f. 1.*

Meest op Vruchten, die aan 't verrotten zyn.

1062. *MUCOR stipitatus*, spicis digitatis. *Sp. 1656. n. crufaceus*.
9. *Gelr. 682. Fris. 563.*

Botrytis non ramosa alba, seminibus rotundis.

Mich. gen. 212. t. 91. f. 3.

Op bedorven spys.

1063. *MUCOR albus* capitulis fuscis sessilibus. *Sp. 1656. Eryfpha*.
n. 11.

Honing-daauw. Quibusdam.

Op de bladen van de Linde, Hop, doove Netelen,
Esch-doorn, &c.

1064. *MUCOR unctuosus flavus. Sp. 1656. n. 12.*

Mucilago flava ramosissima mollis. Hall. belq. 5.

Fris. 564.

Spongia fugax mollis flava & amoena in pulvere septicus.
coriario nascens. March. act. 1727. p. 472.

Op de Mest in de broeibakken, en op vochtige plan-
ken-vloeren.

In primo exortu ramosus, sed sensim ramos deponit
& spongiosam induit formam. (MERSE.)



O M I S S Æ.

- elliptica.* 1065. MELICA flosculi inferioris petalo exteriore ciliato. *Sp.* 97. n. 1.
Gramen avenaceum montanum lanuginosum.
Baub. pin. 10. *prodr.* 20. *theatr.* 156.
In de Wei-landen by Haarlem. (D. OUKERKE.)
Inferenda pag. 23. supra n. 80.
- lanceolata.* 1066. PLANTAGO foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *Sp.* 164. n. 6. *Gelt.* 79.
Fris. 67.
Plantago angustifolia major. *Baub. pin.* 189.
Comm. boll. 89. *Morif. bist.* 3. p. 259. f. 8. t. 15. f. 9.
Oed. dan. t. 437.
Honds-Ribbe, smalle of kleine Weegbren. Belg.
β. Plantago trinervia, folio angustissimo. *Baub. pin.* 189. *prodr.* 98. *Boerb. lugdb.* 2. p. 101.
By de voorige soorten.
Variat valde spicarum magnitudine.
Inferatur pag. 42. supra n. 144.
- pilosa.* 1067. GENISTA foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente. *Sp.* 999. n. 9.
Genista ramosa, foliis hyperici. *Baub. pin.* 395.
Chamæ-Genista prima. *Clus. bist.* 1. p. 103.
Op 't Veld by de Pyperey tusschen den Huize 't Velde en Geessink buiten Zutphen.
Floret menſe Majo.
Inferenda. p. 189. Supra. n. 593.

PLAN-

PLANTÆ INDIGENÆ

Q U Æ

IN LINNÆI SPECIEBUS PLANTARUM & SYSTEMATE NON OCCURRUNT.

1068. GRAMEN paniceum, spicis nigris. *Baub. pin.* 8. *Comm. boll.* 55. *Dill. giff.* 157.

Graminis dentis canini spica divulsa tenuior nigra species. *Baub. bist.* 2. p. 491.

Panik-gras. Belg.

In de Hoven en Moes-boven en andere bebouwde gronden.

III. HALLERUS *flor. jen.* 304. fatetur plantam sibi ignotam esse.

1069. GRAMEN Alopecuros major, spica longiore. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 58. *Boerb. lugdb.* 2. p. 158. n. 8.

Alopecuros major maritima repens, spica longiore. *Morif. bist.* 3. p. 191.

† *Volgens BOERHAAVE.*

D. GERARDUS in *Flora Gallo-prov.* 108. Gramen hoc ad *Lagurum cylindricum* refert.

1070. GRAMEN loliaceum supinum. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 130. *Comm. boll.* 54. *Boerb. lugdb.* 2. p. 157. n. 3.

Gramen phalaroides exile supinum humi sparsum danicum lobelii. *Baub. bist.* 2. p. 468.

Gramen loliaceum supinum minus locustis turgidi-

- *Geaster major*, umbilico fimbriato. *Michx.* gen. 120. t. 100. f. 1. 2. 3.
Oed. dan. t. 360.
In de Duinen van Holland, dog zeldzaam. (LINNÆUS.)

- pedunculatum.* 1056. *LYCOPERDON* stipite longo, capitulo globoso glabro, ore cylindrico integerrimo. *Sp.* 1654. n. 8.
Lycoperdon parisiense minimum pediculo donatum. *Tourn. inst.* 563. t. 331. f. E. F. *Boerb. lugdb.* 1. p. 15. n. 6.
Overal in de Duinen. (LINNÆUS.)

- variolosum.* 1057. *LYCOPERDON* parasiticum sessile subrotundum, cortice exteriore fulvo deciduo; farina atra compacta. *Syst. edit.* 13. p. 824.
Sphæria Lycoperdoides. *Weigel. obs. bot.* 47. t. 3. f. 2.
Lichenoides tuberculosum compressum nigrum, lignis putridis adnascens. *Dill. musc.* 127. t. 16. f. 7.
Aan het Paalwerk aan 't Strand tusschen Harlingen en Roptazyl, en elders.

- Epidendrum.* 1058. *LYCOPERDON* cortice farinaque purpurea. *Sp.* 1654. n. 9.
Lycoperdon sanguineum sphæricum. 1. *Buxb. cent.* 5. p. 15. t. 29. f. 2.
Bovista miniata, pist. majoris magnitudine. *Dill. giff.* 197.
Aan boude schuttingen, en oude muuren.

M U C O R.

- Embolus.* 1059. *MUCOR* seta nigra, villo fusco. *Sp.* 1655. n. 3.
Embolus nigerrimus villo albo adpersus. *Hall. bist.* 2137. t. 48. f. 1.
Op verrot hout aan de lucht bloot gestelt.
- Mucedo.* 1060. *MUCOR* stipitatus, capsula globosa. *Sp.* 1655. n. 6. *Gelr.* 681. *Frisf.* 561.
Mucor vulgaris, capitulo lucido per maturitatem nigro, pediculo griseo. *Michx. gen.* 215. t. 95. f. 1.

Oed.

Oed. dan. t. 467. f. 4.

Schimmel. Belg.

Op oud Brood en andere verrottende lichaamen.

1061. *Mucor stipitatus*; capitulo subrotundo aggreg. *glauco*.
gato. Sp. 1756. n. 8. Fris. 562.

Aspergillus capitatus, capitulo glauco, seminibus rotundis. Mich. gen. 212. t. 91. f. 1.

Meest op Vruchten, die aan 't verrotten zyn.

1062. *Mucor stipitatus*, spicis digitatis. Sp. 1656. n. *crufaceus*.
9. Gelr. 682. Fris. 563.

Botrytis non ramosa alba, seminibus rotundis.

Mich. gen. 212. t. 91. f. 3.

Op bedorven spys.

1063. *Mucor albus capitulis fuscis sessilibus*, Sp. 1656. *Eryspha*.
n. 11.

Honing-daauw. Quibusdam.

Op de bladen van de Linde, Hop, doove Netelen,
Esch-doorn, &c.

1064. *Mucor unctuosus flavus*. Sp. 1656. n. 12.

Mucilago flava ramosissima mollis. Hall. belv. 5.

Fris. 564.

Spongia fugax mollis flava & amoena in pulvere septicus.
coriario nascens. March. act. 1727. p. 472.

Op de Mest in de broetbakken, en op vochtige planten-vloeren.

In primo exortu ramosus, sed sensim ramos deponit
& spongiosam induit formam. (MERSE.)



O M I S S Æ.

- filia.* 1065. MELICA flosculi inferioris petalo exteriore ciliato. Sp. 97. n. 1.
Gramen avenaceum montanum lanuginosum.
Baub. pin. 10. prodr. 20. theatr. 156.
In de Wei-landen by Haarlem. (D. OUKERKE.)
Inferenda pag. 23. supra n. 80.
- lanceolata.* 1066. PLANTAGO foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. Sp. 164. n. 6. Gelr. 79.
Frif. 67.
Plantago angustifolia major. Baub. pin. 189.
Comm. boll. 89. Morif. bist. 3. p. 259. f. 8. t. 15. f. 9.
Oed. dan. t. 437.
Honds-Ribbe, smalle of kleine Weegbree. Belg.
β. Plantago trinervia, folio angustissimo. Baub. pin. 189. prodr. 98. Boerb. lugdb. 2. p. 101.
By de voorige soorten.
Variat valde spicarum magnitudine.
Inferatur pag. 42. supra n. 144.
- pilosa.* 1067. GENISTA foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente. Sp. 999. n. 9.
Genista ramosa, foliis hyperici. Baub. pin. 395.
Chamæ-Genista prima. Clus. bist. 1. p. 103.
Op 't Veld by de Pyperey tusschen den Huize 't Velde en Geessink buiten Zutphen.
Floret menſe Majo.
Inferenda. p. 189. Supra. n. 593.

PLAN-

PLANTÆ INDIGENÆ

QUÆ

IN LINNÆI SPECIEBUS PLANTARUM
& SYSTEMATE NON OCCURRUNT.

1068. GRAMEN paniceum, spicis nigris. *Baub. pin.* 8. *Comm. boll.* 55. *Dill. giff.* 157.

Graminis dentis canini spica divulsa tenuior nigra species. *Baub. bist.* 2. p. 491.

Panik-gras. Belg.

In de Hoven en Moes-boven en andere bebouwde gronden.

III. HALLERUS *flor. jen.* 304. fatetur plantam sibi ignotam esse.

1069. GRAMEN Alopecuros major, spica longiore. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 58. *Boerb. lugdb.* 2. p. 158. n. 8.

Alopecuros major maritima repens, spica longiore. *Morif. bist.* 3. p. 191.

† *Volgens BOERHAAVE.*

D. GERARDUS in *Flora Gallo-prov.* 108. Gramen hoc ad *Lagurum cylindricum* refert.

1070. GRAMEN loliaceum supinum. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 130. *Comm. boll.* 54. *Boerb. lugdb.* 2. p. 157. n. 3.

Gramen phalaroides exile supinum humi sparsum danicum lobelii. *Baub. bist.* 2. p. 468.

Gramen loliaceum supinum minus locustis turgidi-

Fungi multi ex uno pede, clypeiformes lutei & rubri. *Baub. bist.* 3. p. 835.
Aan nat verrot hout:

1091. FUNGUS albus pileolo inverfo. *Tourn. inst.* 559.
Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 12.

Fungus albus pileolo inverfo similis. *Baub. bist.* 3. p. 847. *Comm. boll.* 42.
Op 't bobbelige veld buiten Haarlem in October.

1092. FUNGUS arboreus clypeum referens ingens foetidissimus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 20.

1093. FUNGI buxei fasciculosi. *Sterb. fung. t.* 25. E.
Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 19.

1094. FUNGUS pallidus marmoreus. *Sterb. fung. t.* 8.
F. F. Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 17.

1095. FUNGUS, qui semi-fungus pallidus. *Sterb. fung. t.* 8. E. E. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 16.

1096. FUNGUS semicircularis durus meretti. *Comm. boll.* 42.
Aan oude Peer - en andere Boomen.

1097. FUNGUS lapis bufonis dictus. *Sterb. fung. t.* 23.
F. F. Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 22.

1098. AGARICO-FUNGUS superne villosus longus & angustus. *Hall. belv.* 57. *Mees. frif.* 550.
Op verscheide plaatsen in de Boomgaarden uit stammen van boomen, die aan 't vergaan zyn.

1099. AGARICUS ingens aureus, odore vinoso, sapore acido. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 8.

1100. AGARICUS, qui fungus flammeus, variae figuræ. *Sterb. fung. t.* 13. A. B. C. D. & t. 14.
E. F. G. Boerb. lugdb. 1. p. 14. n. 10.

1101. AGARICUS flammeus semiorbicularis hypocra-
 teriformis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 7.

1102. POLYPORUS sessilis carnosus flavus digitatus
 ma-

1074. *ANAGALLIS ruthæ foliis dissectis. Bruman.*

Zuoll. 4.
Omtrent Zwol.

1075. *ALSINE maritima, flore rubente. Baub. pin.*
251. *Comm. boll.* 7.

Alfina maritima neapolitana. Col. ecpbr.

By Enckhuisen aan de kant van de Zuider-Zee. Is
eerst door den Heer JACOB BRAYNE aldaar ge-
vonden. (COMM.)

Achter 's Gravezande op den Haack en 't Nieuw-
land. (Cel. SCHWENCKE.)

*Ego ante triginta circiter annos sapius maris littus
prope urbem meam patriam Encbusiam plantas legendis
causa calcavi, sed banc plantam non offendi, nisi
forſan fuerit Arenaria rubra varietas.*

1076. *ALSINE major. Baub. pin.* 250. *Comm. boll.* 6.
Zee-Muur. Belg.

Veel by Zandvoort, en aan den Muiderberg.

*Planta etiamnum mihi dubia; retuli eam in Flora
Belgica 376. auctoritate Ill. LINNÆI ad Cera-
stium aquaticum. Sed in manuscripto posthumo
D. TIMMER Chirurghi, dum vivebat, apud
Alkmarienses dexterrimi, simulque egregii Bota-
nophili, qui eam Texellis et circa Insulam de
Helder in Dunis copiose legit, notatum invenio,
plantam esse super terra se dispergentem, foliis
gaudentem crassiusculis, & cujus pericarpium
est capsula bujus magnitudinis O. Ipse quoque
Cl. COMMELINUS monet figuras Dodonæi, Ta-
bernæmontani & Lobelii malas esse, easque se-
duxisse C. Baubinum, quum hæc sit planta hu-
milis, terræ incumbens, quæ pro *Alfina* majori ba-
beri nequit.*

1077. *SALIX latifolia repens. Baub. pin.* 474. *Comm.*
boll. 102.

Salix pumila latifolia 2. Clus. bist. 1. p. 85.

Breede Duin-Wilg. Belg.

In de Duin-Valeyen overvloedig.

1078. *MUSCUS denticulatus major. Baub. pin.* 360.
Comm. boll. 77. *Boerb. lugdb.* 1. p. 22. n. 50.

Muscus terrestris denticulatus. Lob. ic. 2. p. 244.

Y

Klei-

Kleine Aard-Mos. Belg.

Op vochtige Zand-gronden buiten Haarlem.

Quo ad nomina hic Muscus est Lycopodium helveticum. Sp. 1568. n. 18. quod habitat in Alpibus Helvetiæ & Carniolæ, nec extra eas buculus lectum; adeoque COMMELINUS & BOERHAAVIUS aliam Musci speciem, forsan Hypni, hoc nomine intellexerunt.

1079. *Muscus denticulatus minor. Baub. pin. 360.*

Comm. boll. 77. Boerb. lugdb. 1. p. 22. n. 51.

Muscus terrestris denticulatus alter. Lob. ic. 2. p. 244.

By de voorgaande, en buiten Utrecht.

Quo ad nomina hic Muscus est Lycopodium denticulatum. Sp. 1569. n. 24. quod autem extra Lusitaniam, Hispaniam & Iberiam buculus non lectum.

1080. *Muscus saxatilis squamosus dentatus, capitulis adianthi. Boerb. lugdb. 1. p. 22. n. 46.*

DILLENIIUS suspicatur suum esse Hypnum flagellare saxatile, capsulis gracilibus. Dill. musc. 306. t. 39. f. 42.

1081. *LICHEN-AGARICUS cespitosus acaulis nigricans, sub cute anagyridis non foetidæ erumpens. Mich. gen. 105. t. 54. f. 5. Meese. frif. 477.*

Op de stammen van kwaare Essen-boomen in Friesland.

1082. *LICHEN pulmonarius membraceus gelatinosus pullus, in segmenta latiora divisus, receptaculis florum exiguis obscure rubris numerosissimis. Mich. gen. 87. Hall. belv. 80. Mees. frif. 492.*

Lichen gelatinosus membranaceus exasperatus convolutus atroviridis, scutellis rubris. Hall. bist. 2037.

Lichenoides gelatinosum membranaceum tenue nigricans. Dill. musc. 138. t. 19. f. 20.

Op de bast van Ypen-boomen te Hytzum in Friesland.

Pertinet ad Lichenes membranaceos.

1083. *Fun-*

1083. *FUNGUS* aureus, crustæ instar cortici quercino
raso innascens. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 26.

1084. *AGARICUS*, qui *Fungulus hyemalis*, pileolo
albo, lamellis flavis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12.
n. 15.

1085. *AGARICUS*, qui *fungus parvus*, pediculo ob-
longo firmo lento, pileolo in medio fastigia-
to, striis exterius apparentibus. *Raj. syn.* 13.
Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 21.
In de Weiden in September.

1086. *AGARICUS*, qui *Fungorum esculentorum ge-
nus VI.* *Clus. bist.* 2. p. 266. *Boerb. lugdb.* 1.
p. 12. n. 23.

1087. *FUNGUS* perniciosus 44 ex uno pede producens.
Comm. boll. 42. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 24.
Aan de voet van oude Appel-boomen in October.

1088. *FUNGUS* parvus, pediculo oblongo, pileolo
hemisphærico, ex albido subluteus. *Raj. syn.*
13. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 18.
In de Weiden op Koe- en Paarde-Mest.

1089. *AGARICUS* pileo papillari amplissimo, in mar-
gine fornicato lacero & filamentoso, petiolo
annulato procero, inferius tumido, pilei ace-
tabulo inserto. *Gleditsch. fung.* 114.

Agaricus pediculo annulato, pileo & pediculo
variegatis. *Guettard. stamp.* 23. *Dalib. par.* 378.

Fungus pileolo lato longissimo, pediculo varie-
gato. *Baub. pin.* 371. *Comm. boll.* 40. *Boerb.*
lugdb. 1. p. 11. n. 6.

Fungus coronatus aut *marmoreus.* *Sterb. fung.*
77. t. 7. A.

Fungi longissimo pediculo candicantes, sed ma-
culati, esculenti. *Baub. bist.* 3. p. 826.

Op zandige gronden in de Haarlemmer-hout.

1090. *AMANITA* tener conicus lacer cervinus, la-
mellis nigris. *Hall. bist.* 2485.

Fungus clypeiformis major. *Baub. pin.* 373. *Comm.*
boll. 41. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 11.

Fungi multi ex uno pede, clypeiformes lutei & rubri. *Baub. bist.* 3. p. 835.
Aan nat verrot hout:

1091. FUNGUS albus pileolo inverso. *Tourn. inst.* 559.
Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 12.

Fungus albus pileolo inverso similis. *Baub. bist.* 3. p. 847. *Comm. boll.* 42.
Op 't hobbelige veld buiten Haarlem in October.

1092. FUNGUS arboreus clypeum referens ingens foetidissimus. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 20.

1093. FUNGI buxei fasciculosi. *Sterb. fung. t.* 25. E.
Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 19.

1094. FUNGUS pallidus marmoreus. *Sterb. fung. t.* 8.
F. F. Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 17.

1095. FUNGUS, qui semi-fungus pallidus. *Sterb. fung. t.* 8. E. E. *Boerb. lugdb.* 1. p. 12. n. 16.

1096. FUNGUS semicircularis durus meretti. *Comm. boll.* 42.
Aan oude Peer - en andere Boomen.

1097. FUNGUS lapis bufonis dictus. *Sterb. fung. t.* 23.
F. F. Boerb. lugdb. 1. p. 12. n. 22.

1098. AGARICO-FUNGUS superne villosus longus & angustus. *Hall. belv.* 57. *Mees. frif.* 550.
Op verscheide plaatsen in de Boomgaarden uit stammen van boomen, die aan 't vergaan zyn.

1099. AGARICUS ingens aureus, odore vinoso, sapore acido. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 8.

1100. AGARICUS, qui fungus flammeus, variae figuræ. *Sterb. fung. t.* 13. A. B. C. D. & t. 14.
E. F. G. Boerb. lugdb. 1. p. 14. n. 10.

1101. AGARICUS flammeus semiorbicularis hypocrateriformis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 7.

1102. POLYPORUS sessilis carnosus flavus digitatus
 ma-

- maximus. *Hall. bist.* 2277.
 Fungus casearius ex campenhout. *Sterb. fung.*
170. t. 12. A. Comm. boll. 49.
Aan oude Ypen-boomen, buiten Hoorn, te Am-
sterdam, en elders.
1103. AGARICUS niger parvus, cornua damæ refe-
 rens. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 14.
1104. AGARICUS falsus, *Sterb. fung. t.* 27. D. *Boerb.*
lugdb. 1. p. 14. n. 9.
1105. AGARICUS fraxinetis niger durus orbiculatus.
Tourn. inst. 562. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 12.
Hall. jen. 373.
 Fungus fraxineus niger durus orbiculatus. *Raj.*
syn. 18. *bist.* 109.
Aan de Esfen-boomen.
1106. FUNGOIDASTER minimus discoides albus,
 semine ovato donatus, foliis vel lignis semi-
 putridis innascens. *Mich. gen.* 201. t. 82. f. 3.
Mees. frif. 553.
Op de bast van een boomachtige Aloë-plant gevon-
den.
1107. FUNGUS pezicæ minoris sanguin. breynii. *Comm.*
boll. 41.
Buiten Naarden in vochtige zandige gronden.
1108. PEZIZA cava albida, intus coccinea. *Hall. bist.*
 2222.
 Elvela orbicularis sessilis excavata, intus cocci-
 nea, tota glabra. *Gleditsch. fung.* 49.
 Fungus putridis arborum ramis inhærens, pluri-
 mis simul cohærentibus. *Baub. pin.* 372. *Comm.*
boll. 41.
 Fungi perniciosi generis XXIV. *spec.* 2. *Clus.*
bist. 2. p. 28.
 Parva concha marina, colore coccineo. *Sterb.*
fung. 242. t. 26. D.
Aan verrotte afgekapte boomen, en op natte gronden.
1109. PEZIZA membranacea tubæ similis, marginibus
 erectis laceris. *Hall. bist.* 2217.

Elvela petiolata tubulosa, margine inæquali lacero & multifido. *Gleditsch. fung.* 40.

Agaricus tubæ fallopianæ instar laciniatus. *Tourn. inst.* 562. *Burb. cent.* 5. p. 3. t. 3. f. 2. *Boerb. lugdb.* 1. p. 14. n. 13.

Aan oude verrotte stammen van Boomen in de Boffchen.

1110. *AGARICUM* nigrum reticulatum compressum, emortuis arboribus inter corticem & lignum, interdum in ipso ligno innascens, ac late se diffundens. *Mich. gen.* 125. t. 66. f. 3. *Mees. frif.* 558.

Mengvuldig in verrot hout tusschen de bast en 't hout.

1111. *LYCOGALA* griseum majus. *Mich. gen.* 216. t. 95. f. 1. *Mees. frif.* 565.

Somtyds aan oude Eike- en andere paalen, onder bruggen, en aan scheeringen.

Te Catwyk aan de Fucus nodosus.

- Z. SERTULARIA eburnea. Linn. Syst. 1316. n. 39.
 Cellularia eburnea. Pall. zooph. 33.
 Aan de Nood-Zee omtrent Zandvoort op een stuk Kryt.
 Omnia hac Zoophyta ad littora Oceani Hollandiam alluentis
 obvia mecum communicavit industrius Hortulanus MEER-
 BURGH, qui eadem primo vere et sero autumnno, praeipue
 post tempestatem duorum triumve dierum, non sine magni
 frigoris tolerantia, ex magnis acervis Fucorum in littora
 rejectis extricavit.

* * * * *

- A. a. OSTEOCOLLA officinarum. Comm. boll. 84.
 Been-breuk. Belg.
 In de Duinen van Heemstede; en veel te Rakagne.
 Non est planta lapidosa, ut Cl. COMMELINUS scribit,
 sed Tophus calcareus cylindricus perforatus. Linn. amen.
 3. p. 151.
- B. b. PILA marina velut ex ampullis constans ad spumæ si-
 militudinem. Baub. pin. 368. Comm. boll. 87.
 Zee-Ballen. Belg.
 Wordt aan de Zee-stranden van Holland opgeworpen.
 Non est Vegetabile, sed concrementum perpetuo fluxu maris
 ex tuberibus radicum Zofteræ (744. 745.) in fibrosas &
 stupposas pilas maceratione resolutas, aliisque rebus cum
 spuma maris ita compactum. Vid. Raj. bist. 83. Schrock.
 Epb. N. C. Dec. 11. ann. 1. obs. XIV. Pharm. Wirtemb.
 17. Pall. Zooph. 342.



- α. USTILAGO Secales. Baub. pin. 24. Comm. boll. 117.
 Ustilago. Dod. pempt. 542.
 Brand-keorn. Belg.
- β. Ustilago Hordei. Baub. pin. 24. Comm. boll. 117.
- γ. Ustilago Avenacea omniumque Avenæ specierum. Baub.
 pin.

ZOOPHYTA INDIGENA.

- A. SPONGIA panicea. *Pall. zooph. 235.*
 Spongia medullam panis referens. *Ellis. cor. 80. n. 2. t. 16. f. d. D. Mees. fris. 538.*
Aan 't Zee-strand van Friesland.
- B. SPONGIA capillaris tubulosa simplex miro modo implicata crispa ferruginea. *Mees. fris. 539.*
By de voorige.
- C. SPONGIA lacustris. *Linn. Syst. edit. XII. p. 1299. n. 15.*
Te Catwyk in 't malle gat. (MEERBURGH.)
- D. SPONGIA fluviatilis. *Linn. Syst. 1299. n. 16. Pall zooph. 231.*
Badiagaminor. Buxb. act. petrop. 2. p. 344. Cent. 5. p. 12. t. 23. f. 2.
Veel aan de oude paalen van de Nieuwstads-brug te Zutphen, en in den Ouden-Yssel by Doesborg. (Nos.) Aan de paalen in een Vyver van een Tuin buiten Rotterdam (Rev. D. NOZEMAN.)
Spongia hæc, quam mihi misit amicissimus D. NOZEMAN, non erat ramosa: videtur fluxu perpetuo fluenti, in quo crescit, ramos sive cornua acquirere, quæ in aqua stagnante non generantur. Semina, quæ Spongiæ fluviatili tribuunt RUPPIUS & BUXBAUMIUS, etiam in nostra recentioreperta sunt a Dno NOZEMAN, qui in litteris ad me 4. Octob. 1771. datis, contra Lib. Bar. MUNCKHAUSEN (Linn. amæn. acad. vol. VII. p. 398.) scribit, illa semina nequaquam animalcula produxisse; atque etiam Auctor Commentariorum de reb. in scient. nat. & med. gestis, statuit Spongiam fluviatilæ ad vegetabilem adhuc naturam accedere. Conf. Epist. erud. ad Hall. Vol. 1. p. 52. ubi male Badaja legitur. De ejus usu apud Russos vide Flor. Ingr. p. 178.
- E. FLUSTRA foliacea. *Linn. Syst. 1300. n. 1.*
Eschara foliacea. Pall. zooph. 16.
Porus cervinus imperati. Baub. pin. 367. Comm. boll. 92.
Alga marina platyceros porosa. Baub. bist. 3. p. 809.
Op Vlieland aan de Zeekant.

F. FLUS-

ZOOPHYTA INDIGENA.

345

- F. FLUSTRA pilosa. *Linn. Syst.* 1301. n. 3.
Eschara pilosa. Pall. zooph. 15.
Zee-Mos. Belg.
Veel in de Noord - Zee omtrent Scheveningen.
- G. ESCHARA crustulenta. *Pall. zooph.* 8.
Eschara lapidescens. Baster. opusc. 1. l. 2. p. 83. t. 7.
f. 4. 5.
Menigvuldig in 't Eyland Schouwen in Slooten van brak- of
zout-water.
- H. TUBULARIA indivisa. *Linn. Syst.* 1301. n. 1.
Tubularia calamaris. Pall. zooph. 38.
Te Scheveningen aan 't strand.
- I. TUBULARIA ramosa. *Linn. Syst.* 1302. n. 2.
Tubularia trichoides. Pall. zooph. 41.
By Noordwyk op 't strand.
- K. TUBULARIA fistulosa. *Linn. Syst.* 1302. n. 3.
Cellularia Salicornia. Pall. zooph. 21.
Corallina fistulosa fragilis prima. Baub. hist. 3. p. 811.
Comm. boll. 29.
By Zandvoort op 't strand, alwaar door de Zee word opge-
worpen.
- L. TUBULARIA muscoides. *Linn. Syst.* 1302. n. 5. *Pall.*
zooph. 39.
Aan 't Zee-strand van 't Eyland Walcheren.
(L. BOMME Verband. van 't Zeeuwfch Genootfchap. 2de
deel. p. 281.)
- M. SERTULARIA pumila. *Linn. Syst.* 1306. n. 2. *Pall.*
zooph. 79.
Aan de Noord - Zee omtrent Zandvoort op de Fucus ericoides.
- N. SERTULARIA operculata. *Linn. Syst.* 1307. n. 3.
Sertularia usneoides. Pall. zooph. 80.
Zee-Hair. Belg.
Te Catwyk en Scheveningen.
- O. SERTULARIA abietina. *Linn. Syst.* 1307. n. 5. *Pall.*
zooph. 81.
Abies marina belgica. Clus. hist. 1. p. 35. *Comm. bol.* 3.
Abieti similis maritima. Baub. pin. 365.

Zee - Denna - boom. Belg.

Aan 't Zee - Strand van 't Eyland Wieringen, de Helder, Texel, op Hoorns en Mossel - schulpen.

P. SERTULARIA cupressina. *Linn. Syst.* 1308. n. 6. *Pall. zooph.* 89. *Meef. frif.* 535.

Cupressus marina belgica Clusii & L. Bauh. *Comm. boll.* 30. *Zee - Cypres.* Belg.

β. Sertularia argentea. *Linn. Syst. edit. X. p.* 809. n. 7.

Op Hoorntjes en Schulpen omtrent 't Eyland Wieringen; ook aan de Friesche kusten. β. Te Catwyk aan 't Strand.

Q. SERTULARIA Thuja. *Linn. Syst.* 1308. n. 9. *Pall. zooph.* 88.

In Zeeland. (PALLAS.)

R. SERTULARIA Myriophyllum. *Linn. Syst.* 1309. n. 16. *Pall. zooph.* 96.

Te Zandvoort aan een stuk Kryt.

S. SERTULARIA falcata. *Linn. Syst.* 1309. n. 11. *Pall. zooph.* 97. *Meef. frif.* 536.

Aan de Friesche kusten.

T. SERTULARIA Pluma. *Linn. Syst.* 1309. n. 12. *Pall. zooph.* 93.

Te Harderwyk aan 't Strand op de Fucus filiquosus.

V. SERTULARIA antennina. *Linn. Syst.* 1310. n. 14. *Pall. zooph.* 91.

Zee - baard. Belg.

Te Catwyk aan Schulpen en stukken Kryt.

W. SERTULARIA dichotoma. *Linn. Syst.* 1312. n. 22. *Meef. frif.* 537.

Sertularia longissima. *Pall. zooph.* 69.

Zee - draad. Belg.

Aan de Zee - stranden van Friesland.

X. SERTULARIA spinosa. *Linn. Syst.* 1312. n. 23.

Sertularia sericea. *Pall. zooph.* 65.

Te Catwyk aan 't Strand.

Y. SERTULARIA Lichenastrum. *Linn. Syst.* 1313. n. 27. *Pall. zooph.* 85.

Te

Te Catwyk aan de Fucus nodosus.

- Z. SERTULARIA eburnea.** *Linn. Syst.* 1316. n. 39.
Cellularia eburnea. *Pall. zooph.* 33.
Aan de Nood-Zee omtrent Zandvoort op een stuk Kryt.
Omnia hæc Zoophyta ad littora Oceani Hollandiam alluentis
obvia mecum communicavit industrius Hortulanus MEER-
BURGH, qui eadem primo vere et sero autumnno, præcipue
post tempestatem duorum triumve dierum, non sine magni
frigoris tolerantia, ex magnis acervis Fucorum in littora
rejectis extricavit.

* * * * *

- A. a. OSTEOCOLLA officinarum.** *Comm. boll.* 84.
Been-breuk. Belg.
In de Duinen van Heemstede; en veel te Rakagne.
Non est planta lapidosa, ut Cl. COMMELINUS scribit,
sed Topus calcareus cylindricus perforatus. *Linn. aman.*
3. P. 151.
- B. b. PILA marina** velut ex ampullis constans ad spumæ si-
 militudinem. *Baub. pin.* 368. *Comm. boll.* 87.
Zee-Ballen. Belg.
Word aan de Zee-stranden van Holland opgeworpen.
Non est Vegetabile, sed concrementum perpetuo fluxu maris
ex tuberibus radicum Zosteræ (744. 745.) in fibrosas &
stupposas pilas maceratione resolutas, aliisque rebus cum
spuma maris ita compactum. *Vid. Raj. bist.* 83. *Schrock.*
Epb. N. C. Dec. 11. ann. 1. obs. XIV. Pharm. Wirtemb.
17. Pall. Zooph. 342.



- α. USTILAGO Secales.** *Baub. pin.* 24. *Comm. boll.* 117.
Ustilago. *Dod. pempt.* 542.
Brand-keorn. Belg.
- β. Ustilago Hordei.** *Baub. pin.* 24. *Comm. boll.* 117.
- γ. Ustilago Avenacea** omniumque Avenæ specierum. *Baub.*
pin.

pin. 24. Comm. boll. 117.

- ♂. Ustilago Triticæ, omniumque hujus specierum.
- ♀. Ustilago Poæ aquaticæ. 81.
- ζ. Ustilago Festuæ fluitantis. 100.
- ♂. Ustilago Lolii perennis. 120.
- ♂. Ustilago Airæ cespitosæ. 75.
- ♂. Ustilago Holci lanati. 828.
- ♂. Ustilago Caricis arenariæ. 760.

Aan de Koorn - en Gras - gewassen.

Ustilago morbus est Plantarum, cujus tres occurrunt Species. 1° Spica sive Panicula convertitur in pulverem nigrum subtilissimum, cui malo obnoxia sunt Triticum, Hordeum, Avena, Holcus, Carex. 2° Granum seu semen in longum excrecit, instar calcaris galli, hinc Cornutum sive Clavus dictum, uti in Secali, Festuca, Lolio, Aira. 3° Fructificatio est sana, sed ceterum tota planta tegitur pulvere nigro, instar fuliginis subtilissima, uti in Poa aquatica. Interdum quoque tota planta Ustilagine inficitur, ita ut ne unicam proferat fructificationem, sicuti in Tritico junceo prope Scheveningam sæpius videre est.

Aquâ tepidâ hic pulvis aliquot dies maceratus, oculo armato conspicua præbet corpuscula vermiformia, byalina, anguillarum instar natantia, simili fere modo, ut in liquoribus aquosis mixtis Pipere, inque aliis infusis videmus; quæ an vera sint animalcula animata, disputant recentiores Observatores. Vide Cl. HOULTUYN *Natuurk. Historie. l. Deels 18de stuk. blad. 201. sqq.*

ADDENDA & EMENDANDA.

- p. 3. sub l. 24. *in*tere. *Stevens - kruid*. Belg.
p. 7. l. 34. *adde.* in 't *Leeftensche broeck*.
p. 8. l. 3. *adde.* *Neeten - kruid*.
p. 11. l. 3. in *margin*e lege. *Pseudacorus*.
ib. l. 20. in *margin*e lege. *foetidissima*.
ib. l. ult. in *margin*e lege. *nigricans*.
p. 13. l. 24. lege. *Chamæschœnus*.
p. 15. l. 34. in *margin*e lege. *polystachion*.
ib. l. 37. lege. 562.
p. 16. l. 1. *adde.* *Catoen - bloem*.
p. 23. sub l. 6. *in*tere. *Bund - gras*. *Rusticis*.
p. 30. l. 22. in *margin*e lege. *loeflingiana*.
p. 31. sub l. 16. *in*tere. *Gebaarde Eve*ne. Belg.
p. 33. l. 32. lege. *duplici versu dense dispositis constante*.
Scheuch. gram. t. 2.
p. 35. l. 6. *adde.* *Obstant etiam icones Auctorum. Cl. GERARD*
(fl. Gallopr. 91.) & GOUAN (fl. Monspel.
470.) pro specie Airæ habent.
p. 37. l. 11. in *margin*e *adde.* *montana*.
ib. sub l. 36. *in*tere. *Wilde Cornoellie*. Belg.
p. 45. l. 27. lege. *Te Nede, Roderloo, en elders in 't Graaf-*
schap Zutphen, ook op verscheide enz.
p. 49. l. 13. *adde.* *Vergeet my niet*.
p. 55. l. 4. lege. *Hierden*.
p. 56. l. 6. lege. *SCHWENCKE*.
p. 62. l. 9. lege. *Nonnullis*
p. 63. l. 18. *Doorn - beziën. lege. Duin - beziën*.
p. 78. l. 26. lege. *pabulum*.
ib. l. 37. lege. *Cuilenburg*.
p. 80. l. 26. lege. *boll. 25*.
p. 89. l. 12. *adde.* *ook in den Aardenhout by Haarlem. (D.*
OUKERKE.)
p. 107. l. 13. *adde.* *Honds - beziën, Beeren - beziën. Perperam*
hæc planta habetur pro Uva Ursi officinarum.
p. 121. l. 16. lege. *Woud - kruid*.
p. 124. sub l. 9. *in*tere *Jenettekens, wilde Christus - Oogen.*
Belg.
p. 131. l. 5. *adde.* *In de Weiden tusschen de Bronsbergen en*
den Yssel by Zutphen.
p. 136. l. 11. lege. *by Zutphen en Harderwyk;*

I N D E X

G E N E R U M

&

S Y N O N Y M O R U M.

A.

Abrotanum 668.
Abfinibium. 669. 670. 672.
Acanthium. 661. 662.
Acer. 837. 838.
Acetosa. 327. 328.
Acetofella. 328. 391.
Achillea. 706. 707.
Acinos. 508.
Acorum. 306.
Acorus. 306.
Acorus. 32.
Adiantum. 852. 867.
Adonis. 462.
Egopodium. 276.
Eiculus. 333.
Ethusa. 264.
Agarico-Fungus. 1098.
Agaricum. 1049. 1110.
Agaricus. 1026 - 1038. 1103-1105.
Agaricus. 1050. 1084 - 1086. 1089. 1099-1101. 1103-1109.
Agrimonia 404.
Agrostemma. 393.
Agrostis. 67-72.
Aira. 73-79.
Aira. 91.
Ajuga. 478.
Alchemilla. 151.
Alchimilla. 151.

Alga. 745. 992. 1000. 1003. 1008-1010.
Algoides. 746.
Alisma. 331. 332.
Alliaria. 560.
Allium. 293-295.
Alnus. 211. 786.
Aloe. 454.
Aloides. 454.
Alopecurus. 45. 1069.
Alopecurus. 62-65.
Alfine. 281.
Alfine. 3. 4. 16-19. 146. 149. 166. 167. 200. 217. 286. 319. 371. 377. 380-385. 396-401. 529. 1075. 1076.
Althæa. 583.
Alysson. 534.
Amanita. 1090.
Amaranthus. 791.
Ambrosia. 544.
Amellus. 679.
Anacampseros. 386.
Anagallis. 188. 189.
Anagallis. 11-13. 146. 186. 200. 1074.
Anchusa. 171.
Andromeda. 360.
Androsamum. 626.
Anemone. 455-457.
Angelica. 257.
Angelica. 276.
Anonis. 596.
Anserina. 435.

AR-

Genista. 591. 595. 1067.
Genistella. 593. 594.
Gentiana. 236-240.
Gentiana. 341.
Gentianella. 237. 239.
Geranium. 575-582.
Geum. 441. 442.
Githago. 393.
Gladolus. 33. 358. 720.
Glaux. 217.
Glaux. 319.
Glecoma. 490.
Globularia. 130.
Gnaphalium. 673-676.
Gnapbalium. 714-718.
Gramen alopecurinum. 65.
 ——— *alopecuroides*. 115.
 ——— *alopecurus*. 1069.
 ——— *alpinum*. 775.
 ——— *angustifolium*. 126.
 ——— *aquaticum*. 54. 64. 100.
 ——— *arvense*. 89.
 ——— *arundinaceum*. 54. 80.
 118.
 ——— *avenaceum*. 74. 77.
 97. 98. 102. 114. 1065.
 ——— *caninum*. 68. 73. 123.
 127. 128. 827. 1072.
 ——— *Caryophyllatum*. 769.
 ——— *cristatum*. 95.
 ——— *Cyperoides*. 38. 39. 49.
 50. 756-758. 760. 761.
 763. 767. 773. 776. 778-
 783.
 ——— *dactylon*. 58.
 ——— *dentis canini*. 1068.
 ——— *eriophorum*. 52.
 ——— *floridum*. 379.
 ——— *hirsutum*. 315-317.
 ——— *hordeaceum*. 124.
 ——— *juncum*. 41. 43. 46.
 311-313. 329. 759. 784.
 ——— *lanatum*. 828.
 ——— *latifolium*. 127.
 ——— *loliaceum*. 72. 99. 120-
 122. 128. 1070. 1071.

Gramen longius. 1072.
 ——— *maria*. 829.
 ——— *miliaceum*. 70. 71.
 ——— *montanum*. 69. 117.
 ——— *murorum*. 86.
 ——— *myurum*. 62.
 ——— *nemorosum*. 76. 314-
 315. 762. 764.
 ——— *nigro-luteum*. 781.
 ——— *nodosum*. 60. 109.
 ——— *palustre*. 55. 81. 768.
 ——— *panicum*. 56. 57. 65.
 1068.
 ——— *paniculatum*. 86. 88.
 828. 829.
 ——— *parnassi*. 282.
 ——— *phalaroides*. 1070.
 ——— *polyanthemum*. 283.
 ——— *pratense*. 52. 82-85.
 94. 112. 828.
 ——— *secalinum*. 121.
 ——— *segetum*. 67. 75.
 ——— *sorgbi*. 57.
 ——— *spartium*. 53. 78. 119.
 ——— *spicatum*. 28. 93. 124.
 330. 781. 783.
 ——— *sylvaticum*. 66. 106.
 ——— *tomentosum*. 51.
 ——— *tremulum*. 92.
 ——— *triticeum*. 123. 197.
 ——— *typhbinum*. 61.
 ——— *typhoides*. 59. 60. 62.
 63.

Graminifolia. 857.
Gratiola. 21.
Gratiola. 403.
Grossularia. 212-214.
Gylophila. 367.

H.

Halimus. 832.
Hedera. 215.
Hedera. 490.
Hederula. 749.

He-

Buglossum. 171. 175-177.

Bugula. 478.

Bulbocastanum. 249.

Bulbus. 296. 298.

Bunias. 574.

Bunias. 567.

Bunium. 249.

Bupbthalmum. 704. 705.

Bupleurum. 245.

Bursa pastoris. 534. 540. 546.

Bursæ pastoris similis. 563.

Butomon. 755.

Butomus. 358.

Buxus. 787.

Byssus. 1017-1025.

C.

Cakile. 574.

Calamagrostis. 54. 118.

Calamintba. 488. 509.

Calamus. 306.

Calcatrippa. 452.

Calcifraga. 254.

Calcitraba. 713.

Calla. 743.

Callitriche. 3. 4.

Caltha. 477.

Camelina. 533. 561.

Campanula. 193-199.

Cannabina. 497. 664. 665.

Cannabis. 497.

Caprifolium. 201.

Cardamine. 547-551.

Cardamine. 535.

Cardiaca. 505.

Carduus. 652-659.

Carduus. 651. 660-662. 713.

Carex. 756-783.

Carlina. 663.

Carlina. 659.

Carota. 248.

Carui. 272.

Carum. 272.

Caryophyllata. 441. 442.

Caryophyllus. 79. 283. 369. 379.

378. 379. 394. 399.

Cassida. 510.

Cassutba. 153.

Castanea. 333.

Cataria. 483.

Caucalis. 246. 247.

Cauda equina. 843.

— *murina*. 290.

Centaurea. 709-713.

Centaurium. 341. 711.

Centinodia. 238. 256.

Centunculus. 146.

Ceonanthos. 651.

Cepæa. 387.

Cerastium. 396-399.

Cerasus. 418. 419.

Ceratophyllum. 792.

Cerefolium. 267.

Cervicaria. 197.

Chærefolium. 266.

Chærophyllo similis. 152.

Chærophylum. 268. 269.

Chærophylum. 266.

Chamædrys. 14. 15. 480.

Chamæ-Genista. 1067.

Chamæleagnus. 819.

Chamæleon. 659.

Chamæmelum. 700. 702. 703.

Chamænerion. 335-340.

Chamæorchis. 736.

Chamæ-Schoenus. 42.

Chamæfyce. 407.

Chanterellus. 1026.

Chara. 747. 748.

Cheiranthus. 562.

Cheiri. 562.

Chelidonia. 465.

Chelidonium. 444.

Chelidonium. 465.

Chenopodium. 220-230.

Chlora. 341.

Chrysanthemum. 697. 698.

Chrysanthemum. 705-708.

Cichorium. 649.

Z

Ci.

Cicborium. 644.
Cicuta. 263.
Cicuta. 250. 260.
Cicutaria. 262-264.
Cineraria. 691.
Circæa. 6.
Cirsium. 653. 658.
Cistus. 451.
Clathrus. 1043.
Clavaria. 1050-1052.
Clematis. 458.
Clematis. 218.
Clematidis. 741.
Clinopodium. 508.
Cnicus. 660.
Cnicus. 663.
Cochlearia. 541-545.
Collum gruis. 580.
Comarum. 443.
Concha. 1108.
Conserva. 1008-1016.
Conium. 250.
Consolida. 174. 452. 478.
Convallaria. 302-304.
Convolvulum. 357.
Convolvulus. 190-192.
Convolvulus. 357.
Conyza. 677.
Conyza. 678. 679. 687. 691-694.
Conyzella. 678.
Corallina. 980. 1003.
Corallo - Fungus. 1052.
Coralloides. 949. 971-978. 980. 1052.
Coreopsis. 708.
Cornu Cervi. 145. 544.
Cornus. 148.
Coronopus. 144. 145. 544.
Corrigiola. 280.
Corylus. 799.
Cotula. 703.
Cotyledon. 243.
Cracca. 603. 608.
Crassula. 386.

Cratægus. 422.
Crepis. 644.
Crepitus lupi. 1054.
Crista galli. 513.
Crithmum. 254.
Cruciata. 240. 830. 1073.
Cucubalus. 371-373.
Cuminum. 272.
Cuscuta. 153.
Cyanus. 710.
Cyatboides. 1045.
Cymbalaria. 521.
Cynapium. 264.
Cynoglossum. 172.
Cynosbator. 430.
Cynosorchis. 726. 729.
Cynofurus. 94.
Cyperoides. 756. 766. 770-772. 776. 777. 781.
Cyperus. 38. 39.
Cyperus. 34. 49. 767.

D.

Dactylis. 93.
Damasonium. 738-740.
Daphne. 351.
Datura. 205.
Daucus. 248.
Delphinium. 452.
Dens leonis. 636. 644.
Dianthus. 369. 370.
Diapensia. 244.
Digitalis. 528.
Dipsacus. 131. 132.
Doronicum. 695.
Dortmanna. 720.
Draba. 534.
Draco. 706.
Dracunculus. 706. 743.
Drosera. 288. 289.
Droffion. 289.
Dulcamara. 207.

Etc.

- Mespilus*. 422.
Mezereum. 351.
Milium. 66.
Milium folis. 169.
Millefolium. 23. 182. 260. 476.
 707. 792-794.
Millegrana. 219. 287.
Mnium. 868-877.
Mollugo. 140.
Monorchis. 757.
Monotropa. 359.
Montia. 129.
Morsus diaboli. 133.
 gallinæ. 281. 495.
 ranæ. 825.
Mucilago. 1064.
Mucor. 1059.
Musco-fungus. 965. 968. 969.
 975. 986.
Muscoides. 931.
Muscus abietis facie. 912.
 amarus. 962.
 apocarpus. 878. 879.
 aquaticus. 864. 1009.
 arboreus. 924. 964. 984.
 986. 987.
 aureus. 869. 873. 896.
 caninus. 969.
 capillaceus. 881. 888.
 891. 893. 896. 897.
 capillaris. 867. 914.
 clavatus. 858. 861.
 coralloides. 980. 982.
 corniculatus. 982.
 coronatus. 867. 868.
 869. 882. 886. 892.
 cranii humani. 953.
 crusta modo. 955.
 densis foliolis. 915.
 denticulatus. 906. 1078.
 1079.
 denticulato similis. 918.
 erectus. 860. 884. 916.
 filicinus. 900. 908.
Muscus lactuca similis. 1006.
 marinus. 1002. 1906.
 minimus. 895. 1046.
 montanus. 915.
 palustris. 875.
 pennatus. 899.
 polytrichodes. 872. 875.
 889. 901.
 pulmararius. 961.
 pyxidatus. 971.
 pyxoides. 973.
 ramosus. 905. 985. 987.
 repens. 907. 910. 911.
 916.
 saxatilis. 887. 895.
 1080.
 squamosus. 904. 906.
 912. 913. 920. 921. 926.
 stellaris. 875.
 subtilissimus. 883.
 taxiformis. 902.
 terrestris. 858. 862.
 875. 883. 891. 894. 916.
 919. 924. 925. 1078. 1079.
 trichoides. 863. 870.
 880. 888. 927. 931.
 trichomanoid. 903. 928.
 931.
 vulgaris. 909.
 vulgatissimus. 862.
Myagrion. 533.
Myagrum. 532. 533.
Myagrum. 561.
Myofotis. 168.
Myofotis. 398.
Myofurus. 290.
Myrica. 819.
Myriophyllum. 793. 794.
Myriophyllum. 182.
Myrrhis. 267-269.
Myrtillus. 342.

N.

Napus. 567.
Narcissus. 292.
Nardus. 53.
Narthecium. 300.
Nasturtium. 535. 537. 547.
 550. 552. 556.
Nepeta. 483.
Nigellastrum. 393.
Noli me tangere. 724.
Nostoc. 988.
Nucula. 249.
Nummularia. 187. 189.
Nymphæa. 448. 449.
Nymphæa. 180. 825.

O.

Oculus Christi. 692.
Ocymoides. 374. 395.
Odontites. 515.
Oenanthe. 261.
Oenothera. 334.
Olus album. 31.
 — *atrum.* 271.
Onobrychis. 194.
Ononis. 596.
Onopordum. 661. 662.
Ophioglossum. 845.
Opbris. 734. 735.
Ophrys. 734-737.
Opulus. 277.
Orchis. 725-732.
Orcbis. 733. 736. 737.
Origanum. 506.
Ornithogalum. 296-299.
Ornithopus. 609.
Orobanchæ. 530. 531.
Orobanchæ. 359. 518.
Orontium. 525.
Orvala. 26.
Osmunda. 846-848.
Osyris. 524.

Othonna. 691.
Oxalis. 391. 392.
Oxalis. 327. 328.
Oxyacantha. 318. 420.
Oxycoccus. 345.
Oxylapathum. 323.
Oxys. 392.

P.

Padus. 418.
Palmata. 728. 730. 731.
Panicum. 56-58.
Panicum. 65.
Papaver. 445-447.
Papaver. 372.
Parietaria. 831.
Parnassia. 282.
Paronychia. 216. 363. 534.
Parthenium. 699.
Pastinaca. 270.
Pastinaca. 248.
Pecten veneris. 265.
Pedicularis. 519. 520.
Pedicularis. 513.
Pentaphyllum. 436-438. 443.
Peplis. 319.
Peplis. 408.
Perchepier. 152.
Perfoliata. 245.
Perforata. 624.
Periclymenum. 201.
Perficaria. 353-355.
Pes anserinus. 221.
 — *columbinus.* 582.
Petasites. 681. 682.
Peucedanum. 253.
Peziza. 1045-1049.
Peziza. 1108. 1199.
Phalaris. 54. 55.
Phallus. 1041. 1042.
Phascum. 863.
Phellandrium. 262.
Phleum. 59-61.
Pbænix. 121.
Pbyllitis. 850.

Pby-

Helianthemum. 451.
Helix. 215.
Helleborine. 738-740.
Helvella. 1044.
Helxine. 831.
Hepatica. 935. 937. 938. 941.
Hepaticoides. 930. 931.
Hepatorium. 664. 666.
Heptaphyllum. 443.
Heracleum. 255.
Herba britannica. 325.
 — *divi stephani*. 6.
 — *gerardi*. 276.
 — *judaica*. 484.
 — *stella*. 145.
Herminium. 736.
Herniaria. 29.
Herocloe. 829.
Hieracium. 639-643.
Hieracium. 630. 632. 637. 638.
 644-647.
Hippocastanum. 333.
Hippolapathum. 325.
Hippophae. 818.
Hippofelinum. 271.
Hippuris. 2.
Hippuris. 748.
Holcus. 827-829.
Holosteo affinis. 290.
Holosteum. 314. 378.
Homolocencbrus. 55.
Horminum. 26. 27.
Hottonia. 182.
Humulus. 820.
Hyacinthus. 305.
Hydroceratophyllum. 792.
Hydrocharis. 825.
Hydrocotyle. 243.
Hydrophace. 749-752.
Hydropiper. 354.
Hyoscyamus. 266.
Hyoscyamus. 334.
Hyoseris. 645.
Hypericum. 623-627.
Hypnum. 899-927.

Hypochaeris. 646. 647.
Hypopitys. 359.
Hypoxylum. 1050.
Hyssopifolia. 403.
Hyssopus. 482.

I.

Iacea. 709. 712.
Jacobaea. 686. 687.
Jasione. 719.
Iberis. 546.
Ibiscus. 583.
lex. 54.
Illecebra. 390.
Illecebrum. 216.
Impatiens. 724.
Impia. 715.
Intybus. 649.
Inula. 692-694.
Jolitus. 1021.
Irio. 557.
Iris. 32. 33.
Isardia. 149.
Judaica herba. 484.
Juncellus. 40. 43.
Juncus. 307-317.
Juncus. 35. 40. 42. 44. 45.
 47. 48. 51. 261. 358.
Jungermannia. 928-935.
Jungermannia. 876. 877.
Juniperus. 826.

K.

Kali. 1. 230. 232-234.
Knawel. 365. 366.

L.

Lactuca. 634.
Ladanum. 496.
Lagopodium. 597.
Lagopus. 613.
Lagurus. 115.

La-

Rubia. 140. 1073.
Rubus. 431-433.
Rumex. 320-328.
Ruppia. 165.
Ruta muraria. 852.

S.

Sagina. 166. 167.
Sagitta. 795.
Sagittaria. 795.
Salicaria. 402. 403.
Salicornia. 1.
Salix. 803-815.
Salix. 1077.
Salsola. 232-234.
Salvia. 26. 27.
Salvia. 479.
Sambucus. 278. 279.
Sambucus. 277.
Samolus. 200.
Sanguisorba. 147.
Sanguisorba. 796.
Sanicula. 244.
Sanicula. 22.
Saponaria. 368.
Satyrium. 733.
Satyrium. 727. 728. 730.
Saxifraga. 363. 364.
Saxifraga. 273. 274.
Scabiosa. 133-135.
Scabiosa. 130. 711. 719.
Scandix. 265-267.
Scariola. 634.
Schoenolagurus. 51.
Schoenus. 34-37.
Scirpus. 40-50.
Scleranthus. 365. 366.
Scolopendrium. 850.
Scordium. 480.
Scorodonia. 479.
Scorpiurus. 168.
Scrophularia. 526. 527.
Scutellaria. 510.
Sedum. 386-390.

Sedum. 363. 364. 417. 454.
Selago. 860.
Selinum. 251. 252.
Sempervivum. 417.
Sempervivum. 390.
Senecio. 683-688.
Serapias. 738-740.
Serpyllun. 507.
Serratula. 651.
Sesamoides. 373.
Seseli. 252.
Sideritis. 484.
Sideritis. 496. 501.
Sigillum salomonis. 303.
Silene. 374-376.
Silybum. 657.
Sinapi. 555. 571. 572.
Sinapis. 570-572.
Sifon. 260.
Sisymbria. 552.
Sisymbrium. 552-557.
Sisymbrium. 547. 549.
Sium. 258. 259.
Sium. 260. 263. 547.
Smilax. 190. 191.
Smyrnum. 271.
Soda. 233.
Solanifolia. 6.
Solanum. 207. 208.
Solanum. 205.
Soldanella. 192.
Solidago. 690.
Solidago. 688.
Solis Ros. 289.
Soncho affinis. 648.
Sonchus. 631-633.
Sonchus. 635.
Sophia. 556.
Sorbus. 423.
Sparganium. 755.
Spartium. 591.
Spatula. 33.
Speculum. 199.
Spergula. 400. 401.
Spergula. 286. 384. 529.

Spba-

- Mespilus.* 422.
Mezereum. 351.
Milium. 66.
Milium folis. 169.
Millefolium. 23. 182. 260. 476.
 707. 792-794.
Millegrana. 219. 287.
Mnium. 868-877.
Mollugo. 140.
Monorchis. 757.
Monotropa. 359.
Montia. 129.
Morsus diaboli. 133.
 gallinae. 281. 495.
 ranae. 825.
Mucilago. 1064.
Mucor. 1059.
Musco-fungus. 965. 968. 969.
 975. 986.
Muscoides. 931.
Muscus abietis facie. 912.
 amarus. 962.
 apocarpus. 878. 879.
 aquaticus. 864. 1009.
 arboreus. 924. 964. 984.
 986. 987.
 aureus. 869. 873. 896.
 caninus. 969.
 capillaceus. 881. 888.
 891. 893. 896. 897.
 capillaris. 867. 914.
 clavatus. 858. 861.
 coralloides. 980. 982.
 corniculatus. 982.
 coronatus. 867. 868.
 869. 882. 886. 892.
 cranii humani. 953.
 crusta modo. 955.
 densis foliolis. 915.
 denticulatus. 906. 1078
 1079.
 denticulato similis. 918.
 erectus. 860. 884. 916.
 filicinus. 900. 908.
Muscus lactuca similis. 1006.
 marinus. 1002. 1906.
 minimus. 895. 1046.
 montanus. 915.
 palustris. 875.
 pennatus. 899.
 polytrichodes. 872. 875.
 889. 901.
 pulmararius. 961.
 pyxidatus. 971.
 pyxoides. 973.
 ramosus. 905. 985. 987.
 repens. 907. 910. 911.
 916.
 saxatilis. 887. 895.
 1080.
 squamosus. 904. 906.
 912. 913. 920. 921. 926.
 stellaris. 875.
 subtilissimus. 883.
 taxiformis. 902.
 terrestris. 858. 862.
 875. 883. 891. 894. 916.
 919. 924. 925. 1078. 1079.
 trichoides. 863. 870.
 880. 888. 927. 931.
 trichomanoid. 903. 928.
 931.
 vulgaris. 909.
 vulgatissimus. 862.
Myagrion. 533.
Myagrum. 532. 533.
Myagrum. 561.
Myofotis. 168.
Myofotis. 398.
Myofurus. 290.
Myrica. 819.
Myriophyllum. 793. 794.
Myriophyllum. 182.
Myrrhis. 267-269.
Myrtillus. 342.

N.

Napus. 567.
Narcissus. 292.
Nardus 53.
Narthecium. 300.
Nasturtium. 535. 537. 547-
 550. 552. 556.
Nepeta. 423.
Nigellastrum. 393.
Noli me tangere. 724.
Noctoc. 988.
Nucula. 249.
Nummularia. 187. 189.
Nymphæa. 448. 449.
Nymphaea. 180. 825.

O.

Oculus Christi. 692.
Ocymoides. 374. 395.
Odonites. 515.
Oenanthe. 261.
Oenothera. 334.
Olus album. 31.
 — *atrum*. 271.
Onobrychis. 194.
Ononis. 596.
Onopordum. 661. 662.
Ophioglossum. 845.
Opbris. 734. 735.
Ophrys. 734-737.
Opulus. 277.
Orchis. 725-732.
Orchis. 733. 736. 737.
Origanum. 506.
Ornithogalum. 296-299.
Ornithopus. 609.
Orobanchæ. 530. 531.
Orobanche. 359. 518.
Orontium. 525.
Orvala. 26.
Osmunda. 846-848.
Osyris. 524.

Othonna. 691.
Oxalis. 391. 392.
Oxalis. 327. 328.
Oxyacantha. 318. 420.
Oxyaccus. 345.
Oxylapathum. 323.
Oxys. 392.

P.

Padus. 418.
Palmata. 728. 730. 731.
Panicum. 56-58.
Panicum. 65.
Papaver. 445-447.
Papaver. 372.
Parietaria. 831.
Parnassia. 282.
Paronychia. 216. 363. 534.
Parthenium. 699.
Pastinaca. 270.
Pastinaca. 248.
Pecten veneris. 265.
Pedicularis. 519. 520.
Pedicularis. 513.
Pentaphyllum. 436-438. 443.
Peplis. 319.
Peplis. 408.
Percbequier. 152.
Perfoliata. 245.
Perforata. 624.
Periclymenum. 201.
Perficaria. 353-355.
Pes anserinus. 221.
 — *columbinus*. 582.
Petasites. 681. 682.
Peucedanum. 253.
Peziza. 1045-1049.
Peziza. 1108. 1109.
Phalaris. 54. 55.
Phallus. 1041. 1042.
Phascum. 863.
Phellandrium. 262.
Phleum. 59-61.
Phoenix. 121.
Pbyllitis. 850.

Pby.

- Pbyteuma*. 525.
Picris. 630.
Picris. 638.
Pilosella. 563. 639. 640. 674.
Pilularia. 857.
Pimpinella. 273. 274.
Pimpinella. 147. 796.
Pinastella. 792.
Pinguicula. 22.
Pinus. 800.
Pityusa. 410.
Plantaginella. 529.
Plantago. 142-145. 1066.
Plantago. 321. 332. 529. 784.
Platanaria. 755.
Pneumonanthe. 236.
Poa. 81-91.
Podagraria. 276.
Pclifolia. 360.
Polyacantha. 654.
Polygala. 590.
Polygonatum. 303.
Polygonifolia. 280.
Polygonum. 352-357.
Polygonum. 2. 216. 219. 280.
 287. 365. 366. 384. 401.
Polypodium. 853-856.
Polypodium. 848.
Polyporus. 1102.
Polytrichum. 867.
Polytrichum. 851. 869. 873.
 879. 884. 896.
Populus. 821-823.
Portulaca. 129. 832.
Potamogeton. 155-164.
Potamogeton. 353. 746.
Potentilla. 435-439.
Poterium. 796.
Prenanthes. 635.
Primula. 179.
Prunella. 511-512.
Prunus. 418-421.
Pseudo-Aspodelus. 300.
 Cyperus. 778.
Pseudo Ligusticum. 418.
 Lyfimacium. 337. 402.
Pseudo-Orcbis. 734.
Ptarmica. 706.
Pteris. 849.
Pulegium. 489. 509.
Pulicaria. 694.
Pulmonaria. 173.
Pulmonaria. 641.
Pulsatilla. 455.
Pyrola. 361. 362.
Pyrus. 424-425.

 Q.
Quercus. 797.
Quercus. 993.
Quinquefolium. 436-439. 443.

 R.
Radiola. 287.
Radix cava. 586.
Rana morsus. 825.
Ranunculus. 463-476.
Ranunculus. 243. 457.
Rapa. 564.
Rapbanistrum. 573.
Raphanus. 573.
Raphanus. 545. 554.
Rapistrum. 532. 570.
Rapunculum. 194.
Rapunculus. 194. 195. 198. 719.
Regina prati. 427.
Releda. 405. 406.
Rhamnus. 209. 210.
Rhamnus. 818.
Rhinanthus. 513.
Rhus. 819.
Ribes. 212-214.
Riccia. 941.
Robur. 797.
Rorida. 288. 289.
Rosa. 428-430.
Ros solis. 288. 289.
Rubeola. 1073.

 A a
 Ru-

Rubia. 140. 1073.
Rubus. 431-433.
Rumex. 320-328.
Ruppia. 165.
Ruta muraria. 852.

S.

Sagina. 166. 167.
Sagitta. 795.
Sagittaria. 795.
Salicaria. 402. 403.
Salicornia. 1.
Salix. 803-815.
Salix. 1077.
Salifolia. 232-234.
Salvia. 26. 27.
Salvia. 479.
Sambucus. 278. 279.
Sambucus. 277.
Samolus. 200.
Sanguisorba. 147.
Sanguisorba. 796.
Sanicula. 244.
Sanicula. 22.
Saponaria. 368.
Satyrium. 733.
Satyrium. 727. 728. 730.
Saxifraga. 363. 364.
Saxifraga. 273. 274.
Scabiosa. 133-135.
Scabiosa. 130. 711. 719.
Scandix. 265-267.
Scariola. 634.
Schoenolagurus. 51.
Schoenus. 34-37.
Scirpus. 40-50.
Scleranthus. 365. 366.
Scolopendrium. 850.
Scordium. 480.
Scorodonia. 479.
Scorpiurus. 168.
Scrophularia. 526. 527.
Scutellaria. 510.
Sedum. 386-390.

Sedum. 363. 364. 417. 454.
Selago. 860.
Selinum. 251. 252.
Sempervivum. 417.
Sepervivum. 390.
Senecio. 683-688.
Serapias. 738-740.
Serpyllun. 507.
Serratula. 651.
Sesamoides. 373.
Sejeli. 252.
Sideritis. 484.
Sideritis. 496. 501.
Sigillum salomonis. 303.
Silene. 374-376.
Silybum. 657.
Sinapi. 555. 571. 572.
Sinapis. 570-572.
Sifon. 260.
Sisymbria. 552.
Sisymbrium. 552-557.
Sisymbrium. 547. 549.
Sium. 258. 259.
Sium. 260. 263. 547.
Smilax. 190. 191.
Smyrnum. 271.
Soda. 233.
Solanifolia. 6.
Solanum. 207. 208.
Solanum. 205.
Soldanella. 192.
Solidago. 690.
Solidago. 688.
Solis Ros. 289.
Soncho affinis. 648.
Sonchus. 631-633.
Sonchus. 635.
Sophia. 556.
Sorbus. 423.
Sparganium. 755.
Spartium. 591.
Spatula. 33.
Speculum. 199.
Spergula. 400. 401.
Spergula. 286. 384. 529.
Spba.

Sphacelus. 479.
Sphaeria. 1057.
Sphagnum. 862.
Sphagnum. 878.
Sphondylium. 255.
Spina acida. 318.
 ——— *acuta*. 422.
 ——— *alba*. 661.
 ——— *cervina*. 209.
 ——— *tomentosa*. 661. 662.
Spiræa. 426. 427.
Spongia. 1064.
Squamaria. 518.
Stachys. 499-501.
Statice. 283. 284.
Stellaria. 377-380.
Stellaria. 3.
Stramonium. 205.
Stratiotes. 454.
Struthiopteris. 848.
Succisa. 133.
Symphycum. 174.
Symphytum. 173.

T.

Tamarisco similis. 1002.
Tanacetum. 667.
Taraxacum. 636.
Targionia. 936.
Tatula. 205.
Telepbium. 386.
Terræ glandes. 598.
Tetragonia. 211.
Tetrabit. 497.
Teucrium. 479-481.
Teuerium. 15.
Thalictrum. 459-461.
Thapsus. 202.
Thlaspi. 538-540.
Thlaspi. 543.
Thymus. 507. 508.
Thyselinum. 251.
Tilia. 450.
Titbimalus. 409-416.

Tordylium. 246. 247.
Tormentilla. 440.
Tragopogon. 628. 629.
Tragoselinum. 273. 274.
Trapa. 150.
Tremella. 988-990.
Tremella. 1005-1007. 1040.
Tribulus. 159. 157.
Tricbomanes. 851.
Trifolium. 610-616.
Trifolium. 181. 391. 392. 616-621.
Triglochin. 329. 330.
Trigonella. 619.
Tripolium. 629.
Triticum. 125-128.
Triticum. 123. 516.
Tubera. 1053.
Tunica. 367.
Turritis. 564. 565.
Tussilago. 680-682.
Typha. 753. 754.

U.

Ulex. 595.
Ulmaria. 427.
Ulmus. 235.
Ulva. 1003-1007.
Unifolium. 304.
Urtica. 788-789.
Urtica. 493. 494. 497-499.
Usnea. 953. 984-989.
Utricularia. 23.
Uva crispa. 214.

V.

Vaccinia. 342. 344. 345.
Vaccinium. 342-345.
Valantia. 832.
Valeriana. 29-31.
Valerianæ rubra similis. 284.
Vallisneria. 802.
Verbasculum. 179.

Verbascum. 202-204.

Verbena. 24.

Vermisularis. 234.

Veronica. 7-20.

Veronica. 522.

Viburnum. 277.

Vicia. 603-606.

Vicia. 598. 607. 608.

Vinca. 218.

Viola. 721-723.

Viola. 182.*Violaria*. 721.*Virga aurea*. 688. 690.—— *pastoris*. 131. 132.—— *sanguinea*. 148.*Viscago*. 376.

Viscum. 817.

Vitalba. 458.*Vitis idæa*. 342-345.*Vulneraria*. 597.*Vulvaria*. 228.

X.

Xanthium. 790.

Z.

Zannichellia. 746.

Zostera. 744. 745.

maritimus. *321. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis
dentatis graniferis, foliis linearibus. *Sp.* 478.

n. 9.

Lapathum aquaticum, luteolæ folio. *Tourn. infl.*
564.

Lapathum aquaticum, angustissimo acuminato
folio. *Bocc. mus.* 2. p. 142. t. 164.

Te Catwyk by bet Malle gat. (MEERBURGH.)
Inferatur pag. 99. *Supra*. n. 322.

R E G I S T E R

D E R

N E D E R D U I T S C H E N A A M E N.

A.

Aak. (spaansche) 838.
Aal-bezien. 212. 213.
Aard-Aker. 599.
—— Bezien. 431.
—— Klaver. 615.
—— Mos. 1078.
—— Nooten. 249.
—— Rook. 587.
—— Veil. 490.
Aarons- baard. 742.
Abeel-boom. 821.
Adders-tong. 845.
Adder-wortel. 352.
Adonis-bloem. 462.
Agrimony. 404.
Ahorn-boom. 837.
Ajuin (Veld-) 296.
Akkely. 453.
Akker-Brem. 592.
—— Haanevoet. 472.
—— Klitzen. 246.
Alfrank. 207.
Algoede. 220.
Aliem. 669. 670.
Amelands-gras. 95.
Andoorn. 502-504.
Angelica. (wilde) 257.
Appel-boom. 425.
Aquiley. 453.

Asfodillen. 300.
Aspergie. 301.
Aster. (zee-) 689.
Averone. (wilde) 668.
Averuit. (wilde) 668.

B.

Bak-kruid. 179.
Bal-Roozen. 277.
Ballerjes-kruid. 725.
Bastard-Garft. 124.
—— Muur. 188.
Bathengel. 481.
Beeke-boom. 11.
Beek-punge. 11.
—— schuim. 527.
Beemdt-Distel. 660.
—— Gras. 84.
—— Klaver. 612.
Been (wit) 372.
Beere-bezien. 344.
—— klauw. 255.
Beete. 231.
Bentveld-kruid. 512.
Berberiffen. 318.
Berg-Knop. 390.
—— Mos. 980.
—— Nies-kruid. 738.
—— Sanikel. 22.
Berke-boom. 785.

Bernafie. 175.
 Bertram. 706.
 Betonie. 527.
 Bevernaart. 273-274.
 Bevernel. 273. 274.
 Bevest. 821.
 Beuke-boom. 798.
 Beursjes-kruid. 540.
 Bezem-kruid. 537.
 Biezen. 44. 261. 309. 310.
 Bilsen-kruid. 206.
 Bingel-kruid. 824.
 Bitter-zoet. 207.
 Blauwe-bessen. 342.
 ——— Lelytes. 236.
 Blik. 435.
 Bloed-kruid. 320.
 Boekweit. (wilde) 357.
 Boelkens-kruid. 664. 666.
 Boeren-Kers. 538. 539.
 ——— Rottingen. 656.
 ——— Worm-kruid. 667.
 Boks-baard. 628.
 ——— boonen. 181.
 Bol. 393.
 Bolderik. 393.
 Boog-hout. 838.
 Boom-Mos. 984.
 ——— Palm. 787.
 ——— Varen. 853.
 ——— Veil. 215.
 Boonen. (Donder-) 386.
 ——— (Wolfs-) 386.
 Boontjes-Holwortel. 586.
 Bosch-bessen. 342.
 ——— boom. 787.
 ——— gras. 315.
 ——— Haanevoet. 456.
 ——— Muur. 377.
 ——— Varen. 855.
 Boter-bloem. 470. 477.
 Bovist. 1054.
 Bouquet-Lathyrus. 602.
 Braam-bezien. 433.
 ——— boizen. 431.

Brand-Netelen. 788. 789.
 Breekebeen. 1043.
 Brem 591-593.
 ——— Kappers. 591.
 ——— Raap. 530.
 Breuk-kruid. 240. 386.
 Bruinelle. 511.
 Bruin-Heilig. 487.
 Bruinetjes. 462.
 Brummelen. 430. 431.
 Bulpeserikken. 753.
 Busboom. 787.
 Butter wortel. 22.
 Byvoet. 671.

C.

Calketrip. 452.
 Calmus. 306.
 Camille. 700-703.
 Campernoelie. 1030.
 Caperfoely. 201.
 Caruwy. 282.
 Carwy. 282.
 Castanie-boom. (wilde) 333.
 ——— (paarde-) 333.
 Catoen-bloem. 52.
 Celdery. 275.
 Champignon. 1026. 1030.
 Chantarelle. 1026.
 Christi Lancet. 845.
 Christus-oogen. (wilde) 396.
 Cicorey. 644. 649.
 Comyn. 272.
 Coraal-kruid. 301.
 Cornoellie. (wilde) 148.
 Crock. 608.

D.

Dammeren-hout. 826.
 Das-Look. 295.
 Deeken-vlag. 1008.
 Deurwas. 245.
 Distel. (Beemdt) 660.

Dis

Krabbe-kwaad. 1.
 Krakel-bezien. 342.
 Kransjes. 696.
 Kriffen. 215.
 Krodde. 570.
 Krokkeling. 144.
 Kroontjes-kruid. 248. 408. 412.
 Kroos. 750. 991.
 Krooſen. 345.
 Kroote. 231.
 Kruidje roerd my niet. 724.
 Kruiken (water-) 448.
 Kruip door den tuin. 490.
 — koorn. 127.
 Kruis-bezien. 214.
 — bloem. 590.
 — diſtel. 241. 242.
 — doorn. 214.
 — en Munt. 488.
 — kruid. 683.
 — wortel. 683. 684.
 Kulletjes (honds-) 729.
 — kruid 727.
 — (volle-) 725.

L.

Lammertjes-ooren. 220.
 Lathyrus (bouquet-) 602.
 — (tros-) 602.
 Latouw (Haaſe) 633.
 — (wilde-) 634.
 — (Zee-) 1006.
 Lavas. 256.
 Leeken. 323.
 Leeuwen-bek. 497. 525.
 — klauw. 151.
 — vdet 151.
 Lely convaly. 302.
 Lelie van den dalen. 302.
 Lelytjes (blauwe-) 263.
 Lepelblad. 332. 541. 542.
 — kruid. 541.
 Leverkruid. 404. 937.
 Liend. 190.

Lieven-Heers-teentjes. 188.
 Liguſter. 5.
 Limoen-kruid. 284.
 Linde-boom. 450.
 — (ſchotſche) 837.
 Linzen. 600.
 — (water-) 750.
 Liſch of Liefch. 358. 755.
 — dodden. 759.
 Longe-kruid. 173. 641. 901.
 Look. 293. 295.
 — zonder Look. 560.
 — (water-) 480.
 Lubbeſtok. 256.
 Luciaan-kruid. 695.
 Luiten-hout. 837.
 Luize-boom. 211.
 — kruid. 819.
 Lynen. 458.
 Lyſter-bezien-boom. 423.

M.

Maagdelieven. 696. 697.
 Maagdën-palm. 218.
 Maan-kruid. 846.
 Majolein (wilde-) 506.
 Maldegeer. 240.
 Mallote. 610.
 Malrove. 25. 502. 504.
 Maluwe. 584. 585.
 Mammetjes-kruid. 201.
 Mans-kracht. 256.
 Marentakken. 81.
 Margarieten. 696.
 Marien-Diſtel. 657.
 Mater. 699.
 Matte-Vlas. 52.
 May-bloemen. 302.
 — Zoertjes. 696.
 Mayer. 791.
 Meer-Edik. 545.
 — Radys. 545.
 — Wortel. 440.
 Meir-bladden. 449.

Erf. 281.
 Esch-doorn. 837. 838.
 Espen-boom. 822.
 Esschen-boom. 839.
 Evene. 113.
 Ever-wortel. 659.
 Eyloof. 215.

F.

Felje. 174.
 Fenne-bloemen. 696.
 Fie-kruid. 556.
 Filt-kruid. 153.
 Flap. 1008.
 Flierfin-kruid. 276.
 Fontein-kruid. 155. 303. 353.
 Framboizen. 431.

G.

Gagel. 819.
 Gal. (water-) 400.
 Galigaan. 31. 49. 50. 76.
 Gamander. 481.
 Gamanderlyn. 15.
 Ganzerik. 435.
 Ganze-bloemen. 697. 698.
 ——— Distel. 633.
 ——— Voet. 221.
 Garst. (bastard-) 124.
 Gaspel-doorn. 594.
 Geiten-baard. 427.
 ——— blad. 201.
 Geldersche-Roos. 277.
 Genever-boom. 826.
 Gentiaan. 236.
 Gerards-kruid. 276.
 Geruwe. 707.
 Gezegend-kruid. 441.
 Gierst. (zonne-) 169.
 Ginoffelen. 399.
 Glas-kruid. 831.
 Glid-kruid. 484. 510.
 Gods-genade. 21.

Goeden-Hendrik. 220.
 Gouwe. (kleine-) 465.
 ——— (stinkende-) 444.
 Grappe. (Zee) 1.
 Gras. Amelands-) 93.
 ——— (beemdt-) —
 ——— (bloeiend-Zee) 283.
 ——— (bund-) 78.
 ——— (dotter-) 52.
 ——— (Egel-) 463.
 ——— (Galigaan-) 763.
 ——— (hairig-) 315. 317.
 ——— (hirs-) 66.
 ——— (Honds-) 127.
 ——— (Koe-) 587.
 ——— (Kreupel-) 356.
 ——— (Leed-) 127.
 ——— (Lidt-) 127. 1072.
 ——— (Nier-) 329.
 ——— (Oogentrooft-) 399.
 ——— (Padde-) 311.
 ——— (Panik-) 1068.
 ——— van Parnas. 282.
 ——— (Pecn-) 127.
 ——— (Pluim-riet-) 118.
 ——— (Puin-) 127.
 ——— (Rict-) 38. 54. 755.
 ——— 782.
 ——— (ruig-bosch-) 315.
 ——— (Sorg-zaad-) 57.
 ——— (trillend-) 92.
 ——— (Varkens-) 356.
 ——— (Vlot-) 100.
 ——— (Water-) 768. 782.
 ——— (Weg-) 356.
 ——— (Wolle-) 52.
 ——— (Zaad-) 66.
 ——— (Zee-) 283.
 Graveel-zaad. 567.
 Gravinne-kruid. 145.
 Grind-kruid. 683.
 Grond-heel. 686.
 Grysecom. 587.
 Guichelheil. 188.
 Gulden-hair. 867.

Gal-

Paarde- staart. 747. 840. 844.
 Paarl- kruid. 169. 170.
 Padde- bloem. 703.
 — gras. 314.
 — stoelen. 1034.
 Palm (boom-) 787.
 — (Maagden-) 218.
 Panik- gras. 1058.
 — koorn. 57.
 Parnas (Gras van) 282.
 Partyke. 400.
 Pastinaken. 270.
 Pater noster- Wierd. 997.
 Patigh. 323. 325.
 Peen. 248.
 Peerdick. 323.
 Peere- boom. 424.
 Penning- kruid. 187.
 Penseen. 722.
 Peper- boompje. 351.
 — kruid. 536.
 — (muur-) 390.
 — (water-) 354.
 — wortel. 545.
 Peppel- boom. 821-823.
 Perfik- kruid. 355.
 Pestilentie- wortel. 681. 682.
 Peterfelie (wilde) 251. 264.
 — (zee-) 254.
 Pimpernel. 796.
 Pinxter- bloem. 32. 394. 550.
 — nakels. 270.
 Pis in 't bed. 636.
 Plompen. 180. 448. 449.
 Pluim- riet- gras. 118.
 Podde- bladen. 681. 682.
 Poel- Ruit. 461.
 Poley. 489. 509.
 Pompe- bloemen. 448. 477.
 Populier- boom. 821-823.
 Porcelyn (wilde-) 387.
 — (zee) 381. 382.
 Post. 810.
 Postel bezien. 342.
 Prang- wortel. 596.

Pruim- boom. 420.
 — (lee-) 421.
 Punge (beek-) 11.
 — (water-) 11.
 Purgeer- Vlas. 286.
 Pyl- hout. 410.
 Pyn- boom. 800.
 Pyp- kruid. 268. 520.

Q

Qualster. 207.
 — boom. 423.
 Queek. 127.
 Quendel. 507.
 Quetze- beven- boom. 423.

R

Raapen. 567. 568.
 Raboorden. 753.
 Radys (meer-) 545.
 — (water-) 554.
 Raket (steen-) 558.
 — (water-) 553.
 — (wilde-) 569.
 — (zee-) 574.
 Raponcen. 193. 194.
 Ratelaar. 822.
 Ratelen. 513. 520.
 Reinette. 427.
 Reur- kruid. 676. 715. 716.
 Rhabarber (valsche-) 461.
 Rhyn- bezien. 209.
 Ridder- spooren. 452.
 Ridders. 323. 325.
 Ries- waart. 813.
 Riet. 116.
 — gras. 38. 54. 755.
 — (pluim-) 118.
 Rinkel- Wikken. 606.
 Rits. 355.
 Robberts- kruid. 578.
 Roer- kruid. 676. 715. 716.
 Rogge- bloemen. 716.
 Roobol. 842.

Rooze-boom. 428-430.
 — (bal-) 277.
 — (duin-) 429.
 — (Eglentier-) 428.
 — (Geldersche-) 277.
 — (Honds-) 430.
 — (klap-) 446.
 — (koorn-) 393. 446.
 — kransjes. 674.
 — (water-) 449.
 — (wilde-) 428.

Roowillig. 353.
 Rottinger (boore-) 656.
 Ruben 568.

Ruete (muur-) 852.
 — (poel-) 461.
 — (steen-) 852.
 — (water-) 461.

Ruiters - kruid. 454.
 — (water-) 454.

Ruffchen. 399.

Ryn - vaar. 667.

S.

Saffraan (veld-) 663.
 Salade (mol-) 636.
 — (veld-) 31.
 — (wilde-) 634.
 — (zee-) 1006.
 — (zwyne-) 645.
 Salie (wilde-) 479.
 — (veld-) 26.
 Salomons-Zegel. 303.
 Salfafi. 628.
 Sanikel. 22. 244.
 Sarrafyns - kruid. 741.
 Schaaf - stroo. 844.
 Scabieufe. 135. 719.
 Schaaps - teentjes. 683.
 — Zuuring. 328.
 — Scabieufe. 719.
 Scheele - oogen. 399.
 Scheeren. 454.
 Scheerling. 250. 263.

Scheit-bezien. 818.
 Schel - kruid. 444.
 Scheur - wortel. 174.
 Schimmel. 1060.
 Schorfte. 153.
 Schot - kruid. 389.
 Schurft - kruid. 134.
 Scorpioen - kruid. 168.
 Schotsche - Linde-boom. 837.
 Selderie (wilde-) 25.
 Senegroen. 478.
 Serpents - tongen. 795.
 St. Anthonis - kruid. 527.
 — Raapje. 467.
 St. Jacobs - kruid. 686.
 St. Jans - kruid. 386. 624. 625.
 St. Lamberts - nooten. 799.
 St. Teunis - bloem. 334.
 Slaap - bol. 447.
 Slakken - kruid. 622.
 Slange - kruid. 743.
 — wortel. 352.
 Slec - doorn. 421.
 — pruim. 421.
 Sleutel - bloem. 179.
 Slyen. 421.
 Smeelje. 815.
 Smeer - kruid. 530.
 — wortel. 174. 386.
 Sneeuw - ballen. 277.
 Sogge - Distel. 633.
 Sophie - kruid. 556.
 Sorbe - boom. 423.
 Sorg - zaad - gras. 57.
 Spaander - fungus. 1040.
 Spaansche Aak. 838.
 Sparre - boom. 800.
 Speen - kruid. 465. 526. 527.
 Speer - kruid. 845.
 Spinne - koorns. 422.
 Sporckenhout. 210.
 Sporekelle. 292.
 Spring - kruid. 724.
 Spurge. 408. 414. 416.
 Spurrie. 384. 400.

Stal-

Stal -kruid. 596.
 Standel -kruid. 725.
 Startoffen. 650.
 Steekel -bezien. 214.
 — Heide. 593.
 Steen -breek. 169. 273-274.
 — 365. 426 851.
 — doorsnydend - kruid.
 152.
 — Klaveren. 616.
 — Lever -kruid. 937.
 — Mos. 895.
 — Raket. 558.
 — Ruite. 852.
 — Violieren. 562.
 — zaad. 169. 170.
 Sterre -Distel. 713.
 — kruid. 689.
 Stevens -kruid. 6.
 Strick -bessen. 214.
 Stikel -kreusen. 454.
 Stinck -bloem. 673.
 Stincke -boom. 210.
 Stinckende -Camille. 703.
 — Gouw. 444.
 — Kruis -kruid. 684.
 — Melde. 228.
 — Paarde -staart. 747.
 Stronk -bezien. 343.
 Styfmoertjes. 721.
 Suikerey. 619.
 Suiker -Netel. 493.
 Syringe (wilde -) 418.

T.

Tandpyn -wortel. 21.
 Tartuffels. 1053.
 Tasjes -kruid. 540. 546.
 Thym (wilde -) 507.
 Ton -beyen. 433.
 Toortsen. 202.
 Tormentille. 440.
 Trillend -gras. 92.
 Tripmadam. 388.

Tros -Lathyrus. 602.
 Tuinmel - Distel. 242.
 Turren -kruid. 565.
 Tydeloozen. 292.
 Twee -blad. 704.

U.

Uit en tuis. 533.

V.

Valeriane. 29. 30.
 Val -kruid. 695.
 Varen. 847. 849. 853. 855.
 Varkens -gras. 356.
 — Kers. 544.
 — Klaver. 612.
 — Venkel. 253.
 Vasten avond Zorjes. 291.
 Veen -bessen. 345.
 — hamels. 52.
 Veld -Ajuin. 296.
 — Distel. 660.
 — Haanevnet. 470.
 — Klaver. 611. 621.
 — Munte. 488.
 — Orant. 523.
 — Saffraan. 663.
 — Salade. 31.
 — Salie. 26.
 — Zuring. 327.
 Veil (Aard -) 490.
 — (boom -) 215.
 — (water -) 749.
 Venkel (varkens -) 253.
 — (zee -) 254.
 Venus -Hair. 852.
 Vergeet my niet. 168.
 Vet. 31.
 — (Kievits -) 22.
 Vettekoes. 31.
 Vettik. 31.
 Vincoorde. 218.
 Vingerhoed -kruid. 528.

Vio.

- Violen. 721-723.
 ——— hout of boom. 837.
 ——— (water-) 182. 550.
 Violieren (steen-) 562.
 ——— (water-) 182.
 Vissel - kruid. 538.
 Virzen. 603. 606.
 Vlas - dotter. 533.
 ——— kruid. 523.
 ——— (Matte-) 52.
 ——— (purgeer-) 286.
 ——— (wild-) 285. 524.
 ——— (wolle-) 52.
 Vlier - boom. 279.
 ——— (water-) 277.
 ——— (wilde-) 278.
 Vlot - gras. 400.
 Vogel - Kars. 418.
 ——— kruid. 281.
 ——— Melk. 296.
 ——— Nest. 248.
 ——— Voet. 609.
 Vogeltjes. 586.
 Vokelaar. 698.
 Volg my na. 727.
 Vonk - hout. 1039.
 Vorsche beet. 825.
 Vosse - beffen. 341.
 ——— kullerjes. 725.
 Vrakel - beffen. 826.
 Vroegeling. 534.
 Vrouwen - Distel. 657.
 ——— Hair. 867.
 ——— Mantel. 151.
 ——— Spiegel. 199.
 Vuil - boom. 210.
 Vuur - kruid. 556.
 Vyf - vinger - kruid. 439.
 W.
 Waal - wortel. 174.
 Wald - beffen. 342.
 Wallen - Distel. 242.
 Walldrop. 136. 137. 139.
 Wambuis - knoppen. 697.
 Wand - luis - kruid. 33.
 Water Andoorn. 25.
 ——— Alfhodillen. 300.
 ——— Betonie. 527.
 ——— Biezen. 261.
 ——— Bloeizel. 1018.
 ——— Boekkens - kruid. 664.
 ——— Duizend - blad. 23. 793.
 ——— Drie - blad. 181.
 ——— Eppe. 258.
 ——— Gal. 400.
 ——— Galigaan. 761.
 ——— Gras. 768.
 ——— Haanevoet. 466.
 ——— Handekens - kruid. 730.
 ——— Kers. 550. 552.
 ——— Kervel. 262.
 ——— Klaveren. 181.
 ——— Knodsen. 753.
 ——— Kruiken. 449.
 ——— Linzen. 759.
 ——— Lifch. 358.
 ——— Look. 480.
 ——— Malrove. 25.
 ——— Muizen - oor. 168.
 ——— Muut. 487.
 ——— Muur. 281.
 ——— Navel - kruid. 243.
 ——— Nooten. 150.
 ——— Paarde - staart. 842.
 ——— Paarl - kruid. 170.
 ——— Patigh. 325.
 ——— Peper. 254.
 ——— Plompen. 449.
 ——— Punge. 11. 200.
 ——— Radys. 554.
 ——— Raket. 553.
 ——— Ridders. 325.
 ——— Riet - gras. 782.
 ——— Roozen. 449.
 ——— Ruit. 461.
 ——— Ruiters. 454.
 ——— Scheerling. 263.
 ——— Slange - kruid. 743.
 Scor-

- Water Scorpionen -kruid. 168.
 — Speen -kruid. 527.
 — Varen. 847.
 — Veil. 749.
 — Violen. 182. 550.
 — Vlier. 277.
 — Vyfvinger -kruid. 443.
 — Wederik. 184.
 — Weegbree. 331. 332.
 — Wilg. 812.
 Wederdood. 851. 867.
 Wederik. 183. 184. 334.
 Weegbree. 142. 143. 1066.
 — (Water-) 331. 332
 Weerhout. 207.
 Weeuwijcs. 201.
 Weg - Distel. 661.
 — doorn. 209.
 — gras. 356.
 Wervelen -hout. 805.
 Wier of Wiert. 744. 897.
 Wikken. 600. 603. 604. 606.
 Wilde Angelica. 257.
 — Appelboom. 425.
 — Averuit. 668.
 — Bertram. 706.
 — Boekweit. 357.
 — Camille. 702.
 — Christus -oogen. 295.
 — Cicorey. 644.
 — Carnoellie. 148.
 — Dragon. 706.
 — Eppe. 252. 271.
 — Handekens -kruid. 730.
 — Hyacinthen. 305.
 — Karlsen - Boom. 419.
 — Kers. 561.
 — Kervel. 268.
 — Knollen. 568.
 — Kool. 566.
 — Latouw. 634.
 — Look. 291.
 — Majolyn. 506.
 — Mostaart. 555.
 — Munt. 485.
 Wilde Orego. 506
 — Offie -tonge. 177.
 — Pastinaken. 270.
 — Peen. 248.
 — Peere boom. 424.
 — Pensien. 723.
 — Peterfelie. 251. 264.
 — Pinxternakels. 270.
 — Poley. 509.
 — Porcelyn. 387.
 — Pruijn. 420.
 — Pynboom. 800.
 — Raapen. 568.
 — Raket. 569.
 — Ridderspooren. 452.
 — Rooze - boom. 428.
 — Salade. 634.
 — Salie. 479.
 — Selderie. 275.
 — Steen -zaad. 170.
 — Syringe. 418.
 — Thym. 507.
 — Veld - Saffraan. 663.
 — Violen. 722.
 — Vlas. 285. 524.
 — Vlier. 278.
 — Wikken. 606.
 — Wilge. 355.
 — Wyngaard. 801.
 Wildemans -kruid. 455.
 Wilg. 803. 804. 807 - 809. 812.
 — 815. 1077.
 — wilde. 355.
 Wind - bloem. 456.
 Winde of Windom. 190 - 192.
 — (zwarte -) 357.
 Winter - groen. 361.
 — Kers. 559.
 Wipe - doorn. 430.
 Wirf. 809.
 Woert - haak. 596.
 Wolfs - boonen. 386.
 — Klaauw. 858.
 — Melk. 411 412 414 416
 — veest. 1054.
 Wol-

Wolle - gras. 52.
 ——— kruid. 202.
 ——— Vlas. 52.
 Wolvenlaa. 173.
 Wolverley. 695.
 Wonder - boom. 205.
 Wond - kruid. 597.
 Worm - kruid. 667.
 Woud - kruid. 386. 695.
 Wouw. 405.
 Wrange. 153.
 ——— kruid. 173.
 Wyngaard (wilde) 801.

Y.

Ypen - boom. 235.
 Yzer - Biezen. 310.
 ——— hard. 24.
 ——— kruid. 24.
 Yzoop. 482.

Z.

Zaad - gras. 66.
 Zand - kruid. 401.
 Zee - Alfem. 669.
 ——— After. 689.
 ——— Eike. 993.
 ——— grappe. 1.
 ——— gras. 283. 329.
 ——— (bloeiend -) 283.
 ——— Kraal. 1.
 ——— Kool. 192.
 ——— Kroos. 991.
 ——— Latouw. 1006.

Zee - Melde. 833.
 ——— Muur. 1076.
 ——— Neßelen. 744.
 ——— Peterfelie. 254.
 ——— Porcelyn. 381 - 832.
 ——— Raket. 574.
 ——— Salade. 1006.
 ——— Spurrie. 384.
 ——— Sterne - kruid. 689.
 ——— Venkel. 254.
 ——— Wiert. 744.
 ——— Winde. 192.
 ——— Wolfs - Melk. 411.
 Zeep - kruid. 368.
 Zegeltjes. 303.
 Zegge. 782.
 Zenegroen. 478.
 Zeven - blad. 2 6. 440.
 ——— jaars - bloem. 673. 674.
 Zilver - kruid. 435.
 ——— schoon. 435.
 Zinauw. 151.
 Zonne - daauw. 288. 289.
 ——— Gierst. 169.
 ——— wendend - Wolfsmelk.
 412.
 Zots - kapjes. 727.
 ——— kullekens 727. 728.
 Zurkel. 327. 328.
 Zuuring. 326 - 328.
 ——— (Klaver -) 391.
 Zwaane - bloem. 358.
 Zweseriken. 753.
 Zwynen - Kers. 544.
 ——— Salade. 645.



By de **UITGEVERS** dezes zyn
gedrukt, en, behalven verscheiden anderen,
van welken nog eenige voorraad is,
te bekomen.

*Röfel, (J. A.) Natuurlyke Historie der Insecten, waarin
de Dag- en Nacht- Vlinders in hunne Classen verdeeld, zo
als ook de Kevers, Torren, Water- Insecten, Springk-
haanen, Krekels, Hommelen, Wespen, Muggen, Vloon,
Vliegen enz. Nauwkeurig beschreeven en naar het
leeven Gekoleurd en Afgebeeld zyn. In groot 4^e op best
Hollandsch Mediaan Schryfpapier, zynde tans gevorderd
tot het 4de Deel, bestaande in 283 Plaatén, waaronder
eenige Dubbelde, benevens drie Titel Plaatén, waarop
eerlang het overige ten besluite van het 4de Deel staat
te volgen.*

Van het **VERVOLG**, door den Heer *Kleemann*, be-
staande tans in 44 keurige Plaatén, met derzelver juiste
beschryving, gaande zo over **IN - als - UITLANDSCHE**
KAPELLEN, welke tot het bovenstaande Werk vol-
strekt behoort, zal men den Liefhebberen zo dra doenlyk
eenige Plaatén met de daartoe behoorende Letterdruk
afleveren, om dus doende den Bezitteren van dit fraaie
Werk, dat tot dus ver nog geen weerga heeft, waarin
de Insecten van't Ey tot den Vlinder, op het nauwkeurigst
onderzocht, naar het leven afgebeeld, en, volgens der-
zelver byzondere kenmerken, in eene geregelde Classen-
ordering gebragt, beschreeven zyn, volledig te bezorgen.

Tyd- wyzer der Rupfen, vervattende, van maand tot maand,
den tyd der verschyning van de, door *Röfel* en *Kleemann*,
beschreeven en afgebeelde Rupfen, benevens haar voed-
zel. Ten nutte en dienst der Liefhebbers opgesteld, door
den Heer *J. Mader*, en in 't licht gegeven door *Klee-
mann*, vermeerderd met een Lytt der Planten volgens
het samenstel van *Linnaeus*: groot 8. f 1:10:-

Het zelfde Werk best pap. f 2:-:-
Klee-

Kleemann, (N. E.) Dagverhaal der Reize, gedaan in de jaaren 1768, 1769 en 1770, van Weenen door Belgrado, Kilianova, Burschiak-Tartarye, naar de Krim, en van daar over Kassa naar Konstantinopel en Smirna, en door den Archipel over Triest, naar Weenen te rug. Benevens eene Beschryving der Merkwaardigheden van Krimfch Tartarye, de aangrenzende Landen, en derzelver Inwooneren. Naar den tweeden en Vermeerderden Hoogduitschen druk in 't Nederduitsch Vertaalt, met Elf naar het Leven afgebeelde plaaten versierd. groot 8. f 3:6:-

Luyken, (J.) Overvloeiend Herte, of nagelatene verzen, bestaande in stichtelyke beschouwingen en Geestelyke Overdenkingen, verrykt met Goddelyke Spreuken, over veelerleie soorten van onderwerpen, by verschillende gelegenheden opgesteld, versierd met 86 plaaten 8 f 2:10:-
Het zelfde Werk groot pap. f 4:-:-


Westerboon, (J. van) Den Schepper verheerlykt in de Schepzelen, of Verhandeling van alle geschapene Dingen, voorgesteld in zeven Zaamenspraaken, onder Zomersche Wandelingen, dienende wyders tot Lof van Haarlems vermaakelyke Landsdouwten, met naar 't Leeven afgebeelde konstplaaten, vierde druk. groot 8. f 2:10:-

De Vriend der Kinderen, naar den tweeden Hoogduitschen Druk vertaald, 4 deelen 8. f 2:16:-

Door 't herdrukken eeniger bladen zyn weder alle de Deelen apart te bekomen, except het 2de Deel. *Men leeze de onpartydige en oordeelkundige Recensie in de Alg. Vaderl. Letteroeffeningen, eerste deel N. 8. pag. 329. enz. als mede in de Boekzaal der Geleerden van October 1779.*

* * *

't Welgelykend Pourtrait des Heeren Professor D. de Gorter, gesneden door den beroemden *Houbraken*, is mede apart te bekomen, om in 's Mans andere Werken geplaatst te kunnen worden. — Eenige, dog zeer weinige, eerste Proefdrukken zyn mede op rojaal 4 gedrukt te bekomen.



22-28

4-7
91-101

4-61

9-9

91-101